

VIRES PLANTARUM MALABARICARUM

OU

Virtudes das Plantas do Malabar

EXTRAHIDAS DO

“ Hortus Indicus Malabaricus ”

DE

HENRIQUE VAN RHEEDE,

Com a classificação das plantas segundo o moderno sistema da nomenclatura botânica; classificação therapeutica das plantas mais uteis de Gôa e Savantvadi; e apontamentos posologicos,

POR

D. G. Dalgado. L.M., M.D., L.R.C.P. Lond., L.R.C.S. Edin.,

Medico official civil em chefe do Estado de Savantvadi &c.

Publicado como Supplemento ao “ Archivo Medico da India ”

NA

TYP. « RANGEL, » QUINTA DE BOA VISTA

BASTORÁ, GÔA.

1896

12/74

PREFACIO

*« There are virtues in science as well as
in charity ». Benjamin Rush.*

O conhecimento de drogas indigenas é de summa importancia, especialmente n'um paiz tão pobre como a India. As drogas estrangeiras custam quasi sempre dez a cincoenta vezes mais do que as correspondentes indigenas, e os pobres não podendo servir-se de medicamentos estrangeiros actualmente empregados, vêem-se na collisão de ou recorrer aos curandeiros ou de ficar sem tratamento.

Levado por estas considerações achei que a publicação das virtudes therapeuticas, *verbatim*, da grande e monumental obra de Henrique van Rhee, de as quaes tomei a liberdade de dar o titulo de « *Vires Plantarum Malabaricarum* », seria de grande utilidade pratica.

A « *Hortus Indicus Malabaricus* », foi publicada em Amsterdam em 1678, e consiste de 12 tomos em 6 volumes in folio.

São descriptas n'ella 794 plantas, sendo acompanhadas das suas respectivas ichonographias. O seu auctor foi coadjuvado no seu trabalho por Itti-Achnden, medico malabarese da nação *chego*, e por tres notabilidades hindús : Raugo Botto, Viaique Pundit, e Appa Botto, sendo um ou dois d'elles originarios do povo que falla o *konkani*, e por consequente do paiz de Góa ou dos seus arredores.

A « *Hortus* » portanto, é uma obra que depois dos classicos *Collegio*, de Garcia d'Orta, interessa mais, assim sob o ponto da vista historico como pratico, aos habitantes de Góa e Savanradi; e tendo em publicado uma *Classificação botânica das Plantas e Drogas* descriptas por Garcia d'Orta julguei que um equal trabalho sobre a obra de Rhee de seria tambem assaz util, visto que esta obra, além de ser rara, é pelo seu preço inacessivel á maioria dos studiosos.

Os curandeiros, com extractos nas descriptas, mais ou menos alter-

dos, e sempre incompletos, da *Hortus*, fazem grande alarde de seus segredos, mas agora o medico com os extractos originaes e completos, e com a sua intelligencia culta, tem ao seu alcance elementos necessarios para fazer melhor uso do que elles das drogas indigenas. Com isso, porém, não se deve entender que não existem ao presente obras modernas como as de Waring, Dymock e Watt, que são muito mais scientificas e superiores a de Rheede. Mas, como já fica dito, esta obra tem o seu valor local.

Ser-me-hia facil traduzir os extractos da *Hortus* em portuguez, mas achei que a traducção serviria para augmentar o numero aliás crescente de curandeiros e medicos officiosos.

O meu principal trabalho no presente opusculo consiste em coordenar systematicamente as plantas descriptas na *Hortus* e em dar a classificação botanica de cada uma d'ellas. As plantas cuja classificação especifica é difficil ou talvez impossivel, quer por as ichonographias não serem exactas, quer por as descripções não serem perfeitas, estão collocadas em uma secção aparte, denominada « Plantas não classificadas ». O methodo que adoptei a respeito de cada planta é o seguinte : em primeiro logar dei o nome especifico segundo a *Flora of British India* por Hooker ; e depois o synonymo ou synonymos segundo a *Flora Indica* por Roxburgh. Segui este methodo porque os nomes especificos das plantas da India são, desde a publicação da primeira, fixos e invariaveis, mas a aquisição d'esta obra senão dispendiosa, e a ultima edição da *Flora Indica* sendo muito barata, com os synonymos pode-se facilmente reconhecer qualquer planta que n'ella esteja descripta. Poderia eu fazer referencias á *Bombay Flora* de Dalzell & Gibson, a mais completa das que ao presente existem em relação á esta Presidencia, mas como infelizmente já não se encontra no mercado, é muito difficil a sua aquisição.

Depois do synonymo seguem o nome da planta dado por Rheede e a referencia a sua ichonographia.

Os nomes em komkani e portuguez são, em geral, extrahidos da *Hortus* ; em quanto aos nomes usuaes em komkani adoptei, até quanto foi possivel, a orthographia do *Dictionario Komkani-Portuguez* por Mosenhor S. R. Dalgado, conservando os obscuros ou não usuaes como são dados no original. E' de notar, porém, que não se deve ligar muita importancia á esses nomes vulgares ou triviaes, porque uma e mesma planta tem dois nomes em dois concelhos e mesmo em duas aldeas, e um e mesmo nome é dado á duas ou mais plantas em diversas localidades. O

VII

unico meio seguro de verificar a planta é o seu nome scientifico. Aquelle que usar de qualquer planta sem devidamente identificá-la tem de acarreter sobre si toda a responsabilidade.

No intuito de facilitar a escolha d'uma droga para um fim determinado fiz uma « Classificação therapeutica das plantas mais uteis de Gôa e Savantvadi ». Não tenho, porém, pretensões de apresentar este trabalho como completo ; mas acho que será util, ao menos como base para ser ampliado e aperfeiçoado por pessoas mais competentes.

Para facilitar a referencia dei os apontamentos posologicos, baseados nas obras auctorizadas de Ainslie, Waring, Kanny Lal Dey, Dymock e Watt, e na minha propria e limitada experiencia, no « Indice dos nomes scientificos ». Tenho, porém, de fazer uma observação. As doses dadas não devem ser tomadas como sacramentaes. Seria bom sempre começar com as minimas e augmental-as gradualmente. Mas ao mesmo tempo convém não esquecer que não se pode tirar todo o proveito d'uma droga sem que ella seja administrada em sufficientes ou devidas doses. Os apontamentos posologicos indicarão quanto atrasado se acha este ramo de estudo, sendo por isso muito para estimar que os leitores que conhecerem as doses efficazes das drogas indigenas as registem no *Archivo Medico* e assim dêem um estímulo ao seu emprego racional.

Vae no fim um « Indice dos nomes vulgares », que deve facilitar as referencias ás plantas aos que não estão ao facto dos nomes scientificos ; mas repito que o unico meio de verificar positivamente uma planta é o seu nome scientifico, e a descripção d'ella nas varias *Floras*.

Em conclusão cumpre-me agradecer aos Srs. Directores do primeiro e unico jornal medico em portuguez na India.—*O Archivo Medico da India*.—por ter publicado o meu humilde trabalho como Supplemento, e ao Dr. V. P. de Sá pelo trabalho, sempre enfadonho, da revisão das provas,

VIRES PLANTARUM MALABARICARUM.

I. DILLENACEÆ^{peri}
ntae

TETRACERA LEVIS, *Vahl*; *Fl. Br. Ind.* t. 31; *T. trigyna*.
Roxb. Fl. Ind. II. 645.—*Acara patsjoti*, *Rheede Hort. Mal.* v. t. 8.

Tij sâmen, *Konk.*; Salão femea, *Port.*

Ex arboris foliis in oryzæ infuso coctis gargarisma paratur, quod
aphthis potenter medetur.

DILLENIA INDICA, *Linn.*; *Fl. Br. Ind.* I. 36.—*Syalita*,
Rheede Hort. Mal. III. tt. 38, 39.

Karambal phal, *Vhadj* karambal, *Konk.*; Fructa estrellada, *Port.*

Fructus hi ob nimiam aciditatem in deliciis vix comeduntur; sed in
eduliis præsertim indigenarum jusculis usurpantur. Ex arboris foliis
lixivium fit, capillorum unctuositati, ac capitis sordibus absumendis, nec
non argento decoquendo, adeoque depurando accomodum. Succus e ra-
dicibus expressus cum linteis applicatus tumores phlegmonosos ac œde-
matoes resolvit. E fructibus tenerioribus expressus succus cum saccha-
ro miscetur, ac inde syrupus conficitur, qui phlegmata incidit ac expellit,
tussim sedat, nec non faucium inflammationem, et aphthas tollit: fructus
autem maturiores laxam reddunt alvum, et diarrhoeam non raro excitant.
Denique arboris cortex cum oryzæ infuso (quod indigenæ *Ambatacansji*
nuncupant) tritus, partique affectæ illitus arthritidi medetur.

II. MAGNOLIACEÆ

MICHELIA CHAMPACA, *Linn.*; *Fl. Br. Ind.* I. 421. *Rorb.*
Fl. Ind. II. 656.—Schampakam, *Rheede Hort. Mal.* I. t. 19.

Châmpo *vulg.* châmpho, *Konk.*

Radix et cortex siccus tritus et mixtus cum lacte spisso dicto *Tayr* apostematibus aperiendis et maturandis serviunt in forma emplastri apposti; cortex radicis in pulvere cum aqua calida datus menstruis in mulieribus excitandis servit, fortumque in gravidis expellit, si largius ac copiosius sumatur: flores triti et cum oleo decocti, pro doloribus capitis, oculorum affectionibus, ut et in podagra serviunt facta capitis unctione. Aqua ex floribus distillata, præcordiis exhilarandis commoda est; oleum, in quo flores per quadraginta dies insolati sunt, in capitis perunctione ejus doloribus ac vertigini deliquio prædest; oleum fructuum flatu pellit, si cum eo corpus ungitur.

III. ANONACEÆ

UVARIA NARUM, *Wall.*; *Fl. Br. Ind.* I. 50.—Narumpandel,
Rheede. Hort. Mal. II. t. 10.

Kâjo-âpkîro, *Konk.*

Servit pro arthritico dolore juvatque in puerperis ac infantalis cum ejus decocto facta corporis lotione. Radix trita et mixta cum aqua sulcos oris in unctione sanat; eadem trita et in aqua epota addito momento sacchari confert in febre frigida uti et in ardore jecoris; eadem trita in aqua salsa seu marina servit pro vermibus ex putrefactione humorum natis facta unctione membrorum. Cortex radicis tritus et in aqua epotus proficuum est pro phlegmate et pro angina, atque eodem modo juvat in febribus ac fluxu simplici et dysenterico, uti et in ardore hepatis et oris aperturis ac scissuris. Oleum ex radice extractum servit restringendo ardori jecoris conducitque in dolore capitis, in colera exusta, halitumque gravem et male olentem reflois juvatque pro sulcis oris.

U. ZEYLANICA, *Linna.*; *Fl. Br. Ind.* I. 51.—Kaltsjerou Panel, *Rheede Hort. Mal.* v. t. 17.

Áváli-ápkáro, *Kouk.*; Pão costus de serra menor, *Port.*

Vires autem facultates hujus arbusculæ eadem sunt, ac *Norum-paet.*

ANONÁ .SQUAMOSA, *Linna.*; *Fl. Br. Ind.* I. 78.—*Rorb. Fl. Ind.* II. 657.—Ata-maram, *Rheede Hort. Mal.* III. t. 29.

Átoá, Mánil-papas, Át, *Kouk.*; Atus, Atoeira, Ateira, *Port.*

Folia hujus arboris minutim contusa, et addito sale in cataplasmatibus formam redacta, tumoribusque malignis imposita, potenter eos maturant.

Fructus vero immaturi in aqua communi cum pauçillo zinziberis decocti, vertigini medentur; at sufficienter mitigati, et in deliciis comesti valde refrigerant, alvumque reddunt laxiorem si aq^{ue} superbibatur.

A. RETICULATA, *Linna.*; *Fl. Br. Ind.* I. 81.—*Rorb. Fl. Ind.* II. 657.—Anona-maram, an Auon Oviedi, *Rheede Hort. Mal.* III. t. 30, 31.

Chín-papas, Ánan, *Kouk.*; Anona, *Port.*

Vires cum priori easdem habet.

IV. MENISPERMACEÆ

TINOSPOEA MALABARICA, *Miers.*; *Fl. Br. Ind.* I. 96.—Peg amerda, *Rheede Hort. Mal.* vii. t. 19, 20.

Vhadli-amrit-vel, Zenam, *Kouk.* Trepadeira de Ceo, *Port.*

Balneum ex hac planta et *Nela-Panna-Scelengu* præparatum abscessus inveteratos curat: folia cum *Carique de Bengala* et *Caraga* mixta, vel cum cortice *Alu* et *Sergelim* in lacte vaccino cocta, ex-anthemata resolvunt. Pulvis ut et nuclei *Manga-Solta* fissuras pedum consolidat: cocta cum aqua oryzæ pedum ulcera mundant.

T. CORDIFOLIA, *Miers.*; *Fl. Br. Ind.* I. 97: Menispermum cot-

difolium, *Roxb. Fl. Ind.* III. 811.—Cit-amerda, *Rheede. Hort. Mal.* vii. t. 21.

Charchari-vel, *Konk*

Decoctum cum summo fructu in febris ardentibus, arthritide, et ictero adhibetur, vires reficit. Ex succo et *Colutpae* ac *Tirra-tali* cum lacte balneum antispasmodicum præparatur. Tenerrima folia cum *Eamociam* et lacte trita, linimentum dant in phlegmone et erysipelate. Succus, ut et *Mulcenti*, *Tsjeru-Pulla* et *Ulinja* expressus, puris generationem præpedit et ulcera sanat. Succus caulium ablato cortice, cum lacte et aqua decoctus, et ad siccitatem evaporatus, ac oleo foliorum de *Esfermo* mixtus; linimentum, antiarthriticum est: cum saccharo potus cachexiam tollit; cum pipere longo pituitæ interperiem; cum saccharo et pipere longo bilis dyscrasiam et morbum articulare corrigit.

ANAMIRTA COCCULUS, *W. & A.; Fl. Br. Ind.* I. 98. *Menispermum cocculus*, *Roxb. Fl. Ind.* III. 807.—Natsjatam, *Rheede Hort. Mal* vii t 1.

Garumð-pha| Kák-pha| *Konk*: Fructa mata-peixe *Port.*

Integra planta cum gingibere trita pannoque oblita, pedum clavos tollit. Radix cum bubuli fæcibus et arundine Iudica concremata, per modum fumigii, idem præstat. Fructus capiendis piscibus et amovendis pediculis inserviunt.

TILIACORA RACEMOSA, *Colebr.; Fl. Br. Ind.* I. 99; *Menispermum polycarpum*, *Roxb. Fl. Ind.* III. 816.—Valli-caniram, *Rheede Hort. Mal* vii t. 3.

Rom-vel-karo, *Konk.*; Fructa parda da serra, *Port.*

Morbum curat sacrum. Decoctum foliorum, pustulas et ulcera tollit, externè nempe applicatum. Folia trita, idem præstant. Succus cum oleo *Coqui Indici* in partes æquales concoctus, capitis et dentium dolores mitigat, spontaneam corporis lassitudinem tollit; cum cera ad unguenti consistentiam redactus ulcera gravia et inveterata sanat. Radix trita et aqua oryze permixta, humores pituitosos extenuat.

CISSAMPELOS PAREIRA, *Linn. Fl. Br. Ind.* I. 103: C. caape-
lasi *Roxb. Fl. Ind.* III. 842.—Cattu-valli, *Rheede Hort. Mal.* XI t. 62.

Paça-vel, Bhat-vel *Konk.*

Ex foliis balneum præparatur adversus bulimum et malaciam. Ex radice cum careuma et serolactis trita linimentum conficitur, artuum dolores mitigans.

CYCLEA PELTATA, *Hook. f. & Thomp.; Fl. Br. Ind.* I. 104—
Paad-valli, *Rheede Hort. Ind. Mal.* vii t. 49.

Paça-vel *Konk*; Raiz de camara, *Port.*

Radix cum lacte ebutyrato et semine cumini sumpta dysenteriae et hæmorrhoidibus inservit; cum aqua calida flatus discutit. Succus foliorum expressus rubedinem oculorum solvit, et capitis dolores mitigat.

V. NYMPHŒACEÆ

NYMPHŒA LOTUS, *Linn.; Fl. Br. Ind.* I. 114: N. rubra, *Roxb. Fl. Ind.* II. 576; N. edulis *Roxb l. c.* 578—Ambel, *Rheede Hort. Mal.* XI. t. 26.

Sahuk Sâlok *Konk*; Golfo *Port.*

Bulbosa radix in decocto prodysuria propinatur. Semina ardorem ossium reficiunt, cum saccharo nempe condita et comesta; folia cum illis *Ottel-Ambel* simul trita et cum butyro cocta errhinum præbent pro oculorum doloribus.

N. STELLATA, *Willd.; Fl. Br. Ind.* I 114; N. cyanea, *Roxb Fl. Ind.* II 577, N. versicolor *Roxb l. c.*—Cit-ambel, *Rheede Hort. Mal.* xi. t. 27

Kasturi kama, *Konk.*

Flores triti in decocto pro dysuria adhibentur; cum saccharo sunt vomitum sistunt, tussim mitigant; semina cum saccharo usurpata conveniens pro diabete sunt medicamentum.

NELUMBIUM SPECIOSUM, *Willd.; Fl. Br. Ind. I 116; Roxb. Fl. Ind. II. 647.*—(1) Tamara, *Rheede Hort. Mal. xi. t. 30.*

Paq-malsalú kama, *Konk.*

Radix trita et saccharo mixta in formam conditi exhibetur pro hæmorrhoidibus. Succus é floribus extractus, et cum oleo zingelim assumptus, immodicum mensiam sistit fluxum.

(2) Bem tamara, *Rheede Hort Mal. xi t. 31.*

Nelumbis, *Konk.*

Bulbus cum butyro in unguentum redactus omnia oculorum vitia corrigit; idem cum zinjibere et coriandro in butyro coarctus pro hæmorrhoidibus applicatur.

VI. CARYOPHYLLÆ

POLYCARPÆA CORYMBOSA, *Lamk.; Fl. Br. Ind. I 245 Celsia corymbosa, Roxb. Fl. Ind. I. 681.*—(1) Kata maitosina, *Rheede Hort Mal. x. t. 66.*

Máytosiná, *Konk.*

Cum nucis indicæ succo lævigata alexipharmaca in morsu serpentis virtute præstat; præparatur et ex illa apozema antihypochondriacum.

(2) Pee-coipa, *Rheede Hort. Mal. x. t. 67.*

Kaipa *Konk*

Delirium ex endemio (Pitao) malo oriundum cessat ubi tempora hæc planta, in vaccino lacte et butyro cum sandallo trita, illinuntur.

VII. PORTULACÆ

PORTULACA OLERACEA, *Linn. ; Fl. Br. Ind I. 246 ; Roxb. Fl. Ind. II 463.*—Kará-tajera, *Rheede Hort. Mal. x. t. 36.*

Goli, Golchi-bhagi, *Konk ; Beldroega, Port.*

Trita cum oryzae lotura carbunculis medetur.

P. QUADRIFIDA, *Linna.*; *Fl. Br. Ind.* I. 247; P. meridiana, *Roxb. Fl. Ind.* II. 463. — Nela-tajera, *Rheede Hort. Mal.* x. t. 31.

Bhūmya-goli, *Konk.*

Hujus plantae cum sero lactis decoctum, famosum illum pedum tumorem, *Toddā-Vēta* dictum, discutit.

VIII. GUTTIFERÆ

CALOPHYLLUM INOPHYLLUM, *Linna.*; *Fl. Br. Ind.* I. 273; *Roxb. Fl. Ind.* II. 606. — Poona, *Rheede Hort. Mal.* IV. t. 38.

Aitī, Umdī, *Konk.* Ponnaca, Puna, *Port.*

E fructuum horum nucleis siccatis oleum exprimitur, quod in lampade ad glychnii flammam conservandam cremari solet. Idemque oleum membris dolentibus illitum dolorem jucundè tollit. Insuper ex veteri hujusmodi oleo cum cera flava unguentum conficitur, quod scabiei mædetur. Ex arboris cortice et foliis in aqua communi coctis egregium fit collyrium. E cortice radicibus detracto, et in aceto macerato extractum paratur, quod cephalgiam sanat, si caput eo fricetur. Lachryma ex arbore et fructibus stillans, collecta, et exhibita vomitum ciet, alvum movet, adeoque humores vitiosos sursum deorsumque vehementer expurgat.

C. WIGHTIANUM, *Wall.*; *Fl. Br. Ind.* I. 274. — Tojenou Poona, *Rheede Hort. Mal.* IV. t. 39.

Sitā aitī, Lāhān umdī, *Konk.*; Ponnaca pequena, Puna pequena, *Port.*

Fructus hi ab indigenis comeduntur. E nucleis horum siccatis quoque oleum exprimitur, quod in lampade comburi solet. At in medicina arboris hujus partes nullum habent usum.

MESUA FERREA, *Linna.*; *Fl. Br. Ind.* I. 277; *Roxb. Fl. Ind.*

11. 605. — Belluta Tsjampakam, *Rhæde Hort. Mal.* III. t. 53.

Nágchámpo, Vhadlo chámpo, *Konk.*; Moroino rozado, *Port.*

Radix hujus arboris cum zinzibre recenti contusa si assumatur, sudores potenter expellit. Similiter arboris cortex cum assumptus, tum sub pulveris formâ vulneris adhibitus, serpentum morsibus medetur. Ex foliis in lacte dulci coctis, et addito oleo palmæ contusis, cataplasma conficitur, quod vertici impositum viscidos et pituitosos in cerebro collectos humores incidit, attenuat, et per nares expurgat, adeoque gravēdinem et catarrhum sanat; ipsum vero foliorum decoctum potum phlegmata incidendo, attenuando ac expellendo tassim curat. Fructus recentes cum melle cocti alvum emolliunt et laxant; siccati autem adstringunt, ex iisque oleum exprimitur, quod artubus illitam quoscunque illorum dolores jucundè tollit.

IX DYPTEROCARPEÆ

ANCISTROCLADUS HEYNEANUS, *Wall.*; *Fl. Br. Ind.* I. 299.
— Valli Modagam, *Rhæde Hort. Mal.* VII. t. 46, 47.

Karoth ॐ, *Konk.*; Folha da pa., *Port.*

Cortex radiceis cum cortice limonum in pulverem redactus, ulceribus, quæ Malabaribus *Tojesu-Barapén* vocantur, cum successu perlinetur.

VATERIA INDICA, *Lin.*; *Fl. Br. Ind.* I. 313; *Roxb. Fl. Ind.* II. 602. — Pasnoe, *Rhæde Hort. Mal.* IV. t. 15.

Dupaii *Konk.*; Arvore Encenza *Port.*

Fructum nuclei contusi et cum aqua calida super porphyritem lævigati, et exhibiti ventriculum roborant, nauseam et vomitum tollunt, ventris cruciatus mitigant, choleram sanant. Ex arboris resina cum alba, et sesami oleo eliquata præstans fit balsamum vulnerarium: eademque resina pulverisata et exhibita virulentam gonorrhæam, aliqua venerea accidentia potenter sanat.

X MALVACEÆ

SIDA MYSORENSIS *W. & A*; *Fl. Br. Ind.* I. 322; *S. glutinosa* *Rozb. Fl. Ind.* III. 172—*Nella-vaga*, *Rheede Hort. Mal.* X. t. 69.

Dhãkti tupkañi, *Konk.*

Balneum ex hac planta præparatur anticephalicum.

S. CARPINIFOLIA, *Linn.*; *Fl. Br. Ind.* I. 323; *S. acuta*, *Rozb. Fl. Ind.* III. 171—*Tsjeru-parna*, *Rheede Hort. Mal.* X. t. 53.

Foliorum succus cum lacteo nucis Indicæ coagulo mixtus, hypotonicæ vel linimenti formam redactus, dolores mitigat nephriticos; radix cum aqua communici trita erysipelati resistit.

S. RHOMBIFOLIA, *Linn.*; *Fl. Br. Ind.* I. 323; *Rozb. Fl. Ind.* III. 176—*Kurundoti*, *Rheede Hort. Mal.* X. t. 18.

Tupacañi Tupkañi, *Konk.*

Pectoris et abdominis cæsus potione ex hac planta confecta mitigatur; nervorum vulnera juvat, lævigata hujus planta radix; quæ insuper cum pipere decocta et exhibita in algidis proficit febribus; cortex cum *Carega-Pullu*, butyro et lacte muliebri tritus, pectori, abdomini, temporibus læsique nervis illitus, convulsionibus ex gravibus vulneribus medetur.

S. CORDIFOLIA, *Linn.*; *Fl. Br. Ind.* I. 324; *Rozb. Fl. Ind.* III. 177.—*Katu-aren*, *Rheede Hort. Mal.* X. t. 54.

Integra planta aquæ incocta, in totum diuretica est. Radix in pulverem redacta et cum pipere assumpta, algidam deprimit febrem. Eadem et oleum exprimitur.

ABUTILON INDICUM, *G. Don*; *Fl. Br. Ind.* I. 326; *Sida Indica*, *Rozb. Fl. Ind.* III. 179—*Beloere*, *Rheede Hort. Mal.* VI. t. 45.

Tapacodo, vhadñi petãri, *Konk*; *Fructa gargantilha*, *Port.*

Foliorum pulvis intestinis alienus est, hypercatharsin enim excitat

facillime. Radix quæ olei inservit alias coctioni, si eandem facultatem et alias herbas, lepræ prodest; contritum et calide assumptum semen citat alvum.

URENA SINUATA, *Lin.*; *Fl. Br. Ind.* I. 329; *Rorb. Fl. Ind.* III. 182.—Uren, *Rheede Hort. Mal.* X. t. 2.

Tupu-kadu, Tupkado, *Konk.*

Radix in confectione olei adhibetur.

HIBISCUS SURRATENSIS, *Lin.*; *Fl. Br. Ind.* I. 334; *Rorb. Fl. Ind.* III. 205.—Narinan-Poulli, *Rheede Hort. Mal.* VI. t. 44.

Ambeti, *Konk.*; Fula gafinhota, *Port.*

Folium hujus fruticis oculorum pterygio impositum, submovet. At ex foliis hisce, adjectis pipere, zinzibere, lacte nucisque Indicæ succo, expressus liquor, resistit fluxionibus. Plantæ pedis æstus balneo ex radice parato facile discititur.

H. VITIFOLIUS, *Lin.*; *Fl. Br. Ind.* I. 338; *Rorb. Fl. Ind.* III. 200.—Katu-Beloreen, *Rheede Hort. Mal.* VI. t. 46.

Daculo bondakalo, Dhâkato kâlo bheindo, *Konk.*; Fructa barrete *Port.*

Radix olei butyricæ inservit confectioni: item ex ea conficiuntur globuli fonticulis non inutiliter immittendi: è foliis chirurgi, ut ipsorum utar voce, lavamentum parant ulceribus ac erysipelati convenientissimum.

H. ABELMOSCHUS, *Lin.*; *Fl. Br. Ind.* I. 342; *Rorb. Fl. Ind.* III. 202.—Cattu-Gasturi, *Rheede Hort. Mal.* II. t. 38.

Bonda-Calo, Kâlo bheindo, *Konk.*

Servit pro *Rosulbandt* si cum semine ejus trito et mixto cum stercore vaccæ perungatur corpus.

H. TILIACEUS, *Lin.*; *Fl. Br. Ind.* I. 343; *Rorb. Fl. Ind.* III.

192 : *H. tortuosus*, *Roxb. Fl. Ind. l. c.*—Pareti, *sep Tali-Pareti*, *Rheede Hort. Mal. I. t. 30.*

Cari-Capusi, Khári Khápusi, *Konk.*

Flores triti cum lacte mulieris auribus induntur pro doloribus capitis.

H. ROSA SINENSIS, *Linna. : Fl. Br. Ind. I. 344 ; Roxb. Fl. Ind. III. 194*—(1) Aiu Pariti, *Rheede Hort. Mal. VI. t. 48.*

Desura, Kaprasita, Darsúg, *Konk.* Fula de sapato *M. Port.*

Contrita folia atque ex aqua exhibita iis qui ex variolis febricitant, eorum copiosam inhibent eruptionem, precondiorum temperant restumem butyro nimium menstruorum fluxum : ex oleo cum foliis *Cacca-muli* coacta, unguentum prestant vulneribus aptum. Et florum gemmis decoctum mulieres reddit steriles. Ipse autem oculis illitico ophthalmiam tollunt. At flores aparti recentesque ex butyro triti, aphthiis mederi iucolis dicuntur.

(2) Schem Pariti, *Rheede Hort. Mal. II. t. 17.*

Darsúg, *Konk.*

Radix trita et cum oleo epota fluxum menstruum mulierum redundantem sistit. Folia tenera trita addito momento butyri recentis apostematata maturant iis superimposita, eadem in aqua in qua folia per tempus macerata sunt epota pro variolis conducit, uti et pro ardore jecoris addito momento sacchari.

THESPESIA POPULNEA, *Corr. : Fl. Br. Ind. I. 345 ; Hibiscus populneus, Roxb. Fl. Ind. III. 190.*—Bupariti, *Rheede Hort. Mal. I. t. 29.*

Valli-Cari-Capsesi, Bheñi, *Konk.*

Folia ulcerum sanationi servant iis applicata.

GOSSYPIUM ARBOREUM, *Linna. : Fl. Br. Ind. I. 347 ; Roxb. Fl. Ind. III. 183*—Cudu-Pariti, *Rheede Hort. Mal. I. t. 31.*

Capussi, Kâpsîl, *Konk.* Algodeiro *Port.*

Folia trita et cum lacte vaccæ in unctione capitis adhibita somnum conciliant, atque eodem etiam modo sedant dolores capitis ac ejus vertiginem. Fructus triti et in aqua epoti fluxui dysenterico sistendo conferant serviuntque pro sulcis oris.

BOMBAX MALABARICUM, *D. C.*; *Fl. Br. Ind.* I. 349: *Bombax heptaphylla*, *Fl. Br. Ind.* III. 167—Moul-Elavon, *Rheede Hort. Mal.* III. t. 52.

Vali-Sanvari, Vhadjî sâmvâr, *Konk.*; Algodão do mato, *Panheira Port.*

Arboris cortex pulverisatus, et cum succo limonum in linimenti formam redactus inflammationes compescit quascumque, et ossium fracturas consolidat; cum adusto autem è nucle Indica vino si permisceatur, pro linimento ad herpetem usurpatur. E radice vero cortice egregium fit vomitorium. Humor ille dulcis, qui in floris sine colligitur, cum *Balan-pulli* aut tamarindi foliis exhibitus, quoscumque aquosos humores per alvum et vesicam potenter educit.

ERIODENDRON ANFRACTUOSUM, *D. C.*; *Fl. Br. Ind.* I. 350: *Bombax pentandrum*, *Rarb. Fl. Ind.* III. 165—Panja, *Panjala*, *Rheede Hort. Mal.* III. tt. 49, 50, 51.

Sangori, Sâmvâr, *Konk.*; Algodão, do mato *Port.*

Fructuum horum lanugo seu gossypium colligitur, ex eoque lectuli et pulvinaria fiunt, quæ summam ob mollitiem pluris æstimantur. Arboris radix siccata gestatur ad spasmodum præcavendam. Flores fructusque teneriores in cataplasmatibus formam contusi, ac capiti impositi cephalalgiam et vertiginem tollunt.

XI. STERCULIACEÆ

HERITIERA LITTORALIS, *Dryand.*; *Fl. Br. Ind.* I. 363: *Rarb. Fl. Ind.* III. 142—Nagam, *Rheede Hort. Mal.* VI. t. 21.

Gonpajada, Gonconi, *Konk.*; Fructa gundru, *Port.*

Foliorum succus cum nucis Indicæ oleo ventri illitus, lunaticam ejus intumescenciam dispellit.

HELICTERES ISORA, *Linna.*; *Fl. Br. Ind.* I. 365; *Roxb. Fl. Ind.* III. 143—*Isora-Marri*, *Rheede Hort. Mal.* VI. t. 30.

Tanini, *Konk.*; Pao de chanco, *Port.*

Vires egregias in empyemate stomachique affectibus præstat radicis succus, vel ipsa forinsecus adhibita. In exanthemate, quoque et paneritio similibusque vitiiis sanare conducere fertur.

PTEROSPERMUM GLABRESCENS, *W & A.*; *Fl. Br. Ind.* I. 369—*Solda*, *Rheede, Hort. Mal.* VI. t. 58.

Siri Padá, *Konk.*; Fula do Maio, *Port.*

Folia apposita testiculis eorum dissipant tumores, pulverisata medentur enteroceli.

MELOCHIA CORCHORIFOLIA, *Linna.*; *Fl. Br. Ind.* I. 374; *Roxb. Fl. Ind.* III. 139.—*Tsjeruuren*, *Rheede. Hort. Mal.* IX. t. 78.

Integra planta, excepta radice, cum similibus ejusdem energie in oleo decoquitur, et efficax, pro morsa serpentis aquatici, remedium præstat.

XII. TILIACEÆ

GREWIA ORIENTALIS, *Linna.*; *Fl. Br. Ind.* I. 384; *Roxb. Fl. Ind.* II. 586.—*Pai-Paroea*, *Rheede Hort. Mal.* V. t. 46.

Beindarli, *Konk.*; Garsilha, *Port.*

Ex arboris foliis, radicibus, fructibusque in aqua coctis apozema conficitur, quod in arthritide perquam utile perhibetur.

G. MICROCOS, *Linna.*; *Fl. Br. Ind.* I. 392; *G. ulmifolia*, *Roxb. Fl. Ind.* II. 591—*Schageri-cottam*, *Rheede Hort. Mal.* I. t. 56.

Sasali, Ámsáli, *Konk.*

Ardori membrorum restringendo servit succus ejus expressus, ac cum saccharo sumptus, cum ejus decocto os abluatur pro colica ac

tum-factæ relaxatione. Foliorum succus cum saccharo epotus maxime conducit pro hepate et fluxu ventris, ejus lotio pro oris pustulis uti et in angina cum eodem succo mixto cum aceto guttur commode abluatur. Eoram decoctum cum saccharo epotum proficuum est pro febre frigida.

XIII. LINEÆ

HUGONIA MYSTAX, *Linn.* ; *Fl. Br. Ind.* I. 413—Modera-canni. *Rheede Hort. Mal.* II. t. 19.

Padavakayi, *Konk.*

In lotionne corporis adhibitus humores erocat. Radix inflammationibus partium solandis et tumoribus resolvendis confert trita et iis apposita : eadem præsentaneum remedium est pro ictu virulento colubri : usurpatur quoque pro febribus præcipue infantium, intestinorum torminibus, dolore colico et verminum enecatione, estque sudorifica et urinam ciens artusque corroborans. Ex radicis cortice alexipharmacum contra venena formatur.

XIV. GERANIACEÆ.

BIOPHYTUM REINWARDTII, *Walp.* ; *Fl. Br. Ind.* I. 437—Todda-vaddi, *Rheede Hort. Mal.* IX. t. 19.

Lacheri, *Konk.*

Semina trita et vulneribus apposita medetur illis, et cum butyro apostemata sanat, cum oleo *Sirgeolium* trita et epota gonorrhæam sistit : radix in decocta data calculos infringit.

AVERRHŒA CARAMBOLA, *Linn.* ; *Fl. Br. Ind.* I. 439 ; *Rorb.* *Fl. Ind.* II. 450—Tamara-Tonga seu Carambolas, *Rheede Hort. Mal.* III. t. 43, 44.

Karonalam, *Konk.* ; Caramboleira, *Port.*

Succus autem è radicibus hujus arboris expressus, et assumptus, restum febrilem compescit. E foliis contusis cum oryza infuso cataplasma

verò è follis hisee in oryze infuso decoctis aut maceratis egregium fit decoctum vulnerarium. Succus è fructibus expressus pruritu, impetiginem, psoram, similesque affectus cutaneos sanat, si linteis parti affectæ subinde admoveatur; idemque succus, si cum adusto nucis Indicæ vino (quod vulgo *Araque* dicitur) propinetur, alvi cruciatus lenit et diarrhoeam sistit. Insuper è follis hisee contusis, et cum succo è palmas floribus expresso cataplasma paratur, quod inflammationibus quibuscunque medetur. E fructibus exsiccatis et cum follis Beteleæ contusis pulvis fit cum nucis Indicæ vino adusto propinatus labores parturientium promovet, nec non fetam mortuam et secundinas expellit. E fructibus immaturis succus exprimitur, qui in vestes incidens suo acore colores exedit; atque ideo ad maculas quascunque è linteis delendas frequenter usurpatur; colores etiam ad linteas tingenda ex eo parantur; nec non cum fructibus immaturis Aurifabri vasa argentea decoquere et depurare solent.

A. BILIMBI, *Lin.*; *Fl. Br. Ind.* I. 439; *Rarb. Pl. Ind.* II 451—Bilimbi, *Rhæde Hort. Mal.* III. t. 45, 46.

Malaki-Karumboli, Bilimbi, *Konk.*; Bilimbinos, *Port.*

Singule vero hujus arboris partes eisdem habent vires, eandemque in medicina usum cum *Tamara-tonga*. Fructus maturi in deliciis quoque comeduntur, immaturi saccharo, aut aceto et muria condiuntur. Et quamquam maturi subacidi, gratique sint saporis; immaturi tamen acerbi, adeo ut stupor dentium ex acidorum esu contractus, hisee fructibus comestis obfuscet.

XV. RUTACEÆ

ZANTHOXYLUM RHETSA, *D. C. Fl. Br. Ind.* I. 495; Fagara Rhetsa, *Rarb. Pl. Ind.* I. 417—Mouli-ila, *Rhæde Hort. Mal.* V. t. 34.

Tipali, Agadini, Timpli *Konk.*; Limão pimentoso, *Port.*

Fructus saccharo vel melle condiuntur, et comeduntur ad ventriculum roborandum, alimentorum in eo fermentationem juv. n. d. u.

vermesque necandos : insuper muriâ et aceto condiuntur in *atsjaar*, additis *viz.* aliis, sinapi, et zinzibere.

TODDALIA ACULEATA, *Pers.* ; *Fl.* ; *Br. Ind.* I. 497 ; Scopolia aculeata, *Rozb. Fl. Ind.* I. 616—Kaka-Toddali, *Rheede Hort. Mal.* V. t. 41.

Borimți, *Konk.* ; Espinho do ladrão, *Port.*

Ex radice et viridibus fructibus in oleo frixis linimentum paratur contra dolores arthriticos. Ex foliis in aqua coctis balneum conficitur ad cachexiam, anasarcam, pedum tumores oedematosos, similesque affectus ex abundante sero natos, tollendos.

ACRONYCHIA LAURIFOLIA, *Blume* ; *Fl. Br. Ind.* I. 489—(1) Perin-Panel, *Rheede Hort. Mal.* V. t. 15.

Kájo ápakáro Kuñti, *Konk.* ; Pao costus, *Port.*

Ex fruticis hujus, seu arbusculæ foliis siccatis, et prunis impositis, suffumigium fit, quod paroxysmos hystericos potenter solvere fertur.

A. (2) Béenel, *Rheede Hort. Mal.* V. t. 4.

Mana, *Konk.* ; Catasa, *Port.*

Ex arboris radice in sesami oleo cocta linimentum paratur, contra cephalæam, artuumque dolores inveteratos.

MURRAYA KOENIGII, *Spreng.* ; *Fl. Br. Ind.* I. 503 ; *Bergera Koenigii*, *Rozb. Fl. Ind.* II. 375—Karibepu, *Rheede Hort. Mal.* IV. t. 53.

Kađi-ben, Kađi nimba *Konk.* ; Amargoseira *Port.*

Porro é frutibus hisce oleum exprimatur. Ex arboris foliis tenerioribus in lacte dulcis coctis, et contusis Cataplasma conficitur, quod serpentum, aliorumque venenatorum animalium morsibus medetur, si affectæ parti applicetur. Ex iisdem cum *Aria-bepon* foliis in aqua coctis Apozema paratur, febribus pestilentialibus, aliisque morbis malignis perquam utile. Radix quocumque modo sumpta alium movet.

LIMONIA ACIDISSIMA, *Linna.*; *Fl. Br. Ind.* I. 507; *L. crenulata*, *Roxb. Fl. Ind.* I. 507—Tsjerou-katou naregam, *Rheedé Hort. Mal.* V. t. 14.

Sti-rân-liñbí, *Koak.*; Limões da folha cruzada, *Port.*

Arboris hujus folia presentaneam habentur curandæ epilepsie remedium. Radix alvum movet, sudores expellit, nec non cruciatibus colicis, et Cardialgiæ medetur. Fructus siccati stomachum roborant, ac alimentorum in eo fermentationem læsam restitunt; adhuc aëri ex variolis, febribusque malignis et pestilentialibus contagioso potenter resistunt, atque variis venenis præstantissimum censentur antidotum; quamobrem magni æstimantur, et ab Arabibus, aliisque mercatoribus avidè expectantur.

ATALANTIA MONOPHYLLA, *Correa*; *Fl. Br. Ind.* I. 511; *Limonia monophylla*, *Roxb. Fl. Ind.* II. 378—Mal-Naregam, *Rheedé Hort. Mal.* IV. t. 12.

Nâni, Râu-liñbí, *Koak.*; Limão do mato, *Port.*

Decocta in oleo arboris hujus folia, ac capitæ applicata cephalæam tollunt: eorundemque succus præstans habetur erithium capiti purgando. Expressus è fructibus succus endemicæ illi Cachexiæ (pitao) medetur. E sola denique radice pilulæ formantur antispasmodicæ.

ÆGLE MARMELOS, *Correa*; *Fl. Br. Ind.* I. 516; *Roxb. Fl. Br. Ind.* II. 579—Covalam seu Cytodonia exotica, *Rheedé Hort. Mal.* III. t. 37.

Belou, Bel, *Koak.*; Marmeleira, *Port.*

Hi autem fructus teneri saccharo vel aceto condiuntur: maturiores vero in deliciis comeduntur. Ex arboris cortice et radicalis cum aqua communi decoctum paratur, quod melancholiam hypochondriacam, cordis palpitationem, et lypothymiam sanat. Ex eadem cortice in subtilem pulverem redacto et melli admixto electuarium conficitur, quod mane sumptum alimentorum in ventriculo fermentationem juvat, capitis dolorem ac vertiginem tollit. Foliorum decoctum asthmatis medetur. Ex floribus aqua destillatur cardiaca et alexipharmica. Fructus denique vix maturi diarrhæam et dysenteriam sistunt.

XVI. SIMARUBEÆ.

AILANTHUS MALABARICA, *D. C.*; *Fl. Br. Ind.* I. 350—Pong-lion, *Rheede Hort. Mal.* VI. t. 15.

Sariñá, *Konk.*; Favas de tres una, *Port.*

Lignum in cultorum ensiumque efformatur vaginas; folia contrita aquam eleganter tingunt. Contuso è cortice excoctum oleum, corpori illitum humores vitiosos educit. Extillans ex arbore succus cum lacte ebutyrato epotus, flatus discutit. Fructus cum *Munja* tritirati, oryzaeque decocto immixti, cephalalgiae ut ophthalmiae, oculis injecti uidentur.

SAMADERA INDICA, *Gertn.*; *Fl. Br. Ind.* I. 519;—Karin-Njoti, *Rheede Hort. Mal.* VI. t. 18.

Lokandi, *Konk.*; Fructa sancta, *Port.*

Arboris hujus folia, bilivum præstant febres fugans algidas; contrita vero erysipelati occurrunt: temporibus adfricta, colubri cujuscumque adversantur veneno. Eorum oleo incoctus succus linimento psudracie est. E fructibus autem primo conficitur oleum articulari, dein potio, cholerae medens morbis. Radici Boream versus excrescenti magis Malabarici attribuant vires.

XVII. OCHNACEÆ.

GOMPHIA ANGUSTIFOLIA, *Vahl*; *Fl. Br. Ind.* I. 525—(1)
Tajocutti *Rheede Hort. Mal.* V. t. 48.

Válermani, *Konk.*; Fala paolista, *Port.*

Ex arboris foliis cum sero lactis decoctio conficitur, quæ in Cardialgia valde commendatur. Ex iisdem foliis cum floribus et fructibus in aqua communi coctis oris collutio fit ad erosas gingivas sanandas, dentesque vacillantes firmandos. Ex radice cum cumini semine in lacte cocta potus conficitur, qui potenter vomitum sedat. Eadem radix tanquam amuletum ventri appensa colicos dolores mitigare perhibetur.

(2) Pocatsjetti, *Rheede Hort. Ind. Mal.* V. t. 52.

Gara Kank. : Fructa harrete, *Port.*

Folia contusa, in pulverem redacta, et ulceribus inspersa luxuriantem ac fungosam carnem tollit. Eadem assumpta sudores movendo febribus intermittens paroxysmum minuit. Ex cortice et radice pulverisatis, ac cum oleo mixtis unguentum conficitur ad scabiem, similesque cutaneos affectus.

XVIII. BURSERACEÆ.

GARUGA PINNATA, *Rorb. ; Fl. Br. Ind.* I. 528 ; *Rorb. Fl. Ind.* II. 400—Katon-kalesjam, *Rheede Hort. Mal.* IV. t. 53.

Moenoë, Kunák, Kank. : Arvore da folha parida (macho,) *Port.*

Arboris hujus folia variis modis, tum intrinsecus, tum extrinsecus usurantur ad varios hepatis affectus, ex hisque apozemata, cataplasmata, similiaque preparantur medicamenta.

XIX. MELIACEÆ.

NAREGAMIA ALATA, *W. & A. ; Fl. Br. Ind.* I. 542—Nela-Naregam, *Rheede Hort. Mal.* X. t. 22.

Tinpâni, Pitmâri, Kank. : Trifolio, Ipecacanha de Goa, *Port.*

Succus ex singulis hujus plantæ partibus extractus cum oleo nucis Indicæ. Ritus psoram delet. Ex radice affusa aqua, potiuncula adversus febres epilepsiam concomitantes preparatur, pulverisata antidotum est contra notum illum morbum *Pitao* dictum.

MELIA AZADIRACHTA, *Lean. ; Fl. Br. Ind.* I. 544 ; *Rorb. Fl. Ind.* II. 394—Aria-Bepou *Rheede Hort. Mal.* IV. t. 52.

Nimbon, Nimb Kank. ; Amargossira, *Port.*

E fructibus hujus arboris oleum exprimitur, è quo pictores colores

conficiant panis gassypinis pingendis. E foliis in aqua coctis balneum paratur, variolis expellendis, et articulorum doloribus mitigandis utile. Ex iisdem foliis siccatis, pulverisatis, et cum oleo e fructibus expresso mixtis unguentum conficitur, quod partibus dolentibus, convulsis, et spasmo affectis utiliter inungitur.

XX. OLACINÆ.

CANSJERA RHEEDII, *Guod. : Fl. Br. Ind. I. 582* ; C. scandens, *Rozb. Fl. Ind. I. 441*—(1) Tsjeren-carinam, *Rheede Hort. Mal. VII. t. 2.*

Tilo-Káro, *Konk.* ; Fructa parva pequena, *Port.*

Succus ut et *Tsjétti Mulla*, ulcerosam scabiem et artuum dolores tollit.

(2) Scheru-Vali-Carinam, *Rheede Hort. Ind. Mal. VII. t. 4.*

Dhavo-roma-káro, *Konk.* ; Fructa parva (trepadeira), *Port.*

Succus cum oleo decoctus et capiti impositus humores pituitosos elicit.

XXI. RHAMNÆ.

ZIZYPHUS JUJUBA, *Lamk. ; Fl. Br. Ind. I. 632* ; *Rozb. Fl. Ind. I. 608*—Perin-toddali, *Rheede Hort. Mal. IV. t. 41.*

Bori, Bor, *Konk.* ; Tarilla, Jujubeira, *Port.*

Fructus hi maturi ab indigenis comeduntur ; minus auri vero sale et aceto in Aatsjaar condiuntur. Arboris folia usurpantur ad gemmas quascunque fricandas ac poliendas. E foliis in lacte dulci coctis potio paratur, quæ gonorrhæe virulentæ medetur. Ipsa vero folia cocta umbilico, cataplasmatibus in modum imposita, dysuriam et stranguriam tollunt. Corticis expressus succus aphtharum perhibetur remedium. Succus e radice expressus, atque cum Ricini semini, et lactis sero exhibitus potenter ventrem subducit, vitiososque humores expurgat. Ex radice pulvere cum oryzae farina, et butyro cataplasma fit, quod

fronti admotum delirium compescit, et somnum provocat. E radice in sesami oleo cocta balsamus conficitur, qui membris dolentibus illitus, arthriticum dolorem mitiget.

SCUTIA INDICA, *Brongn. : Fl. Br. Ind. I. 640* ; Rhannus lucidus, *Roxb. Fl. Ind. I. 605*—(1) Vetadagon, *Rheede Hort. Mal. V. t. 30.*

Polt, *Konk.* ; Nani, *Port.*

Ex arboris foliis contusis, et cum Sesami oleo coctis linimentum paratur, quod abdomini illitum difficili partui succurrere, et retentas secundinas expellere fertur.

(2) Kal-vetadagon, *Rheede Hort. Ind. Mal. V. t. 31.*

Adoli, *Polt, Konk.* ; Nani da serro, *Port.*

Vires et facultates hujus arboris eadem sunt, ac praeccedentis.

XXII. AMPELIDEAE.

VITIS QUADRANGULARIS, *Wall. : Fl. Br. Ind. I. 645* ; Cissus quadrangularis, *Roxb. Fl. Ind. I. 407*—Tsjangelam-parenda, *Rheede Hort. Mal. VII. t. 41.*

Maua, *Mhoavel, Konk.* ; Babosa quinada, *Port.*

Folia contrita aurium fuligines mundant ; succus cum cardamomo, coriandro ac gingibere suuatas, intestinorum flatus discutit.

V. REPENS, *W. & A. : Fl. Br. Ind. I. 646* ; Cissus cordata, *Roxb. Fl. Ind. I. 407*—Meriam-palli *Rheede Hort. Mal. VII. t. 48.*

Bsil, *Konk.* ; Folha-aredilha, *Port.*

Ex foliis balneum antiporraliticum conficitur. Eorundem et *Nectar* succus ophthalmiam tollit.

V. GLAUCA, *W. & A. : Fl. Br. Ind. I. 648* ; Cissus glauca, *Roxb. Fl. Ind. I. 604*—Schunamb-valli, *Rheede Hort. Mal. VII. t. 11.*

Kadâ-vel, *Konk.* ; Uvas d'enfermos, *Port.*

Insigne medicamentum hic frutex est ; succus expressus cum oleo coctus, ac formâ emplastri adhibitus crassos digerit humores. Decoctum cum saccharo, in febribus ardentibus et plenritide summo cum fructu exhibetur : aqua ex trunco stillatitia cum saccharo idem præstat, tussim lenit, sanguinem purificat, vomicam pulmonum curat. Radix trita et aquâ cocta odontalgiam amobet (amovet?) et fœtorem gingivarum : cortex tritus incarnationem ulcerum promovet.

V. INDICA, *Linna.* ; *Fl. Br. Ind. I. 658* ; *Roxb. Fl. Ind. I. 660*—Schembra-valli, *Rheede Hort. Mal. VII. t. 6.*

Rân-dâk, *Konk.* ; Uvas dos bugioa, *Port.*

Succus cum oleo mixtus Ictericum oculorum tollit. Radix trita, cum oleo et lacte coqui Indici, pustulas, carbunculos et apostemata sanat : Succus radiceis cum saccharo, catharticum est, humores pituitosos evacuat.

V. RHEEDIA, *W. & A.* ; *Fl. Br. Ind. I. 653* ; Karetâ-Tsjori-valli, *Rheede Hort. Mal. VII. t. 45.*

Dhavî sarabari-vel, *Konk.* ; Uvas de boi, *Port.*

Folia siccata, pulverisata, zingibere sicco, vetusto pipere et saccharo commixta asthmaticis prosunt.

V. CARNOSA, *Wall.* ; *Fl. Br. Ind. I. 654* ; *Cissus carnosa Roxb. Fl. Ind. I. 409*—Tsjori-valli *Rheede Hort. Mal. VII. t. 9.*

Sarabari-vel, *Konk.* ; Uvas d'aljufre, *Port.*

Ex foliis cum medulla nucis Indicæ contritis, fit unguentum contra Colicam. Radix in aqua oryze cocta et expressa, ulcera sanat.

V. LANCEOLARIA, *Roxb. (Cissus) Fl. Br. Ind. I. 660* ; *Cissus lanceolaria Roxb. Fl. Ind. I. 412*—Vallia-Tsjori-Valli, *Rheede Hort. Mal. VII. t. 8.*

Chorâl, *Konk.* ; Uvas de tove (?) *Port.*

Flores asthmati conveniunt. Flores mense junio et julio ; Fructus Octobri et Novembri leguntur ; asthmati conveniunt.

V. PEDATA, *Vahl* ; *Fl. Br. Ind.* I. 661 ; *Cissus pedata*, *Roxb. Fl. Ind.* I. 413—*Belutta-tsjori-valli*, *Rheede Hort. Mal.* VII. t. 10.

Sarabõri-vel, *Konk.* ; Uvas d'aljofre, *Port.*

Folia matura cum rasura nucis Indicæ scabiem tollant ; cum oleo mixta et concocta vulnere sanant ; succus calci admixtus, populus curat.

LEEA SAMBUICINA, *Willd.* ; *Fl. Br. Ind.* I. 666 ; *Roxb. Fl. Ind.* I. 657—*Nalugu*, *Rheede Hort. Mal.* II. t. 26.

Dino, Dinãdi, giõo, *Konk.* ; *Ratanhia do paiz*, *Port.*

Radix in decocto datâ dolores stomachi compositi uti et dolores colicos et intestinorum tormina. Decoctum ex ligno epotum sedat sitim in segrotis. Folia trita et igne tosta vertiginem et debilitatem capitis tollunt iis apposita. Foliorum decoctorum vapor exceptus proficius est pro dolore arthritico. Succus ex foliis teneris expressus et epotus stomachi concoctionem adjuvat. Ex foliis teneris tritis cum oriza et a sis paritur cibus in forma placentalæ, qui infantibus datur in cursu simplici.

XXIII. SAPINDACEÆ.

CARDIOSPERMUM HALICACABUM, *Lin.* ; *Fl. Br. Ind.* I. 670 ; *Roxb. Fl. Ind.* II. 202—*Ulinja*, *Rheede Hort. Mal.* VIII. t. 28.

Pira-dukka, Kãmphulã, *Konk.* ; *Fructa-bolsa-china*, *Port.*

Planta cum aqua trita et affectæ parti illita, arthritiditem curat et artuum ex frigore rigiditatem. Ex foliis succus elicitor, et cum oleo foliorum de *Enfermo* seu *Zit Avanaen* mixtus, alvum ciet : ideò tepidus cum successu arthriticis propinatur ; cum nigro cumini semine juncturam ex cardialgia ortam abigit. Folia trita tussi medentur ; cum impuriore saccharo mixta, et in oleo concocta, oculorum vitis auccurrit.

SAPINDUS TRIFOLIATUS, *Lin.* ; *Fl. Br. Ind.* I. 682 ; *S. lau-*

rifolia, *Roch. Fl. Ind.* II. 278—*Poerinsii*, *Rhede Hort. Mal.* IV. t. 19.

Ouriñthi, Rimgi, Rimthi, Dâmitasi, Rimgi, *Konk.*; Selão dos canarins, *Port.*

Ex arboris hujus ligno citharæ conficiuntur, et pectines. Fructus pannis lavandis et abstergendis inserviunt: ii namque in aqua triti instar saponis albicantem ea reddunt, lixiviale, et spumosam qua ad lis pannos lavandos et abstergendos requiritur. Ad hæc cum spumosa et lixiviali hæc aqua Aurifabri vasa argentea decoquere solent, et depurare. Porro ejusdem saponariæ aquæ spuma temporibus illita cephalalgiam, nec non febrem tollere dicitur. Fructuum in aqua communi infusio aut decoctio spumescens, si exhibeatur, colicos cruciatus mitigat; nec non variis modis ad alios affectus intrinsecus et extrinsecus usurpatur. E foliis in aqua communi coctis Balneum fit antiarthriticum: Ex iis pariter et recente zinzibere, ac cumini semine in aqua communi decoctio fit, ventris tormina sedans, flatuque discutiens. Radix cum oryzae infuso trita, et exhibita paralyti, nec non sævis articulo- rum doloribus medetur.

XXIV. ANACARDIACÆ.

MANGIFERA INDICA, *Linna.*; *Fl. Br. Ind.* II. 13; *Roch. Fl. Ind.* I. 641—*Mao, Mau, Mangas*, *Rhede Hort. Mal.* IV. t. 1, 2.

Âmbo, *Konk.*; Manga, *Mangueira, Port.*

Cantes vicem Araquæ seu Kaungæ subeunt in manducatione Betel, iidemque calcinati ac in pulverem redacti verrucas tollunt. Ex foliis tenerioribus, corticibus *Avanacoe* hoc est ricini, semine cumini, et *Parypadagam* decoctio fit, quæ tussi, asthmati, aliisque thoracis affectibus summopere prodest. Arboris cortex in pulverem redactus et cum jusculo gallinaceo exhibitus, sanguinem ex casu alicubi extravasatum et coagulatum egregiè dissolvit. Expressus e cortice succus cum albumine ovi, et tantillo opii assumptas presentaneum contra diarrhæam, dysenteriam, et tenesum remedium est: similiter ex arboris gummi, et floribus oryzae, addito opii et piperis pauxillo pilulæ conficiuntur, quæ cui- cumque alvi fluxui medentur. Fructus denique albato cortice comeduntur aut sine vino, aut generoso aliquo vino macerati, veluti persicæ. Co-

quantur etiam, et coeti ut mala et pyra usurpantur, vel varia eiborum genera ex iis conficiuntur. Non raro conservantur melle aut saccharo; interdum verò aceto et muria, inspersis in eorum medullis alliis, sinapi, et zinzibere, condiantur in *atsjoar*. Cæterum fructus hi frigidi et humidi sunt, tametsi vulgus calidos constituat, et multas rosiones in eorum, qui veseuntur, ventriculo parere affirmet: Quin et Iudigenæ medici calidos faciunt, et vituperant, conscutque serpiginem, crysipelas, febres biliosas, phlegmones, scabiemque generare: At eo tempore quo colliguntur hi fructus ob immoderatum æstum in similes morbos incidunt, etiam nonnulli, qui illis abstinent. E fructibus porro maturis succus exprimitur, qui addito sale, radiis solaribus inspissatur, sieque ad varios usus per annos asservatur. E nucleis siccatis farina fit, ex eaque varia eiborum genera conficere norunt iudigenæ.

ANACARDIUM OCCIDENTALE, *Linna.*; *Fl. Br. Ind.* II. 20; *Rozb. Fl. Ind.* II. 312—*Kapa-Mava, Rheede Hort. Mal.* III. t. 54.

Káj, Konk.; *Cajus, Cajueiro, Port.*

E fructibus hisce potas exprimitur, qui debito modo fermentatus, vinosus evadit, et inebrians. Fructus in deliciis, uti amygdalæ comeduntur et usurpantur, saporemque non minus gratam habent quam amygdalæ aut castanæ; crudos verò nemo sanè ore aperiet, quod continuo eutem abradant, magno dolore eorum, qui ignari temerè eos rescant: ideo cultro aperiuntur, aut, uti castanæ, sub cineribus assantur, ut manducari possint. Guttur autem peculiari natura cum deglutiantur stringunt, gustu acri et austero; ideoque in orbes seinduntur, adjuncta aqua seu vino, saleque injecto, quibus modis acrimonia illa mitigatur, palato ita gratissimi. Hisce quoque nucleis leviter tostis incole veseuntur ad venerem stimulandam. Ex melligine quam gemini cortices continent, copiosum indigenæ eliciunt oleum, quod pictoribus, ad lintamina quævis indelebili nigricante colore pingenda, in usu est; eodemque oleo si lignum ungetur contra putredinem præservatur, adeoque durabilius redditur. Insuper acri illo oleo nihil præstantius esse ferunt ad lichenes et impetigines tollendas, eodemque incole adversus scabiem, et vermes necandos utuntur, extrinsecus illito. Denique nuclei hi comesti ventriculorum roborant, alimentorum fermentationem juvant, nec non vomitum et nauseam tollant. Succus verò e fructibus hisce expressus diarrhæcam sistit et diabete sanat.

ODINA WODIER, *Roxb. ; Fl. Br. Ind. II. 29 ; Roxb. Fl. Ind. II. 239* —Kalesjam, *Rberdo Hort. Mal. IV, t. 32*

Mourmouratarum, *Moy, Konk. ; Bainheíro, Port.*

Ex ligno hujus arboris ensium ac cultrorum vaginæ conficiuntur. Cortex pulverisatus et cum butyro in unguenti formam redactus spasmo cynico, aliisque convulsionibus, è gravibus vulneribus ortis, medetur : item ulcera quævis maligna, doloresque arthriticos sanat. Insuper corticis hujus succus aphthas curat ; et assumptus Dysentericæ remedium est. Idem cortex cum cortice *Coddam-pulli* in pulverem redactus et exhibitus alvum movet humoresque pituitosos et atrabiliarios educit. E foliis et cortice in aqua coctis semicupium paratur feminis pariteris, ut facilius et felicior succedat partus.

HOLIGARNA ARNOTTIANA, *Hook. f. ; Fl. Br. Ind. II 36—(?)*
Katou-Tjeroe, *Rheede Hort. Mal. IV t. 9*

Rân-bibo, *Konk. ; Uvas d'inferno, Port.*

Lacrymâ rubicunda et fusca ; quam fundit vulneratus cortex, nec non fructuum succo acri et glutinoso, admixtâ calce, pictores utuntur ad lana gossypina variis figuris indelebili colore pingenda. Fructuum decoctio in lacte dulci pota scabiei, lepre, capitis dolori è causâ frigidâ, vertigini, colicis cruciatibus, aliisque affectibus è viscidâ, pituitosis, et flatulentis humoribus natis, conducit. Succus è fructibus et arboris cortice expressus, ac dentibus admotus odontalgiam sanat; nec non tumoribus frigidis applicatus cutem erodendo, ac vesiculas exitando (hæc seccus ac potentiale cauterium) eos aperit. At licet variis modis arbore hoc, ejusdemque partibus utantur Indigenæ, ex hisque medelatur variis affectibus quærant: nihilominus tamen inter Indos reperiuntur, quibus arbor hæc noxium est venenum, atque ex levî ejus tactu totum corpus mirum in modum intumescit; quod symptoma lacte, butyro, aut oleo assumpto, protinus mitigatur.

SPONDIAS MANGIFERA, *Willd. ; Fl. Br. Ind. II, 42 ; Roxb. Fl. Ind. II. 451*—Ambalam, *Rheede Hort. Mal. I t. 50*

Gojo-Âmbalò, Âmbádo, *Konk. ; Catona, Port.*

Fluxum menstrui suppressi promovet si radix pudendis mulieris

indatur. Cortex ejus tritus et in lacte acido epotus dysenteriae sistendae commodus, ad quod etiam juvat, si ejus succus misceatur cum oryza ex qua genus panis communi nomine, *Ajpa* dictus conficitur. Ligai decoctum proficacè datur in gonorrhœa. Foliorum succus cum fructu arboris trito auribus inditus eorum dolorem sedat.

XXV. MORINGEÆ.

MORINGA PTERYGOSPERMA, *Gærtu: Fl. Br. Ind.* II 43; *Hyperanthera Moringa, Roxb. Fl. Ind.* II. 368.—*Mourignon, Rheede Hort. Mal.* VI t. 11

Maisting, Konk. ; Moringa, Port.

Hujus folia et fructus in concoctione *caril* adhiberi solent. Insuper ex foliis, radicis cortice et fructu parantur pillule antispasmodicæ. Foliorum succus una cum pipere oculis immittitur contra vertiginem; qui zinziberi si addatur fugat febres. Tritus ex oryzae aqua cortex œdemati medetur, adjecto cumino odontalgia, et malarum tumori, per se vero venenato glirium morsui. Ejusdem et foliorum *Vallinaregam* succi naribus attracti maniam tollunt. Merus corticis Moringæ succus cum aqua et allio commixtus serpentes (cobras capellas) œdibus expellit; artuum ex frigore lancinationes oriundas, lenit epotus: Radix supposita abortum causat, cum allio et pipere subactus spasmo succurrit si temporibus allinatur. Folia si calida imponantur coleorum discedant tumores imo et venereos. Ulceribus apta sunt; apertæ autem et affectæ parti imposita lumbricos pedum (popularis in Persia et Guinea morbus est) evocant. Vino admixtus succus cum piscis aurætæ (Lusitani *d'aurada* vocant) sevo ebriosos à mero ingurgitatione vocat. Viridis hujus arboris succus omnibus artuum capitisque ex lue venerea ortam trahentibus doloribus opitulatur, foliorum succus vermes plaguesenicis in ulceribus euocat et expellit; ex butyro coactus herpetem aliosque morbos removet.

XXVI. CONNARACEÆ.

CONNARUS MONOCARPUS, *Linna: Fl. Br. Ind.* II 50—(1)
Perineurigiü, Rheede Hort. Mal. VI. t. 43

Tâll, *Konk.* ; Crica da velha, *Port.*

È nimio rigentibus frigore membris motum restitunt contrâsi fractus; quorum è lobis exprimitur oleum aphthis convenientissimum. Folia in balnei foamam decocta tumores resolvunt œdematosos; incantatisque succurrant hominibus; quod idem præstat ex aqua orizæ contrita radix, alias oleorum inserviens coctioni.

(2) Curigi-tali, *Rheede Hort. Mal.* VII t. 26

Tali dau kennaps, *Konk.* ; Crica da velha (trepadeira) *Port.*

Succus foliorum cum lacte ebutyrato, et chalibeato, hæmorrhoidibus medetur: fructus in febribus malignis, ad sedandos ardentissimos calores adhibentur.

XXVII. LEGUMINOSÆ.

CROTOLARIA RETUSA, *Lin.* ; *Fl. Br. Ind.* II. 75; *Rorb. Fl. Ind.* III. 272.—Tandale-cotti, *Rheede Hort. Mal.* IX. t. 25.

Gâgri, Śama-pâspi, *Konk.*

Ex decocto lavamentum præparatur, pro febribus, tertianis præcipue chronicis. Radix in decocto data pituitam evocat, flatus discutit. Trita cum vino præstantissimum est anticolicum. Foliorum succus epotas febres symptomáticas ex colico dolore aufert, per vomitum nempe; hepar et sanguinem purificat.

C. VERRUCOSA, *Lin.* ; *Fl. Br. Ind.* II. 77 ; C. angulosa, *Rorb. Fl. Ind.* III. 273.—Pee-tandale-cotti, *Rheede Hort. Mal.* IX. t. 29.

Bhaṭṭa-Gâgri; *Konk.*

Radix hujus trita et oculis apposita, memoriam reducat et corrigat: succus foliorum Mercurii fluorem diminuat.

C. LABURNIFOLIA, *Lin.* ; *Fl. Br. Ind.* II. 84 ; *Rorb. Fl. Ind.* III. 275.—Nellon-tandale-cotti, *Rheede Hort. Mal.* IX. t. 27.

Gâgri, *Kouk.*

Vires ut supra (C. retusa).

C. QUINQUEFOLIA, *Linna.*; *Fl. Br. Ind.* II. 84; *Roxb. Fl. Ind.* III. 279.—Wellia-tandale-cotti, *Rheede Hort. Mal.* IX. t. 28.

Gâgro, *Kouk.*

Vires ut supra (C. retusa).

MELILOTUS PARVIFLORA, *Desf.*; *Fl. Br. Ind.* II. 89; *Trifolium Indicum*, *Roxb. Fl. Ind.* III. 388.—Suendadi-pallu, *Rheede Hort. Mal.* IX. t. 40.

Per distillationem aqua elicitor fragrantissima. Fractus in pulverem redacti, artuum lassitudinem adjuvant.

INDIGOPERA ASPALATHOIDES, *Vahl*; *Fl. Br. Ind.* II. 94; *I. aspalathifolia*, *Roxb. Fl. Ind.* III. 371.—Manneli, *Rheede Hort. Mal.* IX. t. 37.

Tippoli, *Kouk.*

Folia ab indigenis adhibentur in concoctione *cardi*. Ex integra hac planta cum lacte ebutyrato lavamentum conficitur, femorum resolvens tumores, phlegmonodes, oedematodes. In crizæ lotura aposema præparatur ventris inflationem auferens altamque emolliens. Ex cineribus lixivium elicitor, quoenum sordes capitis expurgantur. Folia trita abcessus resolvunt vel aperiunt. Ex radice oleum extrahitur, quo caput in erysipelate perungitur.

I. HIRSUTA, *Linna.*; *Fl. Br. Ind.* II. 98; *Roxb. Fl. Ind.* III. 376.—Kattu-tagera, *Rheede Hort. Mal.* IX. t. 30.

Ex hac planta decoctum conficitur antiphreniticum.

I. TINCTORIA, *Linna.*; *Fl. Br. Ind.* II. 99; *Roxb. Fl. Ind.* III. 379.—Ameri, *Rheede Hort. Mal.* I. t. 54.

Niç, *Kouk.* Anileira, *Port.*

Ad dolores calculi nephriticis mitigandos servit. radix in decocto

data. Eadem et viribus veneni obsistit decocta cum aqua *lanie*, scilicet teneri coqui *Indici*, et epota. Folia in difficultate mingendi juvant si trita cum aqua ventri applicentur. *Amé*, vulgè dicta *Indigo*, quæ ex foliis paratur, pro exsiccandis tumoribus proficua.

TEPHROSIA PURPUREA, *Pers.* ; *Fl. Br. Ind.* II. 112 ; *Gallega purpurea*, *Roxb. Fl. Ind.* III. 386.—*Colinil*, *Rhede Hort. Mal.* I. t. 55.

Sarapanik, *Konk.*

Succus ex ea extractus addito momento mellis servit pro oris pustulis, ore cum eo peruncto. Radix trita et decocta in lacte Coqui *Indici* conducit in morbo sacro factâ perunctione.

SESBANIA ÆGYPTIACA, *Pers.* ; *Fl. Br. Ind.* II. 114 ; *Æschynomene Seshan*, *Roxb. Fl. Ind.* III. 332.—*Kedangu*, *Rhede Hort. Mal.* VI. t. 27

Kenamg, Kanânga, *Konk.* ; Fructa de agarão, *Port.*

Vires si spectemus, cum proximè (*Stereospermum chelonoides*) descripta arbore conveniunt ; teneriores tamen siliquæ calefaciunt intestina. Confectum balneum é foliis, omnes discutit tumores. Epileptici, siphthisque laborantes pueri, florum sacco facillime curantur.

S. GRANDIFLORA, *Pers.* ; *Fl. Br. Ind.* II. 115 ; *Æschynomene grandiflora*, *Roxb. Fl. Ind.* III. 331.—*Agaty*, *Rhede Hort. Mal.* I. t. 51.

Agástó, *Konk.*

In podagra proficua, si ex partibus ejus contritis fiat decoctum cum oleo, ac eo pars affecta perungatur. Radix mixta cum urina vaccæ humores tumoresque membrorum resolvit, iis apposita. Arboris corticis succus in ore detentus, idem cum melle permixtus prodest pro angina et oris pustulis, si cum eo guttur et os abluatur. Cortex coctus cum aqua et comestus pro variolis conducit. Foliorum succus naribus immisus juvat in febribus quartanis et inveteratis die paroxismi. Foliorum decoctum epotum pituitam et phlegma, nec non

humores biliosos expurgat; in vertigine capitis et colera conducit, si folia cocta in aqua edantur. Flores in decocto proficue dantur pro catarrhō, quin etiam hoc modo ad luxuriam incitare ferunt; eorum succus oculis inmissus pellit nubeculam ac visum noctu precipue reddit.

ZORNIA DIPHYLLA, *Pers.*; *Fl. Br. Ind.* II. 147; *Hedysarum diphyllum*, *Roxb. Fl. Ind.* III. 353.—Nelam-mari, *Rheede Hort. Mal.* IX. t. 82, 83.

Singári, *Konk.*

Apozema ex hac planta pro algidis preparatur febribus.

SMITHIA SENSITIVA, *Ait.*; *Fl. Br. Ind.* II. 148; *Roxb. Fl. Ind.* III. 342.—Tsiovanni-manneli, *Rheede Hort. Mal.* IX. t. 38.

Damapán, *Konk.*

Unguentum ex tritis hujus foliis et recenti butyro, secundum artem preparatum abscessus tollit phlegmonodes, quos si concomitentur febres, decoctum praescribitur, ex hujus radice, gingibere et pipere.

ÆSCHYNOMENE INDICA, *Linna.*; *Fl. Br. Ind.* II. 151; *Hedysarum Neli-Tali*, *Roxb. Fl. Ind.* III. 365.—Neli-tali, *Rheede Hort. Mal.* IX. t. 18.

Najabí, *Konk.*

Lavamentum ex hac planta conficitur antivulnerarium.

ABRUS PRECATORIUS, *Linna.*; *Fl. Br. Ind.* II. 175; *Roxb. Fl. Ind.* III. 258.—Konni, *Rheede Hort. Mal.* VIII. t. 39.

Lahán guñji, Guñji, *Konk.*; Fructa conteira, *Port.*

Folia cum calamo aromatico cum aqua vel oleo incocta, lancinantes ex pituita salsa et acri ortos dolores sopiunt. Eorundem pulvis insolatione tostus et cum saccharo deglutitus, acriorem mitigat tussim. Succus expressus membrorum dolores ex frigore ortas abigit, crassos lentosque humores discutit, si cum lacte vaccino, oleo *sergelim*, pipere longo et zinzibere ad linimenti consistentiam redigatur. Radix cum cumino in aqua levigata et assumta tenacem intestinorum pituitam incidit ac corrigit. Fructus radici admixtus cum lacteo nucis Indicae succo, hæmorrhoidibus adversatur.

MUCUNA GIGANTEA, *D. C.* ; *Fl. Br. Ind.* II. 186; *Carpopogon giganteum*, *Roxb. Fl. Ind.* III. 286—*Kaku-valli*, *Rheede Hort. Mal.* VIII. t. 36.

Káiroli, Khátkhútlí, *Konk.* ; *Fava coccirá*, *Port.*

Hujus plantæ virtus in arthritide conspicua est : ejusdem folia gravidas mulieres a capitis vertigine liberant, quippe et in aqua orizæ decocta superfluos humores exsiccant : illius cortex cum zinzibere sicco, fractaque *caringolæ* contritus et in oleo *fosule de inferno* ac *Bepu* coctus oleum elargitur, quod modulæ spinali inunctum icheumata ac nocivos catharros compescit: Ejusdem nucleus rejecta interiori cuticula vaccino lacte ac butyro recenti coquendo periniscetur in unguenti consistentiam, contra pustulas et ulcuscule in mulierum præsertim pudendis prodeuntia; idem cum planta *Felis Oculis* dicta in orizæ lotura et ebutyrato lacte decoctus unguentum contra articulare morbum præbet; idem efficit radix si cum radice *Carimbolæ* et *Caniram* ac foliis *Monia* in linimenti forma usurpetur; vel si cum tamarindorum cortice et zinzibere sicco pulveretur, atque primo lactis sero, dein simul oleo *Bepu* incoquatur ad linimentum.

M. PRURIENS, *D. C.* ; *Fl. Br. Ind.* II. 187 ; *Carpopogon pruriens* *Roxb. fl. Ind.* II. 187—*Nai-corana*, *Rheede Hort. Mal.* VIII. t. 35

Gilo, Khátkhútlí *Konk.* ; *Fava coccirá*, *Port.*

Radix decocta et assumta urinam promovet ; cum oleo concocta dolores arthriticos sedat ; morbum sacrum, facta perunctioe sanat ; cum radice *Cocciul* et oleo insigne remedium est pro urina purulenta : *Folia* trita et apposita, summo cum successu in ulceribus adhibentur. *Fabæ* comestæ motus excitant venereos.

ERYTHRINA INDICA, *Lamb. Fl. Br. Ind.* II. 188; *Roxb. Fl. Ind.* III. 249—*Mouricou*, *Rheede Hort. Mal.* VI t. 7.

Pañgiro, Pañgero, *Konk.* ; *Folhas da trindade*, *Port.*

Usus harum arborum si consideres varius est ; primo lignum Malabarensis in easium ac cultrorum efformant vaginas ; imo ipsa perspicilla, in co, ope lapidis calcinati expolire solent. Una cum cortice indi-

genae ad vestium *Sarassav* dictorum; lotionem, flores in confectionem *aril* adhibent. Ceterum folia pulverisata, ac matura cum nucis *Indica* cocta donec unguenti crassitudo fit, veneris consumunt bubones; dolores ossium sedant. Contrita folia temporibus applicata ophthalmiae opitulantur et ulceribus. Mixta cum saccharo impuro quod *jagra* vocant intolant, estque saccharum quod ex arboris *palmeira* succo dicto *sura* excoquitur et in nigros trochiscos formatur; ventris dolores praesertim feminis reprimunt; quod praestat cortex aceto laevigatus, et nucleus pellicula rubra denudatus, si deglutatur. Foliorum succus cum oleo *sergelium* assumptus, dolores levat venereos, cum oryzae infusione haustus, fluxus tenet; cum foliis *Beteira* in pulvem redactus vermiculos in vastis ulceribus praefocat; ex oleo coactus sporam et pruritum tollit.

BUTEA FRONDOSA, *Roxb.*; *Fl. Br. Ind.* II. 194; *Roxb. Fl. Ind.* III. 244—Plaso, *Rheede Hort. Mal.* VI t. 16 17.

Pajasú Pajas *Konk.*; Favas de engenho, *Port.*

Lignum et folia gentiliium caeremoniis inserviant. In pulverem redacti fructus, assumpti lumbricos educunt, cortex eo modo cum zinzibere exsiccato, exhibetur in morsu viperino.

CANAVALIA ENSIFORMIS, *D. C.*; *Fl. Br. Ind.* II. 195; *Dolichos gladiatus*, *Roxb. Fl. Ind.* III. 300—Bara-mareca, *Rheede Hort. Mal.* VIII. t. 44

Dála-vajú, *Gheuço, Konk.*; Favas dos pares sativo, *Port.*

Hujus folia in aqua *orizae* vel immaturae nucis *Indicae* succo contrita praecipitantur cachecticis; ex fructibus autem cum zinziberis sicci ac *piperis* longi mixtura fiunt pillulae antispasmodicae; ex iisdem, dempta interiori pellicula cum cortice *Muringu* trituratis, conficitur linimentum antiartariticum, quippe hujus plantae praesentia in arthritide elucescit, vel etiam cum radice *Vallae*, calamo aromatico, cortice maturo fructus *Arêke* dicti *Pinang* in aqua oryzae *patsgeri* et oleo foliorum de *Enferno* mixtis, vel etiam cum *curcuma*, *cynoglossa* Malabarico aliisque, lacteo *Indicae* nucis sucto, ac oleo foliorum de *Enferno*, vel denique cum tribus *Alu* speciebus *oryzae* lotura ac dicto oleo copulatis.

C. OBTUSIFOLIA, *D. C.*; *Fl. Br. Ind.* II. 196; *Dolichos ob-*

(BLANK PAGE-NO CONTENTS)

(BLANK PAGE-NO CONTENTS)

Lignum foco inservit. Balneum ex foliis paratum flatas, arthritidisque dolores, suffitus febrem depellit. Eorum levis succus in tempore adhibitis, venenatos curat serpentium morsus.

DERRIS SCANDENS, *Benth.*; *Fl. Br. Ind.* II. 240; *Rozb. Fl. Ind.* III. 232—Noelvallii, *Rhæde Hort. Mal.* VI. t. 22.

Sãlori Kouk; Folhas do porco, *Port.*

Comestæ immixtas fabæ alvum cum torminibus solvant; Folia in cataplasma redacta erisipelati conducunt. Cortex cannabis amulans in funes redigitur.

CÆSALPINIA BONDUCELLA, *Fleming*; *Fl. Br. Ind.* II. 254; *Rozb. Fl. Ind.* II. 357—Carutti, *Rhæde Hort. Mal.* II. t. 22.

Tiriãgoesi Gãjri, *Kouk.*

Radix et cortex contriti et in decocto dati pro tumore hernioso conducunt, ad quod etiam serviunt folia trita et in lacte acido epota, seu etiam si una cum Coquo Indico trita ignique admota partibus herniosis apponantur. Fabæ tritæ atque cum lacte Ooqui Indici mixtæ pro herniosis quoque conducunt ventri interiori applicatæ; eodem in pulverem redactæ et cum vino epotæ in hernia quoque prosunt, ac insuper flatus dissipant, dolorem colicum sedant ac stomachum debilem confortant, quin et in pulverem tostæ ac in vino dâte mensuris mulierum provocandis serviunt. Ipsa medulla fructuum quoque in calculo prodest in pulverem facta et in vino data; in morbis endemicis eodem quoque modo usurpata.

C. NUGA, *Ail.*; *Fl. Br. Ind.* II. 255; C. paniculata, *Rozb. Fl. Ind.* II. 364.—Kaka-Mulu, *Rhæde Hort. Mal.* VI. t. 255.

-- Tikãnto, Vãkeri, *Kouk.*; Grão do veadõ, *Port.*

Medicus ejus usus plane incognitus, nisi quod cortex ex lacte contritus vaccino diabetem, gonorrhæamquæ persanct.

C. SAPPAN, *Linna*; *Fl. Br. Ind.* II. 255; *Rozb. Fl. Ind.* II. 357—Tocapan-gam, *Rhæde Hort. Mal.* VI. t. 2.

Chiapan-gam, Pãtauãg, *Kouk.*; Pau de sapan, *Port.*

(BLANK PAGE-NO CONTENTS)

(BLANK PAGE-NO CONTENTS)

ebullitio, sitis infesta, morbi cutanei et presertim morbus regius grauatatur, in quibus malis simplex medicamentum ex cassia fistula cum tamarindo unâ cum saccharo vulgo dicto *jaggâ de Cana* datur, quod leniter alvum laxat ac purgat. Cortex tritus et cum aqua orizæ in unctionem corporis permixtus humoribus superfluis dissipandis confert.

BAUHINIA TOMENTOSA, *Lin.*; *Fl. Br. Ind.* II. 275; *Roxb. Fl. Ind.* II. 323—*Catschena-Pou*, *Rheede Hort. Mal.* I. t. 35.

Kamtsami, Kâl davo âpto, *Kouk*.

Radix servit pro parotidibus aut strumis trita et iis apposita. Radicis cortex decoctus et epotus proficua est pro phlegmate, ventris vermibus, hepatis inflammatione, uti et pro hæmorrhoidibus. Idem cortex et parotidibus appositus tumorem tollit, ac eod. modo usurpatus confert in vulnerum sanatione et carnem adducit.

B. ACUMINATA, *Lin.*; *Fl. Br. Ind.* II. 276; *Roxb. Fl. Ind.* II. 324—*Velutta-Mandaru*, *Rheede Hort. Mal.* I. t. 34.

Davo-Mandaru, Davo âpto, *Kouk*

In aqua decocta facta lotione pellit humores corporis; proficua quoque est pro ulceribus asmandis trita et iis apposita. Radix in oleo decocta facta per unctione pustulas parvas in auricula natas sanat. Eadem dentium dolorem sedat mansa et iis apposita. Cortex decoctus cutaneus corporis pruritus lotione sedat. Flores cum pipere triti et fronti appositi conferunt pro dolore capitis.

B. MACROSTACHIA, *Wall.*; *Fl. Br. Ind.* II. 281; *B. scandens*, *Roxb. Fl. Ind.* II. 326—*Naga-valli*, *Rheede Hort. Mal.* VIII. t. 29.

Sarapvel, *Kouk*; Trepadeira da cobra, *Port.*

Planta hæc cum lacte et recenti butyro trita ac capiti inuncta cephalalgiam, ac cum aqua naves tum oculos corrodentem catharrum edulcorant; gemmæ cum minio et alumine mediante oryzæ lotura in pilulas formantur pro oculis ex cephalalæa tumentibus et inflammatis; cum succo *Carabola* contritæ parotides internasque glandularum tumores immittunt; radix cum aqua oryzæ et butyro recenti pro frontale adhibita idem præstat.

B. PURPUREA, *Linna.* ; *Fl. Br. Ind.* II. 284 ; *Rozb. Fl. Ind.* II. 320—Chovanna-Mandaru, *Rheede Hort. Mal.* I. t. 33.

Tambiço-Mandarü, Tambiço äpto, *Konk.*

Radix mastiçata confert in dentium et capitis doloribus trita et apposita pro dolore arthritico, cum zincibere siens trita et in unctione adhibita pro runceline ex pituita oborta, in decocto data. Foliorum decoctorum vapor dolores corporis sedat in parte affecta exceptus. Flores simpliciter comesti purgativi sunt. Cortex flores et fractus simul triti et mixti cum aqua in qua macerata fuit oryza, servintur apostematibus aperiendis et maturandis.

B. VARIEGATA, *Linna.* ; *Fl. Br. Ind.* II. 284 ; *Rozb. Fl. Ind.* II. 319—Chovanna-Mandaru, *Rheede Hort. Mal.* I. t. 32.

Tambiço-Mandaru, Tambiço äpço, *Konk.*

Radix in decocto data flatus discutit et lumbricos in pueris euectat, hoc modo sumpta cum saccharo et melle pellit tussim et pituitam solvit. Cortex contritus ac cum aqua, in aqua oryza lota est, in lotionibus adhibitus, humoribus evocandis confert. Flores cum saccharo decocti proficue usurpantur loco sacchari rosati pro leni purgativo.

NEPTUNIA OLERACEA, *Lour.* ; *Fl. Br. Ind.* II. 285 ; *Mimosa natano*, *Rozb. Fl. Ind.* II. 353—Niti-todda-vaddi, *Rheede Hort. Mal.* IX. t. 20.

Lajri, *Konk.*

In decocto data stomachum corroborat, in febris urinum provocat et arthriticum sedat dolorem ; trita cum butyro apostematata digerit.

ADENANTHERA PAVONINA, *Linna.* ; *Fl. Br. Ind.* II. 287 ; *Rozb. Fl. Ind.* II. 370—Mandojali, *Rheede Hort. Mal.* VI. t. 14.

Gunjji, Vhadoli gühji, *Konk.* ; *Mangelius, Port.*

In usu quotidiano lignum ob soliditatem variis operibus inseritur. Foliis in pulverem reductis gentiles in ceremoniis utantur. Semina vero laud ingrati saporis præter quod à plebeis sive cocta, sive commi-

nata in firmum, concedantur, magnum præstant usum auri fabricæ et gemmarum, quippe ob se qualitatem, granorum vice in ponderatilibus mercibus adhibentur, singula utique *Marsipina*, licet nullo ob linguæ ignorantiam ita exprimitur, quatuor pesulet grana, quilibet utuntur aurofabi: qui quoque exentasis hæc seminis aqua malefactis, una cum bonæ gluten adelegantiori cum nova, tum diffracta vase congruenda conficiunt. Medici vero è foliis contritis potionem lumborum sedantem dolorem patere norant.

ACACIA INTSIA, *Willd. : Fl. Br. Ind. II. 297* ; Mimosa Intsia, *Roxb. Fl. Ind. II. 365*—Intsia, *Rhede Hort. Mal. VI. t. 1.*

Kakusi, Chitar, *Kook* ; Espinhos dos marcilhos, Espinho dos monnos, *Port.*

Ex frondibus et cortice succus cum p^ossillo salis exhaustus ventris sedat dolores, ipse cortex epistis kicamento utilis additur: qui in pulverem redactus summo cum levamine ulcibus inspergitur.

ALBIZZIA ODORATISSIMA, *Reuth. : Fl. Br. Ind. II. 339* ; Mimosa odoratissima, *Roxb. Fl. Ind. II. 546*—Waga, *Rhede Hort. Mal. VI. t. 5.*

Sigi Siras, *Kook* ; Favas de Lazaro, *Port.*

Hujus arboris succus uno cum limonis, et virente curcuma in macis Indice olei dinstus coctus, illinendo prodest lepræ, multo insuper usus in ulcibus est inveteratis.

XXVIII. RHIZOPHOREÆ.

RHIZOPHORA MUCRONATA, *Lamk. : Fl. Br. Ind. II. 435* ; R. Mangle, *Roxb. Fl. Ind. II. 459*—Pee-Candel, *Rhede Hort. Mal. VI. t. 34.*

Ala künde], künde], *Kook* ; Salgueira mainato, *Port.*

Vires ususque cum proxime (*Brugiera gymnorhiza*) descripta coincidunt.

KANDELIA RHEEDI, *W. de A., Fl. Br. Ind. II.* 437—Tsjerou-Kandel, *Récode Hort. Mal.* VI. t. 33.

Maha-kandel, *Kand.*; Salgpeira maior, *Paot.*

Lignua combustioni inservit: cortex vero cum exsiccato zinzibere aut pipere longo, *tripali* vacanti indigere, et aqua rosarum contritus, diabetea curat.

BRUGUTERA GYMNOBIZA, *Laub. : Fl. Br. Ind. II.* 437; Rhizophora gymnobiza *Roch. Fl. Ind. II.* 440—Candel, *Récode Hort. Mal.* VI. t. 31, 32.

Kandel, *Kand.*; Pau selgado menor.

Radices lincoum inserviunt tincturis, ut folia agrorum stercoreatione. Cortex, quo utuntur evisci et lotrices ad vestes purgandas, si ex oleo teratur dulce crassitudo sorbium fiat, illuc linit utraque lassitudines. At hinc et butyro resinae exceptas, opotulatur ex hepate alba (ut vulgus bepi amat) hinc; si applicetur.

B. CARYOPHYLLOIDES, *Blanco: Fl. Br. Ind. II.* 438—Kari-Kandel, *Récode Hort. Mal.* VI. t. 33.

Savó Kandel, *Kand.*; Salgpeira sativo, *Paot.*

Decidui fructus, ut in *Candel* eadem modo se irradiant: teneriores in edulis sunt. Cui in sale exsiccati etiam cum nucis nucleis eduntur. Cortex autem in suo lactis decoctus intestinarum tormina, dolores, et dursque, tollit. Hinc et in fructibus affinis *Delobantha zeylan.* oleum *Masotti* in vulnerarium unguentum componitur. Ridem si cortices minutim nucis Indicae ac viridi—nucis fructu adlii, contritum per aqua decoquantur pura, apertis, si us ea elidat se, us, melleant.

XXIX. COMBRETACEÆ.

TERMINALIA CATAPPA, *Linn. : Fl. Br. Ind. II.* 444; *Roch. Fl. Ind. II.* 450—Adamaram, *Récode Hort. Mal.* IV. t. 3, 4.

Jiba, Bengáli ámenáchéon jháb, *Kand.*; Pinda, *Paot.*

Ex foliis arboris placentulas conficere norunt Indigenæ, quas comedunt : foliorum succus cum oryza infuso mixtus et exhibitus humores biliosos temperat, capitis dolorem ex læsa alimentorum in vèntriculo fermentatione ortum sanat, nec non acerrimis doloribus cæcici meliorat. **E** foliis tenerioribus, et succo lacteo uncis Indicæ angusturam fit contra scabiem, lepram, impetiginem, similesque affectus cutaneos : eademque folia oleo palmæ oblita, ac foris gutturi imposita faucium tumores resolvunt. Fractum nuclei in deliciis comeduntur, ex lique lac emulgetur uti ex amygdalis, necnon oleum exprimitur oleo amygdalorum persimile, præterquam quod nunquam rancorem contrahit.

T. BELERICA, *Roxb., Fl. Br. Ind.* II. 445; *Roxb. Fl. Ind.* II. 431—Tani, *Rheede Hort. Mal.* IV. t. 10.

Gojiंगा, *Konk.* ; Bibarola, *Port.*

Fractum nuclei in edulis sunt : iique in pulverem radacti endemiæ illi cachexiæ (quæ *Piter* Insularis appellatur) medentur, atque oculorum vitia emendant : adhuc expressam ex iisdem oleum capillos firmat capiti innectum. Arboris cortex antidotum habetur noxio veneno, quod ex arbore *Katou-Tsjeron* seu *Rana-biba*, ejusve fructibus quocumque modo contrahitur : isque minutissimè contritus, addito asæ fetidæ pauxillo, tunc exhibetur. Insuper corticis hujus et radicis succus cum oryza et lacte decoctus et exhibitus, colicorum dolorem sanat,

XXX. MYRTACEÆ.

PSIDIUM GUYAVA, *Lin.* ; *Fl. Br. Ind.* II. 468 ; (1) *Var.* pyramiferum, *Roxb. Fl. Ind.* II. 480—Pela seu Guajabor, *Rheede Hort. Mal.* III. t. 31.

Per, *Konk.* ; Gnaivas, Pera, Goaveira, *Port.*

(2) *Var.* pomiferum, *Roxb. Fl. Ind.* II. 48—Malacha Pela, *Rheede Hort. Mal.* III. t. 35.

Per, *Konk.* ; Pera de Malacca, *Port.*

Ex foliis hujus arboris in aqua coctis balneum conficitur, quod sua

oliditate sudores movendo febrem sanat. Nec non è corticibus radicibusque decoctum paratur, quod subinde assumptum viscerum obstructions referat, aquas hydropicorum ducit, et ieterum tollit. Fructus in aceto vini cocti diarrhæam ac dysenteriam sistunt: irilemque matroni avidè comeduntur, et in bellariis esse solent, alvumque laxant.

EUGENIA MALACCENSIS, *Linna.*; *Fl. Br. Ind.* II. 471; *Roxb. Fl. Ind.* II. 483—Nati-Schambu, *Rheede Hort. Mal.* I. t. 18.

Jañb, Mäläkácho jañb, *Konk.*; Jambiro de Malacca, *Port.*

Cortex ejus tritus et in lacte acido epotus dysenteriam sistit.

E. JAMBOS, *Linna.*; *Fl. Br. Ind.* II. 474; *Roxb. Fl. Ind.* II. 494—Malacca Schambu, Jambu de Malacca, *Rheede Hort. Mal.* I. t. 17.

Jañb, *Konk.*; Jambiro, *Port.*

Ejus decoctum in aqua servit pro fissuris oris si cum eo abluatur.

E. ZEYLANICA, *Wight*; *Fl. Br. Ind.* II. 485; *E. Glandulifera*, *Roxb. Fl. Ind.* II. 496—Beluta-Kanneli, *Rheede Hort. Mal.* V. t. 20.

Dhavi Bhedsi, *Konk.*; Fructa cauri, *Port.*

Arboris folia siccata, et in pulverem redacta, atque cum lactis acro exhibita, diarrhæam sanant: ex foliis in aqua coctis balneum paratur contra quoscumque articularum dolores.

E. CARYOPHYLLÆA, *Wight*; *Fl. Br. Ind.* II. 490—Njara, *Rheede Hort. Mal.* V. t. 27.

Bhedsi, *Konk.*; Gibique, Grão de gato, *Port.*

Arboris radix variis modis usurpatur ad ocnlorum, palpebrarum que affectus curandos

E. JAMBÓLANA, *Linna.*; *Fl. Br. Ind.* II. 499; *Roxb. Fl. Ind.* II. 484—Periu-Njara, *Rheede Hort. Mal.* V. t. 29.

Jañbál, Madanaka, *Konk.*; Jambuleiro, Grão de gato, *Port.*

Ex arborea cortice in aqua cocto fit oris collatio pro aphthis. Radix siccata, pulverisata, et exhibita diarrhoeam, dysenteriam et tenesum curare dicitur. E fructibus in aqua coctis gargarismus conficitur, faucium affectibus talendis utile.

BARRINGTONIA RACEMOSA, *Blume*; *Fl. Br. Ind.* II. 567; *Rarb. Fl. Ind.* II. 632—Samstravadi, *Rheed. Hort. Mal.* IV. t. 6.

Salapullu, *Kook*; Rosario de jumbo, *Paol*.

Ceterum Ethnici Jagues seu peregrinatores superstitionibus addictissimi, florigeris ac fructiferis hujus arboris culibus sese coronant, eosque de collo suspendunt ac seors. faciunt: adhuc fructiferi la caules ipsis sunt ad precas numerandis, quod observantes Lusitani arborem ipsam *Rosarios* dicunt. Porro folia in edulis sunt: succus e foliis expressus, et cum oleo palmæ in rugentem consistentiam coctus scdum sanat si eo pars affecta ungatur. Nuclei fractum in pulvereo religuntur, isque diarrhoeam sanat si cum fimo equino, saccharo, et lacte ebullito mixtus exhibeatur: si vero cum xinzibere et succo limonum sumatur, tenesmo medetur; urinae humanae si admisceatur quatersemque venenis aptidota est: cum vino si propinetur, colicam praetermissam sanat: cum aqua urinas et exhibitis, vel foris applicatis, haemorrhoidum dolores placat: tandem cum lacte muliebri epotas vomitum excitat, necnon internum, aliosque morbos biliosos curat, et oculis adhibitus eorum affectibus conducit.

B. ACUTANGULA, *Gaertn.*; *Fl. Br. Ind.* II. 508; *Rarb. Fl. Ind.* II. 635—Tajeria Samstravadi, *Rheed. Hort. Mal.* IV. t. 7.

Geandû-salapullu, *Kook*; Rosario bravo, *Paol*.

Arboris hujus lignum durum est, et solidum, ab ipis Jagues accommodatum: ceteræ vero partes eundem plane usum habent cum Samstravadi.

CAREYA ARBOREA, *Rarb.*; *Fl. Br. Ind.* II. 511; *Rarb. Fl. Ind.* II. 638—Pelon seu Guayabo sylvestre, *Rheed. Hort. Mal.* III. t. 36.

Pejomarta, Kosihiyo *Kook*; Pera brava, *Paol*.

Arbor ~~hæc~~ in medicina ob venenosam qualitatem nullam habetam; cortice tamen apri delectatur, quem in finem venatoribus in uso est.

XXXI. MELASTOMACEÆ.

OSBECKIA OCTANDRA, *D. C.*: *Fl. Br. Ind.* II. 521; Tsjerua Kudli, *Rheed. Hort. Mal.* IV. t. 44.

Dhaki nakeri, *Kook.*: Fructa da gralha poquento, *Port.*

Ex arboris cortice, foliis, floribus, fructibusque in sesami oleo coctis, oleum conficitur, quod aphthis, lingue fissuris, venarum palati gingivarumque pustulis ac phlyctenosis potenter meliatur. Mlesaque epilepsiam, apusum cynicam, similesque affectus curare dicitur, si caput eo illiatur.

MELASTOMA MALABATHRICUM, *Linn.*: *Fl. Br. Ind.* II. 523; *Roch. Fl. Ind.* II. 495—Kudali, *Rheed. Hort. Mal.* IV. t. 42.

Nakeri, *Kook.*: Fructa da gralha, *Port.*

Ceterum liqui hujus arboris carbouibus nuntur in purgatione pulveris pyrii. Floribus gentiles litare solent in templis Veneri dicatis ipsisque *Mogoli* dielis. Fructus matri ob heligenis coalescuntur: hæc quoque panni gossypini purpureo tinguntur colore. E foliis tenerioribus in oleo coctis nungentum conficitur, aphthis, similibusque oris et gingivarum affectibus sanandis conveniens. Foliarum succus cum oryze infuso exhibitus colicam passivam sanat.

MEMECYLON EDULE, *Roch.*: *Fl. Br. Ind.* II. 563; *Roch. Fl. Ind.* II. 26—Kasjavo Maran, *Rheed. Hort. Mal.* V. t. 19.

Surani, *Kook.*: Pilius, *Port.*

Ex arboris foliis cum viridi ementia in oleo coctis linimentum conficitur, hydatidibus pellendis utile; foliarum succus cum butiris pone aures positus lipitadinem curat. Ex radice in oleo cocta litus paratur contra arthritidem et cephalicam.

XXXII. LYTHRACEÆ.

AMMANNIA ROTATA, *F. Meell.*: *Fl. Br. Ind.* II. 567—Ene-

pucl, *Rheede Hort. Mal.* IX. t. 81.

Butyro recenti commixta abscessus hæc planta ad maturitatem perducit.

LAWSONIA ALBA, *Loak.* ; *Fl. Br. Ind.* II. 573 ; *L. incensis Roxb. Fl. Ind.* II. 250—Mail-auschi, *Rheede Hort. Mal.* I. t. 40.

Methi, Pólchi methi, *Kook.* ; Henna, *Port.*

Radix in decocto data conducit in doloribus pedum ex podagra natis. Folia in decocto cum saccharo data, seu simpliciter et in lacte epota conferunt pro ieteri. Succus ex foliis expressus et in lacte vaccæ cum saccharo epotas, infantibus materiam albam et purulentam prodest.

LAGERSTREEMIA FLOS-REGINÆ, *Retz.* ; *Fl. Ind.* II. 577 ; *L. reginae, Roxb. Fl. Br. Ind.* II. 505—Adumboe, *Rheede Hort. Mal.* IV. t. 20, 21.

Sotlári, *Kook.* ; Catapinaea da setra, *Port.*

Ex arboris radice in aqua decocta Gargarisma conficitur, quod palati orisque ulcensulis, necnon quibuscunque faucium affectibus medetur. Ex eadem radice decocta, et deia contusa cataplasma fit, quod tumoribus impositum potenter eos emollit ac maturat. Ex arboris cortice, foliis, ac floribus cum aqua communi decoctio paratur que pota hepatis, lienis, aliorumque viscerum obstructions aperit, et aquas hydropicorum per alvum ac urinam potenter ducit. Semen haud secus ac coriandri semen capiti infestum est, ac vertiginem ebrietatem, similesque affectus producit.

SONNERATIA ACIDA, *Linn. f.* ; *Fl. Br. Ind.* II. 579 ; *Roxb. Fl. Br. Ind.* 506—Blatí seu jambos sylvestris *Rheede Hort. Mal.* III. t. 40.

Ámbeti, *Kook.* ; Jambo do mato, *Port.*

Succus e fructibus expressus, et melli admixtus aphthis medetur, necnon febricitantibus aestum potenter compescit. E. foliis contasis cataplasma conficitur, quod capiti raso in febribus continuis impositum somnum conciliat lo delirium solvit.

XXXIII. ONAGRACEÆ.

LUDWIGIA PARVIFLORA, *Roxb.*; *Fl. Br. Ind.* II 538; *Roxb. Fl. Ind.* I. 419—Caramba, *Rheed Hort. Mal.* II t. 49.

Bhūm̄ya-vāyāngi, *Konk.*

Planta trita et in lacte acido epota sistit fluxum dysentericum. Eadem trita ac capiti adnota ejus dolorem sedat. Ejus decoctam epotam flatibus dissipandis, urinæ cieſe, ventri purgando, ac lubricis enecandis servit. Succus ejus cum lacte dulci sumptus proficiens est pro renum calore seu ardore. Semina in pulvere cum melle data tussi prosunt.

XXXIV. SAMYDACEÆ.

CASEARIA TOMENTOSA, *Roxb.*; *Fl. Br. Ind.* II 593; *Roxb. Fl. Ind.* II. 421—Anavinga, *Rheede Hort. Mal.* V. t. 50 et ? IV t. 49.

Bedst, *Konk.*; Fructa cauri do mato, *Port.*

Succus è fructibus hujus arboris expressus, et exhibitus sudores movet, ac morbis malignis meletar; nec non laxam servat alvum. E foliis in aqua coctis balneum fit, quibuscumque articularum doloribus tollendis utile.

XXXV. PASSIFLOREÆ.

MODECCA PALMATA, *Law*; *Fl. Br. Ind.* II 603; *M. ta'e-rosa*, *Roxb. Fl. Ind.* III 134 (1) *Modecca Rheede Hort. Mal.* VIII t. 20.

Bhūm̄ya kumvāli *Konk.*; Narola, *Port.*

Succus expressus cum lacte coci Indici sumptus angustias pectori tollit; radix trita cum *Parment* et aliis in oleo decocta ac interna in hiis artus corroborat, vires naturales auget; melancholiam abigij, præcipue in mulierculis, ac obsessis.

(2) Pal-modecca, *Rheede Hort. Mal.* VIII t. 21.

Folis cum aqua oryzae trita linimentum cephalicum perhibent, pro balneo adhibita febres cavant algidas.

(3) Motta-mo lecca, *Ricco Hort. Mal. VIII t. 22.*

Planta oleo incocta, phthisicis opitalatur: ex cortice radice mellis permixto linctus contra tussim præparatur.

(4) Orela-modecca, *Ricco Hort. Mal. VIII t. 23.*

Oleum per infusionem cephalicam est; cum butyro concocta planta hæmorrhoides sanat: foliorum succus partem faciliat.

XXXVI. CUCURBITACEÆ.

TRICOSANTHES NERVIFOLIA, *Linna. ; Fl. Br. Ind. II 609 ;* Toti—Piri, Schorn-Pada valam *Ricco Hort. Mal. VIII t. 16. 17.*

Goinj, *Konk.*

Ex foliis et alio medicamento conficitur erianum, pro morbo comitali. Ex succo foliorum et oleo Zil-Ela linimentum præparatur, quo maniacorum tempora summo cum successu perantantur. Ex eodem succo cum pipere longo, zinzibere et *auripigmato* pilule conficiuntur, oculis immitendæ, pro virulento serpentis morsa. Cortex fructus cum succo foliorum levigatus, in alienatione mentis, pro suffragio adhibetur, funiculo laneo in illis tumisso.

T. CUCUMERINA, *Linna. ; Fl. Br. Ind. II 609 ; Rozb. Fl. Ind. III. 702.*—Padavalam *Ricco Hort. Mal. VIII. t. 15.*

Ponli, *Konk. ;* Sabina, *Port.*

Decoctum cum saccharo sumptum, digestionem confert, tormina intestinorum, ac alios ventris doloris sedat, phlegmata expectant, pectoris angustiam tollit; febres minuit, hæmores attemperat, vermes enecat. Succus expressus idem præstat et vomitum provocat. Radicis succus ad quantitatem duarum unciarum epotus, valde purgativus est, in ipsa accessione febrium quotidianarum ac quartanarum ex pituita provenientium, frigus vel dimittit vel in totum tollit, per vomitum scilicet: stipes in decocto

datus phlegmati expectorando conducit: fructus quoque modo sumpti tumores expellant.

LAGENARIA VULGARIS, *Srijae*: *F. Br. Ind.* II 613; Cucurbita Lagenaria; *Roxb. Fl. Ind.* III 718 (1). Bela schora, *Riende Hort. Mal* VIII t. 1 e 4.

Gara-Judih Miro dulin, *Konk.*; Abobra branca, *Port.*

Succus cum momento curmini sumptus, spontaneam lassitudinem, ac debilem tollit respirationem: foliorum decoctum cum saccharo lictis prodest. Per totam hanc plantam crescit Malabarium in hortis excolitur et comeditur, florens tempore pluviali.

(2) Caipa-schora, *Riende Hort. Ind. Mal* VIII t. 5.

Kuliva-dulin, *Konk.*; Abobra calabasa, *Port.*

Succus foliorum cum tantillo Moschati ractum abigit: medulla fructus immaturi trita et cum aqua oculi sumpta vomitum promovet, pectoris angustiam tollit, pregnantibus prodest, capitis dolorem tollit, prolezione adhibita animi deliquium tollit; cum seminibus trita phlegmata evacuat.

LUFFA ACUTANGULA, *Roxb.*; *F. Br. Ind.* II 615; *Roxb. Fl. Ind.* II 713—Picinna, *Riende Hort. Mal.* VIII t. 7.

Gomsil, *Konk.*; Patulus, *Port.*

Radix decocta choleram reprimit, pituitam expurgat, et tumorem ventris tollit: fructus cum illorum medulla ad ponlus 3j. in aqua maturata et assumpta vomitum provocat: ex seminibus oleum contra impetiginem distillatur.

BENINCASA CERIFERA, *Seri*; *Fl. Br. Ind.* II 613; Cucurbita Pepo, *Roxb. Fl. Ind.* III 718. Cumbulam, *Riende Hort. Mal.* VIII t. 3.

Kunivali, *Konk.*; Abobra d'agua, *Port.*

Tener hic frutex venenosus est, maturus e contra alexipharmacum: in febre e dida assiam, ac tussi cum lacte, nec non in arboribus pectoris,

manuum ac pedum, si nempe fructus in conserva dentur; idem triti et cum butyro sumpti vertiginem sedant et appetitum promovent: semina trita et mixta cum oleo *Schergelim* pro dysuria adhibentur.

MOMORDICA CHARANTIA, *Linn*; *Fl. Br. Ind.* II 616; *Rozb. Fl. Ind.* III 707—(1) Paudi-Pavel, *Rheede Hort. Mal.* VIII t. 9.

Vhadoli kãretì, *Konk.*; Folha amargoseira, com fructa grande *Port.*

Integra planta cum *Nala-Tirtava*, cinamomo ac pipere longo trita, atque aquæ orizæ oleoque *Marotti* mixta unguentum suppeditat contra psoram, scabiem, papulas, aliosque morbos cutaneos. Folia cum aqua calida epota lumbricos enecant. Succus pruriginem abigit. Tota planta cum floribus spinæ, curcuma viridi, gingibere sicco, pipere longo, aliisque una pulverisata, oleo *Marotti* tinctorum et candente ferro levigata, oleum fundunt, quo psora, pruritus, impetigo, imo ipsa lepra, liniendo tollitur; simplex ejusdem pulvis, lepræ atque ulceribus malignis obsistit.

(2) Pavel, *Rheede Hort. Mal.* VIII t. 10.

Karetì, *Konk.*

Planta in pulverem redacta, admixtis nigri cumini seminibus sale assa-fœtida zinzibere sicco, pipere longo ac melle in pilulas formatis, ventris lancinationes et tormina sedant, flatus dissipant. Cum cortice *Pantsji* et quatuor specibus *Alu* in aqua langæ contusa, additoque limonis succo calefacta, insigne præbet gargarisma pro aphthâs. Cum immatura curcuma et sicco zinzibere si succus extrahatur, cum succo limonum, tosto pulveratoque cucumi semine ac saccharo candido permixtus, tussim sedat, phlegmata expectorat, et claram reddit vocem.

M. DIOICA, *Rozb.*; *Fl. Br. Ind.* II 617; *Rozb. Fl. Ind.* III 709—(1) Erima-pavel, *Rheede Hort. Mal.* VIII t. 12.

Papãli; Phãglini, *Konk.*; Tindalica spinosa, *Port.*

Planta hæc vere cephalica est, nam cum nucæ Indicæ, pipere cinnab: mercurii, sandalo rubro, vel denique *Mattengu-Panna-Schelengu* et floribus *Neli* trita, aqua oryzæ permixta, et in formam linimenti redacta, omnes capitis sistit dolores.

(2) Bem-pavel, *Rheede Hort. Ind. Mal.* VIII t. 18.

Dádulo-papáli, *Konk.* ; Trepadeira de fula triste do dia, *Port.*

Planta cum cortice *Mucicu, sandalo*, nigre testudines concha, ac aqua orizæ trita, linimentum suppeditat, abscessus maturans et resolvens ; si vero absque maturatione resolvere quis satagat, aquam Langæ, apium ac sandalum coctum addere oportet.

CUCUMIS TRIGONUS, *Roxb* ; *Fl. Br. Ind.* II 619 ; *Roxb, Fl. Ind.* II 722—Ballia-mucca-piri, *Rheede Hort. Mal.* VIII t. 11.

Kaḍayi tovasini, *Kariciti Konk.* ; Tindalica, *Port.*

Foliorum succus expressus et ad quantitatem unius unoisæ sumptus, omne venenum, ac dolores ex flatibus abortos tollit ; in unctione adhibitus humores discutit. Fructus triti ac lacte vaccino permixti vel etiam cocti, phrenosin sedant, memoriã confortant, vertiginem tollunt, capiti apositi et colligati ; tota planta, cum *Palmodoca* trita et in butyro decocta, idem præstat.

C. SATIVUS *Linu* ; *Fl. Br. Ind.* II 620 ; *Roxb. Fl. Ind.* III 720—Mullen-belleri, *Rheede Hort. Mal.* VIII t. 6.

Tavasini, *Konk.* ; Pepino do mato, *Pepineira, Port.*

Fructus cucumeri formibus majoris generis ac spinosis ; uno verbo, *Cucumis sylvestris*. Hujus cum palmæ sylvestris tenera folia, cum tosto cumini pulvere in aqua decocta, difficili ac sibilanti respirationi, et impedite deglutationi medentur. Succus cum oleo *Sergilim*, et tosto cumini semine haustus, vel cum *Feribili* temporibus illitus, respirandi difficultatem ex ictu vel lapsu levat.

CEPHALANDRA INDICA, *Naud.* ; *Fl. Br. Ind.* II 621 ; *Momordica monadelpha Roxb. Fl. Ind.* III 708—Covel, *Rheede Hort. Mal.* VIII t. 14.

Temḍil, *Konk.* ; Tendali comprido, *Port.*

Integra planta cum radice *Ela-Calli* ac cumini pulvere cocta, gonorrhæam sistit, si febris adsit ac bilis orgasmus, adduntur Sacchari rubri ac flores *Neli* cum aqua orizæ ; Folia cum recenti butyro contusa, in formam linimenti adhibita, exanthemata tollunt. Succus ex *Pudu*

Kelengi, floribus *Neli* et hac planta expressus cephalicam et præordiorum astum mitigat; cum saccharo sumptus bilem refrenat, radix in aqua decocta idem facit.

CUCURBITA MOSCHATA, *Duchesia*; *Fl. Br. Ind.* II 622; *C. melopepo*, *Roxb. Fl. Ind.* III. 710—*Selaakiri-schora*, *Raccol. Hort. Mal.* VIII. t. 2.

Palita-kalli dadiat, *Konk.*; Abobra guinea, *Port.*

Succus cum momento *Murchati*, debilitatem et corporis languorem auferat. Inter edulia habetur et ubique invenitur.

BRYONIA LACINIOSA, *Lour.*; *Fl. Br. Ind.* II 622; *Roxb. Fl. Ind.* III 728—*Nehococcka*, *Raccol. Hort. Mal.* VIII t. 19.

Kaamquli, *Konk.*; Nola, *Port.*

Foliorum succus cum lacte vaccino epotus, bilem temperat: cum aqua *Lauje*, oleo *Sergolim* et tosti cuminæ pulvere febribus medetur: cum melle et saccharo, apprimè conveniens remedium est contra febra, tussim, abessans, internos flatus; cum aqua rubra *Lauje* respirandi difficultatem minuit, dentes firmat, flatas discutit.

MUKIA SCABRELLA, *Ara.*; *Fl. Br. Ind.* II 623; *Bryonia scabrella*, *Roxb. Fl. Ind.* II 724.—*Mucca-piri*, *Raccol. Hort. Mal.* VIII t. 13.

Deva tovasini, *Konk.*

Semina in decocto data coleram sedant per sudores et urinam, dysuriam, gonorrhæam sistunt, educulos infuigunt. Succus expressus et cum aqua rosacea ad lito panillo *Mosenti* assumptus, flatus dissipat; radice decoctum idem præstat: quas per se masticata, dentium dolores asbet.

ZEHNERIA UMBELLATA, *Thavates*; *Fl. Br. Ind.* II 625; *Momordica umbellata*, *Roxb. Fl. Ind.* III 710—*Karivi-valli*, *Raccol. Hort. Mal.* VIII t. 26.

Goiinjini, *Konk.*

Integra planta cum foliis *Muricu*, radice *Bel-atalambu*, aqua ac bi-

tyro recenti trita, abscessus aperit. Ex hujus ac *Cobeli* foliis succus elicitor, qui oryza aqua, et pulvis seminis, quilibet eorum ad alia venivitas et exhibitus, sanguinem ac purulentum in arteriis cum extractione, sanguineumque lotium sanat. Ejusdem et *Pakla-Kellera* radix cum pulvere fractus *Canina* sapor trita, moriturum temperibus sanans cum fructu illinitur; eadem cum *Assam-candula* aqua incisa ac cum butyro et lacte mixta conferit in gonorrhoea, dysuria, pituita morbo, de qua supra, veneno, ulisque ex adu'so bili nobis malis: pro soli gonorrhoea conducit ejusdem pulvis cum sandalo, radice *Mulleaga*, lacte, saccharoque commixtus.

ZANONIA INDICA. *Linna.*; *Fl. Br. Ind.* II 635; *Penrvali*, *Rheede Hort. Mal.* 47—49.

Pená-vel *Konk.*; Fracta bandoliera, *P. d.*

Ex foliis tritis balneum preparatur adversus corporis aetate, nervorum contractionem, minores abscessus atque carbunculos. Ex hisdem cum vaccino lacte ac recenti butyro linimentum antispasmodicum conficitur.

XXXVII. BEGONIACEÆ.

BEGONIA ROXBURGHII, *A. D. C.*; *Fl. Fr. Ind.* II 635; *B. malabarica*, *Roxb. Fl.* II 648—*Tajeria-natinum-pali*, *Rheede Hort. Mal.* IX t. 86.

Ámbeli, *Konk.*

Indigena hac planta, excepta radice, utantur in concoctione *Caril*. Folia oleo incocta, linimentum supeditant vulnerarium: ex hisdem calefactis, addito sale fit nodulus, pro putridis purulentisque inserviens dentibus.

XXXVIII. FICOIDEÆ.

MOLLUGO SPERGULA, *Linna.*; *Fl. Br. Ind.* II 612; *Phar-naccum Mollugo*, *Roxb. Fl. Ind.* II 102—*Kaipa-tajira*, *Rheede Hort. Mal.* X t. 24.

Kafvat bhájt, *Konk.*

Succus cum zinzibere, pipere ac sale epotus, dolores ventris *Hemiguimao* incolis dictos, mitigat.

M. STRICTA Linn.; *Fl. Br. Ind.* II 663; *M. triphylla* Roxb. *Fl. Ind.* I 360—Tajeru-jongonam-pullu, *Rheede Hort. Mal.* X t. 26.

Járiasi, *Konk.*

Succus vino permixtus, tridui spatii bis de die assumptus, variolas expellit, febrem concomitantem minuit.

XXXIX. UMBELLIFERÆ.

HYDROCOTYLE ASIATICA, Linn.; *Fl. Br. Ind.* II 669; *Roxb. Fl. Ind.* II 88—Cadagen, *Rheede Hort. Mal.* X t. 46.

Ekpáni, Umdri, *Konk.*; Hortelá brava indiana, *Port.*

Semina contrita ac lacte acido assumpta vertiginem sedat; cum lacte acidospisso, Tays dicto, dysenteriam sistit; in aqua decocta febris calidæ ut et doloribus capitis molestat.

XL. CORNACEÆ.

ALANGIUM, LAMARCKII, *Thwaites*; *Fl. Br. Ind.* II 741; *A. hexapetalum*, *Fl. Br. Ind.* II 502—(1) Angolam, *Rheede Hort. Mal.* IV t. 17.

Angolam, *Konk.*; Espinho sancto, *Port.*

Insaper succus ex arboris radice expressus, et exhibitus vcrmes necat, nec non biliosos ac pituitosos humores per alvum expurgat, et aquas hydropicorum ducit. Radicis pulvis exhibitus antidotum habetur venenatis morsibus serpentum aliorumque venenatorum animalium.

(2) Kara angolam, *Rheede Hort. Mal.* IV t. 26.

Namidú, *Konk.*; Espinho sancto bravo, *Port.*

Ex arboris foliis cum oleo coctis unguentum conficitur vulnerarium. Radix cataractica est humoresque serosos ac pituitosos per alvum educit. Fructus autem raro comeduntur, quoniam impensè sanguinem calefaciunt.

XLI. RUBIACEÆ.

NAUCLEA PURPUREA, *Roxb.*; *Fl. Br. Ind.* III 26; *Roxb. Fl. Ind.* I 515—Katon-Tsjaka, *Rheede Hort. Mal.* III t. 26.

Dhavo paças *Konk.*; Jaqueira falsa, *Port.*

E fructibus expressus succus ventris cruciatus mitigat.

DENTELLA REPENS, *Forst.*; *Fl. Br. Ind.* III 42; *Roxb. Fl. Ind.* I 532—Tsjeru-manneli, *Rheede Hort. Mal.* IX t. 39.

Ját, *Konk.*

Integra planta excepta radice, pulverisata et in sero lactis cum æragine contrita, pedum clavos eradicat: idem pulvis cum medico Piperis et Glycirrhizæ succo ex aqua calida propinatur, vel cum recenti butyro exhibetur tussî (Lusitanis *Coccola de Garganta*) laborantibus.

HEDYOTIS FRUTICOSA, *Linn.*; *Fl. Br. Ind.* III 49—Pontaletsje, *Rheede Hort. Mal.* IV t. 57.

Basoti, *Konk.*; Ihta, *Port.*

Ex arboris foliis in lacte coctis potus paratur, qui somnum prohibet, nec non Lethargo, aliove soporoso affectu laborantibus prodest. E foliis, floribus, cortice, radice, aliisque ejus partibus in aqua coctis balneum fit, epilepsie, aliisque spasmodicis affectibus curandis utile.

H. AURICULARIA, *Linn.*; *Fl. Br. Ind.* III 58; *Roxb. Fl. Ind.* I 365—Muriguti, *Rheede Hort. Mal.* X t. 32.

Gâi-mâri, *Konk.*

Folia trita et butyro permixta unguentum exhibent abressivum maturans et aperientia. Crocus si addatur, et cum oleo nucis Indicæ coquatur vulnere sanat; vulnere enim energia, et nomine et re, huic

planta competit : *Muriguti* enim tantundem dicit ac *bedesana*.

OLDELANDIA CORYMBOSA, *Linna.* ; *Fl. Br. Ind.* III 64 ;
O. lifora, *Roxb.* *Fl. Ind.* I 425—Parpadagam, *Rheeds Hort. Mal.* X.
t. 35.

Cum sandalo citrino in aqua et melle trita, spozema ex hac planta
contra arden'tes, additoque campho et *Tjajaisaijan*, adversus spasmo-
dicas elicitur febris.

MUSCENDA FRONDOZA, *Linna.* ; *Fl. Br. Ind.* III 83 ; *Roxb.*
Fl. Ind. I 557—Belilla, *Rheeds Hort. Mal.* II t. 18.

Sravadi, kirabli, *Konk.*

Radix in decocto data hepatis refrigerando humoribusque pituitosis
expurgandis commola. Eadem trita cum aqua et praeparata corporis
dolorem sedat, oclorumque rubredinem tollit iis applicata ; eadem di-
gesta et decocta in oleo profluens ebibitur ab infantibus pro pustulis in
ore, ad quod etiam servit decoctum corticis in oleo intus sumptum.
Foliorum decoctorum suavis seu vapor partium externarum dolorem
in iis exceptus sedat ; succus foliorum et fructuum simul oculis iulias
nubeculam seu etiam pelliculam visum obtundentem tollit.

WEBERA CORYMBOSA, *Willd.* ; *Fl. Br. Ind.* III 102 ; *Roxb.*
Fl. Ind. I 696—Cupi, *Rheeds Hort. Mal.* II t. 23.

Citá-Mataki, *Konk.* ;

Folia et fructus simul triti et permixti cum lacte mulieris ad pu-
erionem partium affectarum pustulis natis in pedum et digitorum ar-
ticulis adhibentur.

RANDIA MALABARICA, *Lamk.* ; *Fl. Br. Ind.* III 111 ; Po-
soqueria fragrans, *Roxb.* *Fl. Ind.* I 717—Ben-kara, *Rheeds Hort. Mal.*
V t. 35.

Gáli, Báboali, *Konk.* ; Espinho d'urso, *Port.*

Arboris radix siccata, in pulverem redacta, et exhibita, foetum mortuum, ac secundinas post partum in utero relictas expellit, nec non menstrua obstructa provocat. Fructus immaturi diarrhoeam compescunt, et nimium mensium fluxum imminuunt.

GUETTARDA SPECIOSA, *Lin.*; *Fl. Br. Ind.* III 126; *Roxb. Fl. Ind.* II 686—Rava-Pon, *Rheede Hort. Mal.* IV t. 47, 43.

Marotnia, *Koek*; Fala bordão, Arvore triste de dia, *Port.*

E foliis hujus arboris in aqua coctis potus conficitur, qui mulieribus parturientibus exhibitus, partum accelerare dicitur. Cortex in pulverem redactus, et alceribus inspersus luxuriantem ac fungosam carnem exciunt et tollit.

CANTHIUM RHEEDII, *D.C.*; *Fl. Br. Ind.* III 134—Tajrona Kara, *Rheede Hort. Mal.* V t. 37.

Kãnti, Bidani Gall, *Koek*; Espinho salado, *Port.*

Ex arboris foliis in aqua coctis fit oris collatio contra aphthas. Radix contusa, ac similiter in aqua cocta, ejus decoctum si sumatur, hepatis obstructionis aperit, sanguinemque purgat, et exhilarat patientem.

IXORA COCCINEA, *Lin.*; *Fl. Br. Ind.* III 145; *Roxb. Fl. Ind.* I 375—Schetti, *Rheede Hort. Mal.* II t. 13.

Padkãli, *Koek*.

Radix trita et in aqua frigida epota servit pro febre calida ac ardore mammae, ac prodest ex aentibus sanguinem; eadem cum aqua frigida in perunctione adhibita sedat dolores capitis; eadem epota in lacte vacuo ardoribus renam restringendis confert, ubi et fluxui seminis reprimendo seu in gonorrhæa cum liquore *Saris* in perunctione corporis affecti variolis usurpata, prodest; atque colera male usurpata cum lacte coqui Indici servit pro pustulis, aliisque morbis catandis exciendis; fertur quoque pars radialis que versas austrum vergit proficua esse

pro febre habituali seu chronica, et quæ ex frigore oborta est. Ex cortice foliis et floribus extrahitur succus qui mixtus cum oleo de sirgelim intus sumitur ad diminutionem plathorse sanguinis.

I. BARBATA, *Roxb.* ; *Fl. Br. Ind.* III 148 ; *Roxb. Fl. Ind.* I 384—Bem Schetti, *Rhede Hort. Mal.* II t. 14 ?

Dhavi-Paḍkali, *Konk.* ;

Trita cum cumino decocta intus datur pro pustulis natis in umbilico : succus ex floribus expressus ac naribus inditus sedat dolores capitis.

PAVETTA INDICA, *Linn.* ; *Fl. Br. Ind.* III 150 ; *Ixora Pavetta*, *Roxb. Fl. Ind.* I 385—*Pavetta*, *Rhede Hort. Mal.* V. t. 10.

Cita Mataki, *Konk.* ; *Fructa gradinha*, *Port.*

Ex arboris radice cultorum capulse conficiuntur. Cum foliis stercoreantur agri. Ad hæc ex foliis in palmæ oleo fræsis linimentum fit ad tollendam impetiginem, et variolas exsiccandas : Ex iisdem in aqua communi coctis fomentum paratur, ad hæmorrhoidum dolores placandas. Radix cum zinzibere et croco in pulverem redacta, et cum oryze infuso exhibita, hydropem sanat, serositates superfluas per vias urinarias potenter educendo.

MORINDA CITRIFOLIA, *Linn.* ; *Fl. Br. Ind.* III 155 ; *Roxb. Fl. Ind.* I 541 ; *M. bracteata*, *Roxb. l.c.* 544—*Cada-Pilava*, *Rhede Hort. Mal.* I t. 52.

Makaḍa-pâlâ, *Konk.*

Succus ex ea integra expressus ac cum oleo ex foliis fici inferni decoctus parti affectæ podagrâ convenit, si cum eo perungatur ; ad quod etiam servit perunctio radice contritæ et mixtæ cum aqua.

M. UMBELLATA, *Linn.* ; *Fl. Br. Ind.* III 157 ; *M. scandens*, *Roxb. Fl. Ind.* I 548—*Pada-vara*, *Rhede Hort. Mal.* VII t. 27.

Rāna-vali, Mākāḍipālā, *Konk.*; Fructa macanda, *Port.*

Succus expressus et haustus intestinorum tormina tollit.

GEOPHILA RENIFORMIS, *Don*; *Fl. Br. Ind.* III 178; Psychotria herbacea, *Roxb. Fl. Ind.* I 533—Karinta-kali, *Rheede Hort. Mal.* X. t. 21.

Kārlī, *Konk.*

Sero lactis incocta diarrhœam sistit; oleo incocta ophthalmica symptoma tollit.

SPERMACOCE HISPIDA, *Linna*; *Fl. Br. Ind.* III 200; *Roxb. Fl. Ind.* I 378—Tardavel, *Rheede Hort. Mal.* IX t. 76.

Gedī, *Konk.*

Succus expressus cum butyro decoctus hentericæ prodest. Radix antidotum est, si trita pectus cum illa illinatur; qui humor in pectore remanens nulla veneni est suspicio, sin, certissimum est signum venenum subesse.

XLII. COMPOSITÆ.

VERNONIA CINEREA, *Less.*; *Fl. Br. Ind.* III 233;—Pnam-curundala, *Rheede Hort. Mal.* X t. 64.

Succus in patina bene agitatus oculique illitus, suffusioni resistit; balneum et ex illo præparatur antimaniacum; additis ejusdem generis medicinis febres fugat; globus quoque ex illo conficitur contra ophthalmiam.

V. ANTHELMINTICA, *Willd.*; *Fl. Br. Ind.* III 236; Serratula anthelmintica, *Roxb. Fl. Ind.* III. 405—Cattu-Schiragam, *Rheede Hort. Mal.* II t. 24.

Calageri, kâlem girem, *Konk.*

Pro pustulis corporis si contrita cum oleo coquantur, ac cura ejus decocto fiat perunctio : in febre ex colera oborta confert delibutio capitulis cum succo qui ex ea tribu expressus est. Semina in pulvere n. relicta et cum aqua calida epota pro tussi dantur, ac flatibus tollendis serviunt, uti et enecandis vermibus in infantibus, pelluntque ventris dolores ac urinam cient, partique affectæ podagra vel doloribus ex obortis, commoda facta ex eis perunctione cum aqua calida.

ELEPHANTOPUS SCABER, *Linn.* ; *Fl. Br. Ind.* III 242—*Ann-Schovadi, Rhesde Hort. Mal.* X t. 7.

Astipada, Hathi pâyî, *Konk.*

Trita cum cumino in lacte acido sumpta fluxus ventris sistit, præcipue dysenteriam, intestinorum tormina, ventricque tumores ; adhibito Saccharo antimelancholicum est. Folia cocta cum succo illis propriantur qui spitione laborant sanguinis ; decoctam ex radice et foliis dysuriam tollit.

GRANGEA MADERASPATANA, *Poir.* ; *Fl. Br. Ind.* III 247 ; *Artemisia maderaspatana, Roxb. Fl. Ind.* III 422—*Nelam-pata, Rhesde Hort. Mal.* X t. 49.

Pulvis in phægælenicis prodest ulceribus ; cum cyprino lacte mixtus fancium dolores mitigat ; cum uvis passis et batre decoctus, anthydropticus est, lepram, noxios flatibus et cachectiam tollens ; cum zinzibere pipere et saccharo diglutitus intemperatam bilem corrigit, epilepsiam, maniam, comæque canitiem abigit.

SPHÆRANTHUS INDICUS, *Linn.* ; *Fl. Br. Ind.* III 275 ; *S. mollis, Roxb. Fl. Ind.* III 446—*Adaca-manjem, Rhesde Hort. Mal.* X t. 48.

Mûmûji, *Konk.* ;

Ex integra hac planta, si radicem excipias, decoctum præparatur

in cardiologia flatulenta, ventrisque terminibus, praesertim si canino pulverisato affecta pars aliquandiu fricatur; sic et ex illa pulvis, qui cum oleo frigus linimentum praebet contra scabiem, aliosque cutaneos morbos; cum melle mixtas tarsi anuletur. Et: insolata radice pulvis conficitur stomachicus, qui et intestinorum cruditibus adversatur; ejus cortex cum sero lactis tribus et exhibitus haemorrhoides sanat; ab indigenis in confectione potus adhibetur.

ECLIPTA ALBA, *Hassk.*; *Fl. Br. Ind.* III 304; E. prostrata, *Roxb. Fl. Ind.* III 433—Cajouneum, *Récode Hort. Mal.* X t. 41.

Máko, *Konk.*

Decoctum ex hac planta confectum et exhibitum, capitis et dentium sedat dolores. Sarcas una cum butyro epitas in omnibus symptomatis doloribusque juvat arthriticis; cum Vaccas urina datur pro morbillis regionis enlemis; ex pulvere cum oleo pernixto pillulae conficiuntur adversus vertiginem, humoresque capitis phlegmaticos. Folia in pulverem redacta, cum sale pipere et succo limonis permixta appetitum promovent, mauseam pellunt.

BLAINVILLEA LATIFOLIA, *DC.*; *Fl. Br. Ind.* III 305; Verbesina Lavenia, *Roxb. Fl. Ind.* III 442—Pu-tumba, *Récode Hort. Mal.* X t. 63.

Succus ventris dolores mitigat; ex foliis expressus liquor cum Piperis erhinum preparatur pro maniacis.

WEDELIA CALENDULACEA, *Fl. Br. Ind.* III 306; Verbesina calendulacea, *Roxb. Fl. Ind.* III 440—Poe-catsjeucam, *Récode Hort. Mal.* X t. 42.

Bringarasi, *Konk.*

Succus cum momento feruginis probe testat, et vacce urinae maceratae pro hydropsia assumitur. Crines auget si cum illo caput abluitur.

tur : decoctum foliorum cum oleo recenti capitis dolorem sedat ; de cætero vires cædem ut illæ Canjenseam.

WEDELIA BIFLORA, DC. ; *Fl. Br. Ind.* III 306 — Vallis-manga-nari, *Rheede Hort. Mal.* X t. 40.

Ámálí, *Konk.*

Folia contrita cum succo recenti zinziberis triturata, in doloribus flatulentis intestinorum exhibentur.

ARTEMISIA VULGARIS, *Lin.* ; *Fl. Br. Ind.* III 325 ; *Rozb. Fl. Ind.* III 420 — Kátu-tsjele-pu, *Rheede Hort. Mal.* X t. 45.

Surpin, Mánapatri, *Konk.*

Planta hæc ægrotantis pulviori substrata, vitæ periculum indicat, si inde somnum non capiát æger ; oleo sergelim cum *Psit-Elu*, et vino adusto incocta, partibus affectæ applicata, empyemata, et reconditis ventricali abscessus, antequam maturierint, sanat, in primis si ejusdem succus cum melle bibatur ; cum *vino a lasti* et Europæo simul ac Malabarico *Marrubio* in formam emplastri relecta, et dolenti parti imposita, spasmo medetur ; cum melle jejune deglutita hydropen solvit. Radix oleo sergelim incocta panico insucta et singulis duodecim horis renovata exanthemata purgat ; cum lacteo nucis Iulicæ succo decocta phagedenica curat ulcera ; radicis cortex affectæ parti impositus, idem prestat.

EMILIA SONCHIFOLIA, DC. ; *Fl. Br. Ind.* III 336 ; *Cacalia-sonchifolia*, *Rozb. Fl. Ind.* III 413 — Muel-schevi, *Rheede Hort. Mal.* X t. 68.

Undiram-pánám, *Konk.*

Decoctum antifebrile est et asthmaticum. Succus ventris sedat finctus cum saccharo assumptus. Contrita cum butyro apostemata maturat et aperit.

XLIII. GOODENOVIEÆ.

SCÆVOLA KÖENIGH, *Vahl.*; *Fl. Br. Ind.* III. 421; *S. tea-*
cada, Roxb. Fl. Ind. I 527—*Bella Modugam, Rheede Hort. Mal.* VI
 t. 59.

Taracotha, *Konk.*; Ammaco (macho) *Port.*

Ex arboris foliis cataplasma conficitur, quod tumoribus impositum
 potenter eos emollit et maturat. Ex iisdem in aqua coctis Apozema
 preparatur, quod urinam movet et menstrua obstracta provocat.

XLIV. PLUMBAGINEÆ.

PLUMBAGO ZEYLANICA, *Linna.*; *Fl. Br. Ind.* III 480; *Roxb.*
Fl. Ind. I 462—*Tamba-codiveli, Rheede Hort. Mal.* X t. 8.

Dhavo Chitrak, *Konk.*

Radix in aqua decocta in potum adhibetur pro vesicalis ac pustulis
 aqueis quæ sub pedibus nascuntur.

P. ROSEA, *Linna.*; *Fl. Br. Ind.* III 481; *Roxb. Fl. Ind.* I
 463; *Schetti-codiveli, Rheede Hort. Mal.* X t. 9.

Tambido-chitrák, *Konk.*

Radix trita et in aqua calida exhibita confert in febre frigida ut
 et si arteriæ super imponatur; in lacte acido sumpta conducit in dy-
 senteria.

XLV. MYRSINEÆ.

EMBELIA ROBUSTA, *Roxb.*; *F. Br. Ind.* III 515; *Roxb.*
Fl. Ind. I 587—(1) *Tsjerium Cattam, Rheede Hort. Mal.* V t. 11.

Phátar-ponni, *Konk.*; Ramiso'i, *Port.*

Ex arboris foliis in aqua coctis fit oris collutio, gingivis succidis

ac praelucidis curandis utilis. Etiam à cortice cum semine cumini in lactis sero decocto gargarisum paratur, quod aphasia potenter curari dicitur.

(2) Basal, *Rhæde Hort. Mal. V t. 12.*

Vilengi, *Konk.* ; Fructa pedrica, *Port.*

E tenerioribus arboris foliis, ad lito zinzibora, in aqua calida gurgisima paratur, faucium affectibus tollendis utile. E hucus in hucus frigidis nuquentum conficitur, quod fronti ac temporibus illitum praesentibus valde professe dicitur ; Nuclei vero eorumdem avançia hucus necant. Radicis cortex siccatas, ad denta denta adultibus obestibus mederi perhibetur.

ARDISIA HUMILIS, *Vahl.* ; *Fl. Br. Ind. III 529* ; A. solanacea, *Konk. Fl. Ind. I 330*—Kaka-Njara, *Rhæde Hort. Mal. V t. 23.*

Nihedonsi, *Konk.* ; Fructa gibique preta, *Port.*

Epressus ex arboris foliis serous, et cum melle nudo lactice sapore exhibitus lumbicos necit : et cum melle opus eosdem expellit.

XLVI. SAPOTACEÆ

MUMUSOPÉ BLENGI, *Lam.* ; *Fl. Br. Ind. III 543*—Blengi, *Rhæde Hort. Mal. I t. 20.*

Vavalli, *Vamvo* *Konk.* ; Vomvoleiro, *Port.*

Radix trita cum aceto turpore in fœcie tollit, parte affecta cum eo linita, eadem cum aqua est. melle sumpta servit pro oris pestibus. Corticis decoctum servit pro angina, ut et dolore gradum quibus ore cum eo ablato. Aqua distillata ex floribus et opota profusa est pro melancholicis et febricitantibus ; gravidis in difficili partu fructus triti in aqua calida commoculis dantur.

M. KAUKI, *Lam.* ; *Fl. Br. Ind. III 549*—Manyl-kara, *Rhæde Hort. Mal. IV t. 25.*

Manil-gale, *Adamchâm pholâm*, *Konk.* ; Fructa de Manilla, *Port.*

Fructus maturi inter Bellaria comeduntur, liques appetitum augent, ac alimentorum in ventriculo fermentationem non parvam juvant. Ex arboris foliis cum radice carena, et zinziberis foliis coctis et contatis, cataplasma conficitur, quod tumoribus quibuscumque impostum potenter eos mitigat. Ex hisdem foliis in sesumi oleo coctis, alio cortice hujus arboris pulverisato, linctus preparatur, qui affectui palsyico Epidemio Indis *Berberi* dicto, sanando summopere conducit.

XLVII. EBENACEÆ.

DIOSPYROS EMBRYOPTERIS, *Pers.*; *Fl. Br. Ind.* III. 555; *D. glutinosa*, *Roxb.*, *Fl. Ind.* II. 533.—*Panitsjika-muram*, *Rivale Hort. Mal.* III. t. 41.

Tembiri, *Kozê*; *Fructa de grade*, *Port.*

Arboris hujus folia tenera cum aqua trita ac potui data vel etiam succo è fructibus tenerioribus expresso egregium est ad aphthas et linguæ fissuras remedium, si ore eviniscatur. Item succo oculis instillatus ophthalmiæ conducit. Arbores cortex in pulverem redictus ac cum oryza infusus, et expresso è statu nunc Indiarum siccis mixtus, atque febricitantibus exhibitus certam potenter emendat: insuper decoctam ex hoc cortice paratur, cui mal' uluiscatur, ilique assumptam ventris tormina solvit. E seminibus oleum exprimitur, quod cum zinzibere et semine cumini sumtum hydropsicis succurrit; insuper alvi craticus lenis, emulsiq; evacuat. Succo denique glutinosus, ginnosus, pelluculus, qui è fructibus hauri potest exprimitur, ralis concremensis ac rufescens seu ex rufo-nigricans, et velat viscosus, optimam evadit glidem, que ad quoscunq; arthriticis conjungentia utantur incole: quæ in Malabar et Lusitani in compingentis libris solo hujus gliscine utantur, quique ad illæciliat' naryquam aborxii sunt: nec non piacutores eodem hoc glutinoso succo velis sua indolentia, ut durabilia evadant.

XLIII. OLEACEÆ.

JASMINUM SAMBAC, *Ait.*, *Fl. Br. Ind.* III. 591; *J. Zam-*

bac, *Roxb. Fl. Ind.* I. 88—(1) Nalla-Mulla, *Rheede Hort. Mal.* VI. t. 50.

Mogari, *Konk.*; Fula mogari, *Port.*

Folia rosarum more distillant aquam, vel oleo infunduntur, quippe cum sint Jasmini species, gratissimam fundunt odorem. Hæc si vel sola vel cum radice oleo incocta exhibentur, aepsiam emendare dicuntur.

(2) Kaddu-Mulla, *Rheede Hort. Mal.* VI. t. 51.

Mecastri, Doli mogari, *Konk.*; Rosa mogari, *Port.*

Rabidi canis morsus contrita et oleo frixa externe applicata folia sanant. Veneno serpentino radix cum calamo aromatico ex orizæ aqua decocta occurrit.

(3) Tsjiram-Mulla; *Rheede Hort. Mal.* VI. t. 55.

Mogari, *Konk.*; Bare Mogari, *Port.*

Folia oleo incocta balsamum fundunt, si capiti inungatur, oculorum quævis tollens vitia, et visum corroborans; horum pulvis cum croco ac pinguedine cuti illitus pruriginem vis demit; ex radice ad peculiarem usum exprimitur oleum.

(4) Katu-Mulla, *Rheede Hort. Mal.* VI. t. 56.

Visa Mogari, *Konk.*; Mogari falso, *Port.*

Succus foliorum olei inservit coctioni, et præterea nullum præstat usum; facultates seu mavis vires, plane sunt incognitæ.

J. ROTTLERIANUM. *Wall.*; *Fl. Bl. Ind.* III. 593 — Katu-Tsjiregam-Mulla, *Rheede Hort. Mal.* VI. t. 54.

Saio, *Jâi, Konk.*; Mogaro da serra, *Port.*

Hujus folia ex oleo cocta ocalorum tollunt vitia. Radix vero cum calamo exhibita aromatico optime cujusvis serpentis moribus medetur.

J. ANGUSTIFOLIUM, *Vahl.*; *Fl. Br. Ind.* III 598; *Roxb. Fl. Ind.* I 96—Catu Patsjegam Mulla, *Rheede Hort. Mal.* VI t. 53

Nara Jâi, *Konk.*; *Jasnim damato, Port.*

Ussm, si oleum quod excoquitur, excipias habet nullum.

J. GRANDIFLORUM, *Linna.*; *Fl. Br. Ind.* III 603; *Roxb. Fl. Ind.* I 100—Pitsjegam-Mulla, *Rheede Hort. Mal.* VI t. 52.

Sai, *Jai*, vhaçoli Jâi, *Konk.*

Cortex cum foliis ex oleo butyroque coctus donec in his unguenti crassitudo fiat, ulceribus et abscessibus phagedænicis medetur.

OLEA DIOICA, *Roxb.*; *Fl. Br. Ind.* III 612; *Roxb. Fl. Ind.* I 96—Kari-vetti, *Rheede Hort. Mal.* IV t. 54.

Paça-dâliki, *Konk.*; *Querillas, Port.*

Succus è foliis hujus arboris expressus, et cum sero lactis exhibitus, egregium est vomitorium, humoresque biliosos ac pituitosos per superiora educendo, ventriculum potenter expurgat.

XLIX. APOCYNACEÆ.

RAUWOLFIA SERPENTINA, *Benth.*; *Fl. Br. Ind.* III 632; *Ophioxylon serpentinum, Roxb. Fl. Ind.* I 694—Sjonanna-Amelpodi, *Rheede Hort. Mal.* VI t. 47.

Matavi-alocs, Âjaki, *Konk.*; *Talona, Port.*

Hujus radix solum modo ad serpentium scorpionumque morsus valet.

VINCA PUSILLA, *Murr.*; *Fl. Br. Ind.* III 640; *V. parviflora, Roxb. Fl. Ind.* II 1—Cupa-vela, *Rheede Hort. Mal.* IX t. 83.

Râni-kel, *Konk.*

Folia indigenæ adhibent in concoctione *Caril.*

ELLERTONIA RHEDEI, *Wight.*; *Fl. Br. Ind.* III 641—Kametti-valli, *Rheede Hort. Mal.* IX t. 14.

Ulu-valli, *Kork.*

Succus cum succo limonis naribus injectus apismo et epileptiis medetur. Planta cum fructibus *Siboe* contrita ac vizario injectam piscibus anolytam est toxicam. Cera seminibus *Agavum*, *assa-tellita* et *sinzibere* in oleo *sargolien* cum *Tel-Elu* et *Arvora* ac erize lobura, vel etiam cum mirra, *Tala* et *peru-lubila* asservendi forma calida, doloris arthriticis, *Lubacora* obtinuit, praesens ac *Sinzibere* tibi, per septimana curabit. Eadem cum *Siboe* et *Arvora* cum *Arvora* cyreghassa pulveris, ac *Arvora* ladeque ebullato, nullaque indola, pro potu habetur in *Arvora*, *Arvora* atque *Arvora*.

ALSTONIA SIBOERENSIS, *Brown.*; *Fl. Br. Ind.* III 642—*Pala, Rhœde Hort. Mal.* I t. 45.

Santeni, *Sintvin, Kork.*

Cortex ejus tunc et in decocto datus commodus est ventri lenienti stomacho roborando fl-tibusque discentiis ac ardoribus febris restringendis; idem in decocto datus adito momento alicuique piperis stomachi concoctionem adjuvat. Idem tribus et simpliciter in aqua collata epotus prodest in febre frigida, et hinc mole etiam tumorem evocat. Idem tribus unâ cum aqua et oleo di-*Arvora* et oleo *Arvora* et purgationem confert, quo modo usurpata sine potu pro *Arvora* r-*Arvora*. Corticis decocti vapor exemptus in parte affecta dolore mitigat. Idem cortex cum semine *Colla-Parvâ* collata in oleo auribus malè seu graviter audiendam proficere indicat.

HOLARRHENA ANTIDYSENTERICA, *Wall.*; *Fl. Br. Ind.* III 644—*Codaga-pala, Rhœde Hort. Mal.* I t. 47.

Ategó-cudó, *Dhavó Kudó, Kork.*

Cortex contritus et epotus in lacte acido sisti fluxum ventris. Cortex radices proficere esse pro fluxu ventris quovis, sive dysenterico sive henterico, uti et pro fluxu hæmorrhoidali eodem modo sumptus. Idem in aqua decoctus et epotus servit pro tumore corporis. Radix trita et cum aqua, in qua *oryza* lota fuit, decocta, confert pro anxina gutturi et colli facta lotionis, servit quoque pro tumore corporis eodem modo usurpata, uti et pro dolore anarritico partibus affectis apposita,

dentium quoque dolores sedat, vermes in iis eiecendo, ejus decocto in ore detento. Semina in decocto data prostant in febre calida, uti et ardore jecoris ac in poligra; lumbricos quoque eiecit.

TABERNÆMONTANA HEYNEANA, Wall.; *Fl. Br. Ind.* III 646—Caruta-pala, *Riende Hort. Mal.* I t. 46.

Cudó, Nágila-kuðó, *Konk.*

Radicis cortex tritus et epotas in aqua calida flavum ventris sistit ac prodest in dysenteria in lacte datam. Idem tritus cum aqua et apocrematis appositus ea resolvit.

T. CORONARIA, Br.; *Fl. Br. Ind.* III 646; *Roxb. Fl. Ind.* II 23—Nandi-Ervatam, *Riende Hort. Mal.* II t. 54.

Vallo-Nandita, *Konk.*

Succus ex ea expressus ac cum oleo mixtus dolores oculorum sedat facta capitis percussione. Radix masticata et in ore detenta dentium dolores sedat vermes eiecendo, cum oleo decocta servit pro omni inflammatione capitis ac praesertim ejus d. larem sedat frons percussione; eodem trita et in aqua epota lumbricos eiecit, trita cum sacco limoniae et oculis indiae tuberculam tollit.

WRIGHTIA TOMENTOSA, *Ram. & Schultes.*; *Fl. Br. Ind.* III 653; Nerium tomentosum, *Roxb. Fl. Ind.* II 6—Nalem Paja, *Riende Hort. Mal.* IX t. 3, 4.

Utaga Cudó, Kálo-kuðó, *Konk.*

Belneo ex foliis et cortice arthritice curantur febres; algida vero pilulae ex fractibus formatis; hincamento ex radice et vitando curantur in cryza; lutura et sero lactis contrita, calida depellitur arthritidis; ex cortice radiceis levigato sic globulis ad magnitudinem Archa, qui devoratus prescutanea in morou serpenteis remedia est.

CHONEMORPHA MALABARICA, *G. Don.*; *Fl. Br. Ind.* III 662 (specie divulosa)—Pal-velli, *Riende Hort. Mal.* IX t. 12.

Folla cum orizae lutura trita carbunculos exsicant exilia; radix antifebrilis est, sumpta cum coriandro et zinzibero,

ANODENDRON PANICULATUM, A. DC. ; *Fl. Br. Ind.* III 668 ; *Echites paniculata*, Roxb. *Fl. Ind.* II 17—Kaka-kodi, *Rheede Hort. Mal.* IX t. 8.

Kiti, *Konk.*

Folia in suppressis lochiis usui veniunt ; eadem cum lacte *Nucis Indicæ* contrita et pectori illita, dolorum cordis palpitationem, atque hinc prominentem præfocionem spasmodicamque corrigunt. Radix cum teneris arequeine, palmæ sylvestris ac *Toddali* radicibus in ebulyrato lacte ac vacca lotio decocta, affectusque parti illita, renum doloribus ac Ischiæ ; vel etiam cum *Tosdo*, *Uliaja* aliisque radicibus in lacte aëro, et oleo foliorum de Inferno cocta gurgulis, vel denique cum radice *Ta'u-Dama* primo in aqua dein in oleis sergelim, *Bepa-Mes-E'u* ac postea in ebulyrato lacte, tamarindorum et *Muringu* succis adceræ consistentiam cocta, in universam arthritidi medentur, quarum octoginta species incolæ enumerant ; quemcumque enim dolorem flatus corporis efficiant, arthritidis, tamquam morbi principis, nomine salutant.

L. ASCLEPIADEÆ.

CRYPTOLEPIS BUCHANANI, Roem. & Schultes. ; *Fl. Br. Ind.* IV 5 ; *Nerium reticulatum*, Roxb. *Fl. Ind.* II 8—Katu-pal-valli ; *Rheede Hort. Mal.* IX t. 11.

Planta hæc oleo incocta oculorum vitia emendat ; pedum tumores, quos ab incantamenti occultis viribus, derivat populi hujus superstio, evanescere facit ; ubi trita hujus plantæ folia affectis partibus applicantur.

HEMIDESMUS INDICUS, Br. ; *Fl. Br. Ind.* IV 5 ; *Asclepias pseudo-sarva*, Roxb. *Fl. Ind.* II 30—Naru-nundi, *Rheede Hort. Mal.* X t. 34.

Upâr-âlli, *Konk.* ; Salsaparrilha da India, *Port.*

Radix concisa cum Allio ac *caris Anatina* in oleo *nucis Indicæ* decocta decoctum antihæmorrhoidale præstat. Radicis pulvis per se exhibitus, antifebrilis est ; cum saccharo mixtus, quartanis adversatur ;

cum vino sumptus, vel pro balneo adhibitus empyemati et internis abscessibus medetur. Eadem radix læse a colubro virulento parti imposita, alexicaca energia commendatur: cum aqua trita potionem exhibetur contra diarrhæam. Bulbus radicis cum lacteo nucis Indicæ succo haustus, hæmorrhoides tollit. Ex ejusdem cortice, lacte et recenti butyro levigato, linimentum præparatur, adversus bubones venereos, extrinsecè applicandum; hæmorrhoidibus resicit idem bulbus, si pulverisatus cum oleo, in et formam libaminiis redactus, comedatur.

CALOTROPIS GIGANTEA, *Br.*; *Fl. Br. Ind.* IV 17; *Asclepias gigantea*, *Roxb. Fl. Ind.* II 30—(1) *Ericu*, *Rheede Hort. Mal.* II. t. 31.

Roey, Rûi, *Konk.*

Ejus decoctum cum oleo in unctione partis affectæ podagra juvat. Radix in decocto data confert pro febre frigida; eadem quoque servit pro tumoribus mulierum quos habent post partum; eadem cum aqua adhibita in lotionem partis morse a colubro dicto Cobra Capella, juvat, simpliciter masticata pro doloribus dentium confert. Saccus foliorum extractus ac cum oleo decoctus parti affectæ doloribus arthriticis conducit, ad quod etiam servit si folia cum oleo peruncta et ad ignem calefacta apponantur.

(2) *Bel-Ericu*, *Rheede Hort. Mal.* II t. 36.

Davi-Roey, Dhavi Rûi, *Konk.*

Trita et cum oleo de Vepi decocta [in unctione partis affectæ] podagra prodest. Radix et folia trita et in lacte data servantur pro venenato morsu güris; easdem quoque cum *Erica* virtutes habet.

PENTATROPIS MICROPHYLLA, *Wight & Arn., Fl. Br. Ind.* IV 20; *Asclepias microphylla*, *Roxb. Fl. Ind.* II 35—*Parparam*, *Rheede Hort. Mal.* IX t. 17.

Foliorum succus cum succo limonis infantibus ventre dolentibus, aliisque spasmodica febre ægrotantibus exhibetur. Oleo mixtus atque extrinsecè adhibitus, oculorum vitia corrigit, efficacius autem, si quando decoctum, ex eodem succo præparatum assumatur.

HOLOSTEMMA RHEEDEI, *Woll.* ; *Fl. Br. Ind.* IV 21 : *Asclepias annulata*, *Roxb. Fl. Ind.* II 37—*Ada-kodien*, *Rheede Hort. Mal.* IX t. 7.

Dudarli, *Konk.*

Radix pulverisata et oculis inspersa nubeculas aufert, vel cum butyro cocta et epota. Bulbus cum radice *Palmæ agrestis* et *Schelegu* tritus et cum pulvere *Ada Kodien* in paño consutus, adjecto modico, *Sandali*, *Peribili* nigre et recenti butyro leuto igne ad cereæ consistentiam redactus, pro quovis oculorum vitio mane et vesperi sanitur ; idem cytrino Sandalo ac saccharo mixtus, in pulverem redactus, et in pillulas formatus oculorum pathemata ex bile sanat : vel denique si cum foliis *Picuum Inferni*, radice *Tatu-Dama* primum in aqua, dein in vaccino lacte decoquatur et saccharo miscatur, quovis oculorum morbo opitatur : vires enim hujus plantæ plane ophthalmicæ sunt.

COSMOSTIGMA RACEMOSUM, *Wight.* ; *Fl. Br. Ind.* IV 46 ; *Asclepias racemosa*, *Roxb. Fl. Ind.* II. 32—*Wattoo-Valli*, *Rheede Hort. Mal.* VII t. 32.

Maroi, *Konk.* ; Torique, *Port.*

Folia cum cortice lingue contrita ulcera inveterata exsiccant : cortex cum sandalo et muliebri lacte in formam noduli adhibitus, præstantissimum Causonis remedium est.

DREGIA VOLUBILIS, *Benth.* ; *Fl. Br. Ind.* IV 46 ; *Asclepias volubilis*, *Roxb. Fl. Ind.* II 36—*Wata-kaka-kodi* *Rheede Hort. Mal.* IX t. 15.

Belokâkusini, *Konk.*

Radix cum aqua orizæ parti apposita ictum colubri cobra capella frustra facit. Cortex radice tritus ac cum aqua sumptus doloris capitis inservit, quo mulieres post partum sunt obnoxie.

HOYA PENDULA, *Wight.* ; *Fl. Bl. Ind.* IV 61 ; *Asclepias pendula*, *Roxb. Fl. Ind.* II 36—*Nausjera-patsja*, *Rheede Hort. Mal.* IX t. 13.

Dadu-valli, Dád-vel, *Koñk.*

Integra hæc planta cum aqua longè verennis per vomitum expellit; idem præstat si cum sandalo vero, ovo ac muliebri lacte, temporibus atque pectori inungatur. Trita cum radice Car-Ela-regon, atque orizæ incocta radix, ac læse parti illita, rabidi felis moram frustra facit. Succus cum *Codogon*, *Manga-Nari*, *Covinta-Peli* et *Sowala* mixtus ac temporibus illitus, toxici vires infringit. Cum floribus palmæ agrestis, Coluppa, et *Sowstrisvari* cum muliebri lacte sumptus, plane medicamentum est Alexipharmacum; cum radice *Angolam*, *Ticu-tali* et *Amel-Podi* vaccino lacte si incoquantur, capitiq; ac pectori illinatur, omne virus æternum, et inde ortum syncopæ ac præcordiorum æstam tollit; ita ut hujus plantæ energia in totum sit alexicaço.

CEROPEGIA CANDELABRUM, *Lin.*; *Fl. Br. Ind.* IV 70—*Njota-njodem-valli*, *Rhue. Hort. Mal.* IX t. 16.

Zina-puti-válli, *Koñk.*

Hujus et *Kari-Bepá*, *Ela-Calli*, *Bala* et *Micobolani folia* trita in nodulo coactigatur; qui in aqua Orizæ calefactus et affecto loco applicatus, ventris ex flatibus humorem minuit, vel si cum foliorum tamarindorum fibris et *Mariyá* cortice in *maria* decoquantur, linimentum contra articulare exhibent morbum.

LI. LOGANIACEÆ.

FAGREA OBOVAIA, *Will.*; *Fl. Br. Ind.* IV 83—*Modagam*, *Ricorde Hort. Mal.* IV t. 55.

• • • *Coroña*, *Koñk.*; *Amnaco. Per.*

Ex arboris cortice et radice in aqua coctis Apozema paratur, inveterato capitis dolore tollendo utile. E foliis parie conficitur ad menstrua suppressa provocanda.

STRYCHNOS COLEBRINA, *Lin.*; *Fl. Br. Ind.* IV 87—*Sichu-heta* aliis *canina*, *Paráñ* *Hort. Mal.* VII t. 3.

Dhavo-cáro, Dhavo kájro, *Konk.* ; Pau de cobra, *Port.*

Fructus contusi et capite impositi, maniacis prosunt. Radix trita cum pipere, diarrhæam sistit et ventris cruciatus; cum oleo cocta et illita artuum dolore lenit.

S. RHEEDII, *Clarke* ; *Fl. Br. Ind.* IV 87—Modira-carinam, *Rheede Hort. Mal.* VIII t. 24.

Pau de solor, Pan de cobra, *Port.*

Folia cum zinzibere et lacte ad consistentiam unguenti cocta arthritidem, *Vilvada* Malabaribus appellata, abigit; balneum ex illis præparatum idem præstat.

S. NUX-VOMICA, *Lin.* ; *Fl. Br. Ind.* IV 90 ; *Rozb. Fl. Ind.* I. 575—Caniram, *Rheede Hort. Mal.* I t. 37.

Uáro, Kájro, *Konk.* ; Noz vomica, *Port.*

Radix decocta et epota purgativa est humores per inferiora evacans, quomodo etiam prodest pro febris pituitosis, doloribus colicis, intestinorum torminibus, ventris fluxibus eadem quoque vires habet, si in infusione detur, vel si ejus decoctum cum momento piperis sumatur; conducit in podagra, si cum ejus decocto pars affectâ ungatur, confertque sedandæ vertigini capitis, atque etiam in atra bili, si ejus decoctum cum lacte vacæ mixtum ad delibationem capitis adhibeatur. Cortex contritus et mixtus cum aqua, in qua fuit oryza, flavæ bilis fluxum reprimit. Folia decocta rheuma seu catarrhos sistunt, facta lotionem corporis. Succus ex foliis expressus ac in decocto datus capitis dolores sedat, largitus epotus veneni vires habet mortem inducens, in stercore hominis comesto salus est. Flores sedant unguinum, si triti ac in oleo *Coqui Indici* cocti his apponantur. Usus Seminum in fructibus per duos annos continuatus, sumpto singulis diebus uno aut duobus numero, efficit ut morsus venenatus colubri, vulgò *Cobra Capslla* dicti, nullas noxas adferat.

LII. GENTIANACEÆ.

CANSCORA PERPOLIATÁ, *Lamk.* ; *Fl. Br. Ind.* IV 104—Cansjan-cora, *Rheede Hort. Mal.* X t. 52.

Cum *Croco* viridi trita, cutis maculas, in fasciis albas, in albis hominibus fuscas auferit.

LIMNANTHEMUM CRISTATUM, *Griseb.*; *Fl. Br. Ind.* IV 131; *Menyanthes cristata*, *Roxb. Fl. Ind.* II 28—*Tsjeroea-citambel*, *Rheede Hort. Mal.* XI t. 29.

Cumudi, *Konk.*

Ex bulbo radiatis in aqua, vino adusto butyroque cocto, linimentum præparatur antihæmorrhoidale. Ex eodem cum *cancribus* terrestribus in oleo frixio conficitur medicamentum, contra molestum capitis dolorem, temporibus nempe illinitum. Ex eodem cum utroque sandalo et lacte fit potio ad corporis æstam restringendam.

L. INDICUM, *Thwaites*; *Fl. Br. Ind.* IV 131—*Nalel Ambel*, *Rheede Hort. Mal.* XI t. 28.

Cumudi, *Konk.*

Integra planta trita et cum butyro cocta et intus sumpta, antidotum est contra morsum serpentis *Cobra Capella* dicta.

LIII. BORAGINEÆ

CORDIA MYXA, *Linna.*; *Fl. Br. Ind.* IV 136; *Roxb. Fl. Ind.* I 590—*Viditmarum*, *Rheede Hort. Mal.* IV t. 37.

Quarena, *Konk.*; *Fructa d'entrado*, *Port.*

Cæterum fructus hi sale et aceto condiantur in *Atypar*; maturiores vero comeduntur, at alvum relinquunt adstrictam. Ex arboris cortice succus exprimitur, qui cum oryze infuso et concreto Nucis Indice succo exhibitus, vehementes alvi cruciatus (quos *Tripsas Sabulæ* hæc est *intestinorum spasmodi*, dicunt Lusitani) sedat: Idem succus pedum clavis admotus eosdem emollit, sensimque tollit: Radix quocumque modo sumpta alvum movet. E foliis in aqua communi alia additis specificis, coctis Apozema fit, quo Indigine plerique quotannis per quadraginta dies continuos uti solent, adversus viscerum quorundam obstructions et artuum dolores. Succus e foliis expressus, et cum

conchylii eujusdam pulvere in linimenti formati mixtus (ordas faciei, totiusque corporis maculas delet, si eo illinantur.

HELIOTROPIUM INDICUM, *Linna.*; *Fl. Br. Ind.* IV 152; *Rorb. Fl. Ind.* I 454—Benapatsja, *Rheede Hort. Mal.* X t. 48.

Ágerú, *Konk.*

Integra planta in oleo nucis Indicæ decocta, morbum, *Pitao*, dictum exsiccando curat. Idem in virulenti majoris Vulpis (Belgæ dicunt FAKHALSEN) morsu exhibetur.

LIV. CONVULVULACEÆ.

ERYCIBE PANICULATA, *Rorb.*; *Fl. Br. Ind.* IV 180; *Rorb. Fl. Ind.* I 585—Erimu-toli, *Rheede Hort. Mal.* VII t. 39.

Don-parvati, *Konk.*; Raiz da solteira, *Port.*

Succus expressus cum oleo nucis Indicæ et pulvere cumini coctus, ulcera *pilis* mitigat et sanat.

ARGYREIA MALABARICA, *Chois.*; *Fl. Br. Ind.* IV 183—Katu kelengu, *Rheede Hort. Mal.* XI t. 51.

Folia cum *Codiocanocu* et recenti butyro trita abscessus maturant et aperiunt. Radix cum aqua oryze levigata erisipelati resistit.

IPOMÆA QUAMOCLIT, *Linna.*; *Fl. Br. Ind.* IV 199; *Rorb. Fl. Ind.* I 508—Tsjuria-cranti, *Rheede Hort. Mal.* XI t. 60.

Tsjuria cranti, *Sain Joaõ* vel, *Konk.*

Succus e foliis expressus erihynum est cephalalgiam fugans.

I. UNIFLORA, *Roem. & Sch.*; *Fl. Br. Ind.* IV 201—Ben-tern tali, *Rheede Hort. Mal.* XI t. 51.

Ex succo plantæ insensus preparatur, adversus morbum endemium, *Pitao* dictum: idem cum fructu ac cortice *Cadel-aranocu* haustus, album laxat.

I. DIGITATA, *Linna.*; *Fl. Br. Ind.* IV 202; *Convolvula pa-*

niculatus, *Roxb. Fl. Ind.* I 478—Pul modecca, *Rheede Hort. Mal.* XI t. 49.

Cuvali, Kūmvāli, *Konk.*

Radix in sole siccata, trita in pulverem redacta, cum saccharo et butyro decocta et assumpta macilentos fertur reddere et obesos; sed et immodicum mēsiūm sistit fluxum, et in febribus osium confert.

I. BATATAS, *Lamb. ; Fl. Br. Ind.* IV 202; Convolvulus Batatas, *Roxb. Fl. Ind.* I. 483—Kappu-kelēngū ceu batatas *Rheede Hort. Mal.* VII t. 50.

Cananga, Kaggi, *Konk.*; Batatas, *Port.*

Excolitur hæc planta in hortis et agris, radix enim culinaria est ut Pastinacæ nostratæ, grata ac dulcis; in medicina nullius usus.

I. PES-TIGRIDIS, *Linu.*; *Fl. Br. Ind.* IV 204—Pulli-schovadi, *Rheede Hort. Mal.* XI t. 59.

Arty, Artī, *Konk.*

Folia cum pipere trita et parti affectæ imposita, omnem virulentiam, à morsu canis rabidi contractam, amovent; cum butyro trita apostemata resolvunt.

I. AUGUSTIFOLIA, *Jacq.*; *Fl. Br. Ind.* IV 205; Convolvulus medium, *Roxb. Fl. Ind.* I 474—Tala neli, *Rheede Hort. Mal.* XI t. 55.

Calī vāli, Bain mamorad, Kāli-vel, *Konk.*

Decoctum hujus plantæ, *Samstravari, Glycirrhiza*, et oleo *sergelim* permixta linimentum præstat, quo caput illinatur adversus ophthalmiam et comæ fluxilitatem.

I. TRIDENTATA, *Roth.*; *Fl. Br. Ind.* IV 205; Convolvulus tridentatus, *Roxb. Fl. Ind.* I 475—Scudera claudi, *Rheede Hort. Mal.* XI t. 65.

Kanti, *Konk.*

In decocto assumpta antifebrile est. Cum saccharo ardorem jecoris restringit. In pulverem redacta et cum aqua capiti illita, omnes sedat dolores. Trita et cum vocce urina epota omnes arthriticos dolores, præcipue in pedibus, mitigat.

I. SEPIARIA, *Koen.*; *Fl. Br. Ind.* IV 209; *Rozb. Fl. Ind.* I 500—Tiru tali, *Rheede Hort. Mal.* XI t. 58.

Tali, *Konk.*

Succus expressus pro lotione adhibetur, ad purificationem corporis.

I. BELA-DAMBOE, *Roem. & Sch.*; *Fl. Br. Ind.* IV 209; *Convolvulus flagelliformis*, *Rozb. Fl. Ind.* I 481—Bel-adamboe, *Rheede Hort. Mal.* XI t. 58.

Bangada-valli, *Konk.*

Succus cum oleo *Maro* et zinzibere decoctus, linimentum præstat, capiti inungendum, quo morsus rabidi canis irritus redditur.

I. AQUATICA, *Forsk.*; *Fl. Br. Ind.* IV 210; *Convolvulus reptans*, *Rozb. Fl. Ind.* I 482—Balel, *Rheede Hort. Mal.* XI t. 52.

Täk sivali, *Konk.*

Planta cum ebutyrato lacte oleoque simul cocta lumborum abscessus sanat dolorem mitigat.

I. CAMPANULATA, *Linu.*; *Fl. Br. Ind.* IV 211—Adamboe, *Rheede Hort. Mal.* XI t. 56.

Pongia vâj, *Konk.*

Contrita cum lacte assumpta, antidotum est adversus morsum serpentis *Cabra Capella* dicti; fructus triti et cum aqua assumpti, idem præstant.

I. BILOBA, *Forsk.*; *Fl. Br. Ind.* IV 212; *Convolvulus pe-capræ*, *Rozb. Fl. Ind.* I 487—Schovanna adamboe, *Rheede Hort. Mal.* XI t. 57.

Bangad-vâj, *Konk.*

In aqua decocta fomentum exhibet quo dolores aithritici mitigantur. Folia cum lacte caprarum in potionem preparata, pro hæmorrhoidibus propinantur.

EVOLVULUS ALSINOIDES, *Linna.*; *Fl. Br. Ind.* IV 220; *Roxb. Fl. Ind.* II 105—*Vishnu clandi*, *Rheede Hort. Mal.* XI t. 64.

Vishnu clandi, *Konk.*

Antifebrile est cum cinnamo decocta; etiam pro extenuatione corporis et morbis chronicis exhibetur. Cum lacte assumpta etiam calidas curat febres. Oleo incocta et capiti illita capillos promovet.

LV. SOLANACEÆ.

SOLANUM FEROX, *Linna.*; *Fl. Br. Ind.* IV 233; *Solanum hirsutum*, *Roxb. Fl. Ind.* I 571.—*Aua-Chunda*, *Rheede Hort. Mal.* II t. 35.

Sad-Vaingini, *Konk.*

Viribus cum *Schumela* convenit.

S. INDICUM, *Linna.*; *Fl. Br. Ind.* IV 234; *Roxb. Fl. Ind.* I 570—*Cheru-Chunda*, *Rheede Hort. Mal.* II t. 36.

Simsarati, *Konk.*

Radix confert in febre calida in decocto data; ejus decoctum cum melle intus sumptum prodest pro catarrhis seu insigni gravedine, servitque in stringuria, eodem modo usurpata addito momento cardamomo flatibus pellendis ac intestinorum terminibus sedandis conducit. Radicis aut foliorum succus decoctus et epotus concoctionem promovet; quin et ejus succus cum saccharo datus, uti et ejus decoctum cum melle servit pro phlegmaticis, juvatque in pectoris asperitate. Foliorum et fructuum decoctum addito pauxillo sacchari et calcis pro pruritu corporis servit in unctione partis affectæ.

S. MELONGENA, *Linna.*; *Fl. Br. Ind.* IV 235; *Roxb. Fl. Ind.* I 566—(1) *Chunda*, *Rheede Hort. Mal.* II t. 37.

Dolati, Vainigin, *Kook*.

Ad concoctionem et digestionem javeandam, servit etiam pro tussis et pleuritis gravedine decocta in melle et opota, ejus decoctum simpliciter pro febrilibus ex phlegmate et pneumonia abortis, ad quod etiam servit decoctum Radix, hæc trita in vino data ad vomitum succentiam, estque quædam de diuersa ancianum sumpta purgativum humorem pituitosum per infusiora et osans.

(1) Nila- hantata, *Rhede Hort. Mal. X t. 74.*

Viangin, *Kook*.

Urem opio super assumptam, vehemens venenum est, quo in eisd. et in ebrietate, folia, in aqua levigata, cum succo propinantur, et per hoc vires ab internis abscessibus liberat. Fractus acia punctus et cum singulis incoctus orientalge medetur.

PERULAS MISTRA, *Linna.; Pl. Br. Ind. IV 238; Roxb. Fl. Ind. I 663—(1) Perinodanodiu, Rhede Hort. Mal. X t. 71.*

Zona pati, Chirpati, *Kook*.

Folia à Bramanibus in ceremoniis adhibentur. Fractus edulii cum Radice in aqua decocta diabetein infringunt, oris ulcuscula curant, si adhibentur.

(2) Loma quodiam, *Rhede Hort. Mal. X t. 70.*

Zona pati, Chirpati, *Kook*.

Radix in opotione olei adhibetur. Succus testicularum misuit. Radix cum oleo istamocibus optinatur; cum oleo trita endemiam morbum, Pato dætam, sanat.

WIPULASIA SOMNIFERA, *Dunal.; Pl. Br. Ind. IV 239; Physalis flexuosa, Roxb. Pl. Ind. I 561—Pevetti, Rhede Hort. Mal. IV t. 55.*

Dondalaki, *Kook*; Saitkas, *Perf.*

Ex arboris foliis unguentum conficitur vulnerarium.

WIPULASIA FRUTESCENS, *Linna.; Pl. Br. Ind. IV 239; Roxb. Fl.*

Ind. I 574—Capo-Molago, *Rheede Hort. Mal.* II t. 56.

Purtukali nivali (erro), Mirsang, *Konk.*

Piper ejus masticatum et in ore detentum dolores dentium sedat, commode quoque tritum apostematibus resolvendis imponitur.

DATURA FASTUOSA. *Linn.*; *Fl. Br. Ind.* IV 242; *Rorb. Fl. Ind.* I 561—Hummeta, *Rheede Hort. Mal.* II t. 28.

Dotiró, Dútro, *Konk.*

Trita et mixta cum oleo sigelinis membris tum factis humoribus imponitur. Succus foliorum expressus et mixtus cum saccharo dicto Lusitanice *Jagua de cána* confert pro morbo sacro parte affecta cum eo uncta: semina ad tria numero sumpta conducunt in febre frigida; eadem trita et mixta cum aqua in qua macerata fuit oryza, membris tumefactis commode imponitur.

VAR. ? DURIA—Nila-Hummeta, *Rheede Hort. Mal.* II t. 29.

Culo-Dotiró, Kálo dútro, *Konk.*

Decocta proficua est pro membrorum doloribus vel pro eorum induratione in ablutione corporis, uti et pro febre frigida si cum ejus decocto in oleo corpus ungetur; ad quod etiam servit melix eadem modo usurpata. Folia trita cum calce servantur pro pruritu corporis facta perunctione. Foliorum et Fructuum decoctum cum oleo dolores corporis mitigat eodem modo adhibita. Fructus contusi et triti demptis seminibus perbellè sanant apostemata et carbunculos his appositi. Semina largius sumpta soporem inducunt, ac periculosa est eorum sumptio necesse adferens: hæc in virtute prima est excellentior.

LVI. SCROPHULARINÆ

LIMNOPHILA GRATISSIMA, *Blume*; *Fl. Br. Ind.* IV 263—Mangamri, *Rheede Hort. Mal.* X t. 6.

Ámbull, *Konk.*

In decocto data antifebrilis est, in hunc usque usum peragitur salus.

L. GRATIOLOIDES, *Br.*; *Fl. Br. Ind.* IV 271; *Columnea balsamea*, *Roxb. Fl. Ind.* III 97—(1) *Tsjudan-tajera*, *Rheede Hort. Mal.* XII t. 86.

Āmbull, *Konk.*

Flores cum zinzibere et cardamomo in sero lactis potianculam antidyentericam supeditant.

(2) *Tsjeria-manga-nari*, *Rheede Hort. Mal.* IX t. 85.

Āmbull, *Konk.*

Linimentum ex hac planta atque oleo nucis Indicæ confectum, elephantiacis opitulatur. Succus cum zinzibere et cumino exhibitus, vel etiam cum oleo *Sergelim* et *Calamo Aromatico* corpori illitus, summo pere in postilentiali conducit febre.

HERPESTIS MONNIERA, *H. B. & K.*; *Fl. Br. Ind.* IV 272; *Gratiola Monniera*, *Roxb. Fl. Ind.* I 141—*Brami*, *Rheede Hort. Mal.* X. t. 14.

Brami, *Konk.*

Ex frequenti hujus plantæ usu, vaccarum ubera lacte turgent; fit et decoctum ex illa in lacte vaccino et recenti butyro contra delirium temporibus inungendum; pipere, *Calamo aromatico*, *Myrabolanis* et aqua oryzæ trita et assumpta, vocem reddit sonoram.

ARTANEMA SESAMOIDES, *Benth.*; *Fl. Br. Ind.* IV 274—*Babeltsjulli*, *Rheede Hort. Mal.* IX t. 87.

Folia trita et in formam cataplasmatæ usurpata abaccessus mutant. Ex radice ablucendis capitâ sordibus, cephalicum præparatur lixivium.

TORENIA ASIATICA, *Lin.*; *Fl. Br. Ind.* IV 277—*Kaka-pu*, *Rheede Hort. Mal.* IX t. 53.

Caela-dolo, *Kaulyacho-dojo*, *Konk.*

Planta cum *Saadolo*, *Cariophyllis*, *Nuce Moschata*, et aqua rosorum contrita, linimentum præbet exanthematicum. Foliorum succus cum saccharo gonoricum sistit.

VANDELLIA ERECTA, *Booth.*; *Fl. Br. Ind.* IV 281; Gratiola integrifolia, *Roxb. Fl. Ind.* I 137—Tsjangapaspam, *Rheede Hort. Mal.* IX t. 52.

Vák-púsp, *Konk.*

Tota planta butyro incocta gonorrhœe adversatur, vel etiam cum *Calamo aromatico*, *Pipere longo* infantibus propinator adversus epilepsiam, viridi diarrhœa comitatum: radix, cum succo ex foliis expresso, et sandalo rubro, trita, oculorum vitio, Malabaribus *Edda Padelle* dicto medetur.

LVII. OROBANCHACEÆ.

ÆGINETIA INDICA, *Roxb.*; *Fl. Br. Ind.* IV 320; *Roxb. Fl. Ind.* III 30—Tsjem cumulo, *Rheede Hort. Mal.* XI t. 47.

Folia cum *Nuce Moschata Saccharoque* gingivis applicata, dentium putredinem arcent, eorumque vermes enecant. Ex foliorum simul et ligni succo ellychnia ponantur, que oleo foliorum *d'auferno* intincta accensaque, leves relinquunt cineres, qui palpebrarum aliorumque partium suffocant vermiculos; balbus radiceis idem prestat, cum sandalo pone aures et in fronte applicatus; pulverisatæ nempe et tostus.

LVIII. LENTIBULARIÆ.

UTRICULARIA RETICULATA, *Smith*; *Fl. Br. Ind.* IV 331—Nelipa, *Rheede Hort. Mal.* IX t. 70.

Ex planta hac ablitis consimilis energie nonnullis aliis potio præparatur, abdominis tumorem ex flatibus diminuens; in eundem finem ex illa sola balneum conficitur capiti inungendum.

LIX. BIGNONIAECÆ.

OROXylum INDICUM, *Vahl.*; *Fl. Br. Ind.* IV 378; Bignonia lu-

dica, *Roxb. Fl. Ind.* III 110—(1) Palega-Pajaneli, *Rheede Hort. Mal.* I t. 43.

Davanlica, Domvadak, *Konk.*

Cortex arboris servit pro consolidandis fracturis et scissuris tritis et cum vino appositus. Radix in decocto data in hydropo prodit. Eadem cum oleo decocta ad capitis corporisque malè affecti unctionem adhibetur. Folia tenella trita et unà cum *Croco Malabarico* ulceribus adnota ad sanationem conferunt.

(2) Palega-Pajaneli, *Rheede Hort. Mal.* t. 44.

Domvadak, *Konk.*

Foliis ejus piusis et tritis et unà cum *Cavea*, id est Mirabílano Citrino maceratis in pivalis utantur ad tingenda luteamenta colore nigro, quæ in suis exoniis gerant.

Radix trita et decocta in oleo pro capitis dolore servit facta perunctione, quomodo usurpata catarrhos et quoscumque humores pituitosos caput obsidentes educit. Cortex radicis in decocto datus tumoribus resolvendis commodus est. Decoctum ex cortice et foliis simul tritis in unctione corporis pro pustulis ac ulceribus servit.

DOLICHANDRONE, RHEEDI, *Seem.* ; *Fl. Br. Ind.* IV 379—Nuc-Pongelion, *Rheede Hort. Mal.* VI t. 29.

Singl, *Konk.* ; Carnos dos diabos, *Port.*

Fructibus delectantur psittaci : è ramis radiceque confecta retia, corticis decocto subrubro, ea conservare assuevere piscatores. Fractus vero nucleus cum exsiccato zinzibere, radice fructive Pavette contritus, mediante oryza lotura, spasmodicis affectibus Malabaraci *Paddi vonsa* vocant, laboranti parti, applicandum, egregium linimentum suppeditat.

STEREOSPERMUM CHELONOIDES, *D.C.* ; *Fl. Br. Ind.* IV 382 ; Bignomia chelonoides, *Roxb. Fl. Ind.* III 106—Pádri, *Rheede Hort. Mal.* VI t. 26.

Pádri, *Konk.* ; Favas da cobra, *Port.*

Si medicum spectes usum, viscerum rigorem intolerabilem dissipat

foliorum decoctum. Limonis hujusque commixti succi medentur maniae. Corticis vero succus, cum fructu *Perae* subactus, immolentium inhibet fluxum menstruum. Radicis cati² cum calamo aromatico² mixtura confecta, foliorumque Padri succo admixta exhibetur morsis a putrefaciente colubro, Malabarensibus *Polenga* dicto.

LX. PEDALINEÆ,

PEDALIUM MUREX, *Linna.*; *Fl. Br. Ind.* IV 386; *Roxb. Fl. Ind.* III 114—Caca-mulla, *Rheede Hort. Mal.* X t. 72.

Kák-táli, *Konk.*

Si in aqua hæc agitetur planta, crassam illam reddit, viscosam ac mucilaginosam, ut instar ovi albuminis appareat. In decocto data pro febris adhibetur calidis. Succus expressus cum saccharo dysuriam, dolores calculi ut et pectoris ac manuum ardorem, tollit: folis siccata et pulverisata gonorrhæam sistunt; cum saccharo et lacte recenter extracto ad 3ij usurpata in omni mala artuum dispositione conferunt: foliorum succus, ubi et aqua viscosa calorem in renibus præternaturalem temperat, urinae ardorem restringit, stranguriam amovet, calculum frangit.

SESAMUM INDICUM, *DC.*; *Fl. Br. Ind.* IV 387; *S. orientale*, *Roxb. Fl. Ind.* III 100—(1) Schit-elu, *Rheede Hort. Mal.* IX t. 54.

Davo til, *Konk.*

Oleum ex seminibus extractum, quod etiam oleum sirgelium vocant, pro quibuscumque pene exhibetur doloribus, eoque in lotione frequentissime utuntur Indigenæ, ad perungendam corpus, et quotiescumque dolore aliquo infestantur, additis in decocto nonnullis simplicibus: cum *Amphione* sumptam mortem inducit, ejus antidotum est succus radicis *Tinteli*; Lusitanice *Carol*, vel succus ex fructu *Barudena* dicto Lusitanice *Bringella*.

(2) Car-elu, *Rheede Hort. Mal.* IX t. 55.

Khara-til, *Konk.*

Flores comesti oculorum vitis melentur; cum fructibus iriti et

butyro in formam emplastri reducti, apostemata ad maturitatem perdurant. Oleum ex seminibus extractum (oleum *Sirgelim* nomine venit) humoribus phlegmaticis ex flatibus conducit, si nempe corpus cum illo perungatur; et si Malabariensibus habenda fides, pinguiores extenuat ac macilentos obesos reddit; oculorum caliginem palliat, visum debiliorem confortat, capiti nempe illito; ex eodem etiam unguenta conficiuntur pro vulceribus et ulceribus: cum *Amphione* sumptum mortem infert: *Senem* contritum et cum succo Cajennæ exhibitum, vertiginem tollit: eadem bene lota et excorticata variis modis condiuntur:

LXI. ACANTHACEÆ.

HYGROPHILA QUADRIVALVIS, *Nees.*; *Fl. Br. Ind.* IV 408—*Nirschulli*, *Rheede Hort. Mal.* II t. 46.

Bûl-vângâ, (vayângi) *Konk.*

Folia tumores corporis ac pudendorum virilium pellunt facta in pulverem, qui mixtus cum oleo *Fici inferni* sumitur.

H. SPINOSA, *T. Anders.*; *Fl. Br. Ind.* IV 408; *Ruellia longifolia*, *Roxb. Fl. Ind.* III 50—*Bahel-Schulli*, *Rheede Hort. Mal.* II t. 45.

Colasso, Kolâso, *Konk.*

Radix in decocto data urinam provocat, suppressam ciet. Ejus decoctum ventrem hydropse tumefactum extenuat ac membra quæ aqua tumefacta sunt resolvit. Eadem decocto cum oleo plantæ dictæ *Ficus inferni* ac epota prodest in hydropse calculosque in vesica infringit. Eadem trita et mixta cum aqua corpori humoribus affecto confert facta perunctione. Folia decocta et condita cum aceto intus sumpta urinam quoque ciet. Ex ejus Foliis fit pulvis qui cum oleo expresso ex floribus *Fici de inferno* epotas tumori pudendorum virilium solvendo conducit.

RUELLIA PROSTRATA, *Lamk.*; *Fl. Br. Ind.* IV 411; *R. ringens*, *s. Roxb. Fl. Ind.* III 44—*Upu-dali*, *Rheede Hort. Mal.* IX t. 64.

Foliorum succus (ut et folia) in coctione salis adhibetur. Folia cum sale cocta et in succum compressa, humorum cachexiam corrigunt.

ACANTHUS ILICIFOLIUS, *Linn.*; *Fl. Br. Ind.* IV. 481; *Roxb. Fl. Ind.* III. 32.—Paina-Schullii, *Rheede Hort. Mal.* II. t. 48.

Maodi, Moráñdi, *Konk.*

Pro icth virulento colubri si integra contrita ac mixta cum aqua ad lotionem partis icth adhibeatur.

BARLERIA PRIENITES, *Linn.*; *Fl. Br. Ind.* IV. 482; *Roxb. Fl. Ind.* III. 36.—Coletta-veccla, *Rheede Hort. Mal.* IX. t. 44.

Gomñá, *Konk.*

Folia indigena vicem foliorum *Bethel* in comestione, *Arequa* praestant. Succus apertis conductis, intestinorumque ex flatibus inmescentiae.

B. BUXIFOLIA, *Linn.*; *Fl. Br. Ind.* IV. 483; *Roxb. Br. Ind.* III. 37.—Cara-Schullii, *Rheede Hort. Mal.* II. t. 47.

Rana-Gomold, *Konk.*

Tumoribus resolvendis, si in pulverem per ignem redacta ac aceto permixta adhibeatur, in perunctionem corporis. In pulverem trita ac mixta cum potu expresso ex *Ténga* seu palmito Indico et dicto *Surie* apostematibus maturandis ac aperiendis servit. Radix in decocto data urinam suppressam movet. Ejus decoctam addito momento oryzae proficue datur pro tumore ventris. Foliorum quoque decoctum cum momento oryzae intus sumptam membris tumefactis extenuandis commodum.

ASTYASIA COBOMANDALIANA, *Nees.*; *Fl. Br. Ind.* IV. 493; *Ruellia Zeylanica*, *Roxb. Fl. Ind.* III. 42.—Valli-upu-dali, *Rheede Hort. Mal.* IX. t. 45.

Adhibetur haec planta in concoctione *Solis Nitri*.

ANDROGRAPHIS PANICULATA, *Nees.*; *Fl. Br. Ind.* IV. 501; *Justicia paniculata*, *Roxb. Fl. Ind.* I. 117.—Cara-carinam, *Rheede Hort. Mal.* IX. t. 56.

Boin-caro, Kirayateh, *Konk.*

Tota planta cum infusione oryzae macerata morui virulento serpentis, Copm Capella, dicti, medetur, epota nempe, quod et peruncta praestat.

A. ECHIOIDES, *Nees.*; *Fl. Br. Ind.* IV. 505; *Justicia echioides*, *Roxb. Fl. Ind.* I. 118.—Pus-tumba, *Rheede Hort. Mal.* IX. t. 46.

Butumbo, *Konk.*

Folia contrita alexipharmacum sunt, adversus rabidi canis toxicum, extrinsecus nempe adhibita. Succus specificum prodest in algidis febribus.

JUSTICIA BRETONICA, *Lin.*; *Fl. Br. Ind.* IV. 525; *Roxb. Fl. Ind.* I. 128.—Bem-curini, *Rheede Hort. Mal.* II. t. 21.

Davó-Poksó, *Konk.*

Radix in decocto data servit pro febribus ac capitis corporisque malis affectionibus. Folia fricta in oleo dein contrita ulceribus sanandis applicantur.

J. GENDARUSSA, *Lin. f.*; *Fl. Br. Ind.* IV. 532; *Roxb. Fl. Ind.* I. 128.—Vadu-kodi, *Rheede Hort. Mal.* IX. t. 42.

Káló-adulasso, *Konk.*

Foliorum succus semini sinapi admixtus emetica virtute asthmati adversatur. Ex iisdem balneum conficitur, vel si sacculus ex illis consatur, et admixto sale nigro incalescat, egregium in articulari morbo remedium suppeditat.

ADHATODA VASICA, *Nees.*; *Fl. Br. Ind.* IV. 540; *Justicia Adhatoda*, *Roxb. Fl. Ind.* I. 126.—Adel-odogam, *Rheede Hort. Mal.* IX. t. 43.

Adulaso, Áçãso, *Konk.*

Foliorum energia in asthmate lunari, tussi, sanguinis sputo atque atrophis elucescit, si cum aqua calida trita propinentur; si vero in manipulum coligata affecto loco calidè applicentur, vel pro suffragio adhibeantur, in arthritide. Ex foliis simul et radice parum testis succus extrahitur antiasthmaticus.

RHINACANTHUS COMMUNIS, *Nees*; *Fl. Br. Ind.* IV, 541; *Justicia nasuta*, *Roxb. Fl. Ind.* I. 120.—*Pul-colli*, *Rheede Hort. Mol.* IX. t. 63.

Dādumári, *Konk.*

Folia laevigata impetiginem, psoram scabiemque tollunt.

ECBOLIUM LINSEBANUM, *Kurz*; *Fl. Br. Ind.* IV, 544; *Justicia ecbolium*, *Roxb. Fl. Ind.* I. 114.—*Carim curini*, *Rheede Hort. Mol.* II. t. 20.

Poksó, *Konk.*

Radix decocta et sumpta servit pro doloribus arthriticis; decocta cum oleo et butyro vires adauget; eadem trita et cum oleo de sirgelim data mitigandis podagrae doloribus confert; decoctum ex radice et foliis epotum frangit calculos; eadem quoque virtute sunt Folia contusa et simpliciter colligata super ventre. Succus ex foliis extractus servit pro calculo. Folia in decocto data in dysuria prosunt; eadem epota in aqua calida in tussi et doloribus calculi conducunt, quam etiam virtutem habent si cum aqua calida ad perunctionem ventris adhibeantur.

LXII. VERBENACEÆ.

LIPPIA NODIFLORA, *Rich.*; *Fl. Br. Ind.* IV, 563.—*Ana-colupa*, *Rheede Hort. Mol.* X. t. 47.

Ádali, *Konk.*

Morbo medetur sacro, si succus cum momento piperis triti bibatur; qui solus ictum virulentam serpentis *Cobra-Copella* frustra facit.

CALLICARPA LANATA, *Lin.*; *Fl. Br. Ind.* IV, 567; *Roxb. Fl. Ind.* I. 391.—*Tondi teregam*, *Rheede Hort. Mol.* IV, t. 60.

Tondi karvat, *Ainoar, Konk.*; *Folhas da raspa* (micho) *Port.*

Ex arboris foliis in lactis acro cortis fit oris collatio pro aphthis. Et cortice, et radice in aqua decoctis Apozema conficitur, quod acrum febrem temperat, hepatis obstructions reserat, nec non hepati, vesicæ, similibusque affectibus medetur.

TECYONA GRANDIS, *Linna. f.: Fl. Br. Ind. IV. 570; Roxb. Fl. Br. Ind. I. 600.*—*Theka, Rheede Hort. Mal. IV. t. 27.*

Sáilo, *Konk.*; Tecca, *Port.*

Lignum vero hujus arboris, quercino ligno, haud absimile, operi fabрили accommodatum, atque Naupegis ad navium fabricam in usu est; sed in aquis (praesertim dulcibus) teredini facile obnoxium: gentiles, nescio qua superstitione ducti, hoc solum modo ligno sua vel construant vel reparant templa. Et reulit Princeps Calicolan, se integrum templum ex nucis hujusmodi arbore aedificari curasse.

E foliis tenerioribus purpureus conficitur color, quo panni sericei et gossypini tinguntur. Etiam tenera haec foliosa in deliciis indigenae comedunt: ex iisque coctis cum saccharo syrupus fit, qui aphthis medetur. Ex floribus cum melle coctis medicamentum paratur, quod assumptum aquas hydropicorum educit. Radix siccata, contusa, et in pulverem redacta, sicque exhibita, sanguinem ex casu alicubi concretum dissolvit. E fructibus tenerioribus contusis unguentum conficitur, theriaci sanando perquam utile.

PREMNA INTEGRIFOLIA, *Linna.: Fl. Br. Ind. IV. 574; P. spinosa, Roxb. Fl. Ind. III. 77.*—*Appel, Rheede Hort. Mal. I. 4. 53.*

Coro-Nirvoloe, Khári Nivoli, *Konk.*

Totius plantae virtus inservit pro capitis totiusque corporis doloribus, si cum ejus decocto caput et corpus abluatur, atque eadem modo servit pro doloribus arthriticis, succus ex plantae decocto extractus et saccharo conditus optime in medicamentis usurpatur, quae pro affectione nulla ex causis frigidis oborta dantur. Radix contrita et epota cum aqua hienteric commoda, cum salsa et marina cocta sedat dolores podagrae parti affectae applicata. Cortex contritus et minutus cum melle etiam valet ad hientericam sistendam cataplasmate facto. Folia dolores ventris pectorisque ex flatibus obortis mitigant ac solvant in decocto data. In febre frigida proficuum est decoctum ex foliis cum pipere trito et ebibitum, vel si cum decocto foliorum lotio instituat. Oleum ex radice, seu potius ejus corticibus extractum prodest etiam pro febre frigida, uti et doloribus ventris flatibusque discutit unctum in partibus affectis.

GIELINA AUREA, *Linna.: Fl. Br. Ind. IV. 581; Roxb. Fl. Ind.*

III 84.—Couschi, *Rheede Hort. Mal.* I. t. 41.

Shivanni, Sivan, *Koek.*

Radix in decocto data ventri tumefacto exterminando servit. Eadem juvat in podagra facta perunctione.

VITEX TRIPOLIA, *Lin. f.*; *Fl. Br. Ind.* IV. 583; *Roxb. Fl. Ind.* III. 69.—Cava-nosi, *Rheede Hort. Mal.* II. t. 11.

Negunda, Liángud, *Koek.*

Radix dolores podagrarum sedat trita et cum aqua calida facta perunctione; in decocto data flatas pellit. Folia trita et in aqua calida epota serviunt pro febre frigida; foliorum decoctorum vapor exceptus dolores ventris mitigat.

V. NEGUNDO, *Lin.*; *Fl. Br. Ind.* IV. 583; *Roxb. Fl. Ind.* III. 70.—Bem-nosi, *Rheede Hort. Mal.* II. t. 12.

Negunda, Liángud, *Koek.*

Radix in decocto data corporis tumorem tollit, enecatque vermes in ventre, exsiccaturque phlegmaticam temperamentum. Foliorum mansorum halitus nubeculam tollit oculo affecto in flatibus si summo mane adhibeatur; eadem folia cum radice plantae parva trita in aqua oryzae ulcera facta unctione sanant. Folia teneta cum pipere et in globulos formata iis ad duo vel trita initio febris paroxysmi sumptis eam tollunt; foliorum succus expressus capillos auget capitis facta perunctione.

V. ALATA, *Heyne*; *Fl. Br. Ind.* IV. 584—Mail-Elon, *Rheede Hort. Mal.* V. t. 1.

Davi-rinjá, *Koek.*; Carilha, *Port.*

Lignum arboris opere fabrilis accommodatum. Ex foliis et cortice contusis, ac in oryzae infuso coctis apozem conficitur, quod doloribus post partum potenter medetur, nec non sesquidiam in utero relictas expellit, et lochia expurgat. Idem insuper viris pariter et mulieribus praeter modum crassis et obesitas exhiberi solet pro ipso, ut sensum attenuentur ac gracilescent. Succus e viridi cortice, cum mature nucis Indicas lacte expressus et exhibitus diarrhoeam sanat, ac colicis do-

res tollit. Ex hujus arboris, uti et *Paal-valli* ramulis tenerioribus simul contosis, et in aqua coctis Balneum fit contra febres inveteratas arthriticam, et quoscumque artuum dolores.

V. LENCXYLON, *Linn. f.* ; *Fl. Br. Ind.* IV. 587 ; *Roxb. Fl. Ind.* III. 74.—*Kariil Rheede Hort. Mal.* IV. t. 36.

Zulico, *Kook.* ; *Satiráo* ; *Port.*

Ex radice, foliis, fructibus, aliisque hujus arboris partibus in aqua coctis balneum paratur, quibuscumque articularum doloribus tollendis utilissimum.

CLERODENDRON INERME, *Gaertn.* ; *Fl. Br. Ind.* IV. 589 ; *Roxb. Fl. Ind.* III. 58.—*Nür-Notsjül, Rheede Hort. Mal.* V. t. 49.

Negrúnd, Cirita mari, *Kook.* ; *Nochil, Port.*

Arboris folia siccata, in pulverem redacta, ac exhibita quotidie cum saccharo et oryzae infuso lusu Veneream sanare fertur. Ex eisdem foliis coctis et pistatis cum ovi vitello cataplasma paratur, quod bubonibus inguinum venereis impositum potenter eis prodesse statuunt. Ex foliis et radicibus in aqua coctis Balneum fit, quod phrenitidi, Maniæ, aliisque cephalicis affectibus perquam utile censetur. Ex radice in oleo cocta linimentum conficitur antiarthriticum.

C. SERRATUM, *Spreng.* ; *Fl. Br. Ind.* IV. 592 ; *Volkameria serrata, Roxb. Fl. Ind.* III. 62.—*Tsjerou-Theka, Rheede Hort. Mal.* IV. t. 29.

Douda-Sáilo, *Kook.* ; *Tecca cressa, Port.*

Ex arboris foliis oleo butyroque incoctis unguentum conficitur, quod Cephalalgia, Ophthalmia et aurium tinnitui medetur. Ex radice cum zinzibere et coriandri semine aqua incocta Apozema conficitur, quod exhibitum alimentorum in ventriculo fermentationem potenter juvat, et nauseam sanat. Fructus contusi et in lacte ebutyrato cocti, vel infusi alvum movent, et aquas hydropticorum ducunt.

C. INFORTUNATUM, *Gaert.* ; *Fl. Br. Ind.* IV. 594 ; *Volkameria infortunata, Roxb. Fl. Ind.* III. 59.—*Peraga, Rheede Hort. Mal.* II. t. 25.

Sáikiló, *Konk.*

Radix proficua est pro lienteria et intestinorum torméntibus et dolore colico in lacte acido vel etiam vino data. Eadem in pulverem redacta ad pustularum exicationem confert. Foliorum succus epotas lumbricos in ventre enecat.

AVICENNIA OFFICINALIS, *Linna.*; *Fl. Br. Ind.* IV. 604; *A. tomentosa*, *Roxb. Fl. Ind.* III. 88.—Oepata, *Rheede Hort. Mal.* IV. t. 45.

Kámdoln, Oepotí, *Konk.*; *Salgueira, Port.*

E cineribus hujus arboris ligni acris salsis lixivium conficitur, quo lotrices utuntur ad pannos gossypinos elucidos et extergendos: Etiam pictores lixivium hoc coloribus admiscere solent, ut picturis adherere firmius queant. Fractum Nuclei in Edulis *Caril* ab Indigenis expectantur, amaritudine per diuinam macerationem, et coctionem in aqua communi sublata. Insuper e fructibus hisce viridibus, cum foliis *Adamboc* coctis, et addito butyro contusis Cataplasma fit, quod tumoribus impositum potenter eos emollit et maturat: eundem in fluxu Cataplasma hoc variolis et morbillis imponi solet, ut citius vel maturentur, vel discutiantur

LXIII. LABIATÆ,

✦ OCIMUM BASILICUM, *Linna.*; *Fl. Br. Ind.* IV. 608; *Roxb. Fl. Ind.* III. 17.—*Saladi-tirtava*, *Rheede Hort. Mal.* X. t. 87.

Bhúnnya-túlsi, *Konk.*

Vires eadem ut ille *cattu-tirtava* (*O. gratissimum*).

O. GRATISSIMUM, *Linna.*; *Fl. Br. Ind.* IV. 608; *Roxb. Fl. Ind.* III. 17.—*Cattu-tirtava*, *Rheede Hort. Mal.* X. t. 86.

Rán-túlsi, *Konk.*

Balneum ex decocto præparatur pro doloribus ventris. Radix decocta feбри medetur pituitosæ: oleum e radice extractum periorale est, ciborum concoctionem promouet, corruptionem jecoris impedit, urinam ciet, confertque in stranguria, podagra, pleuritide, phlegmaticæ ac pituitosæ humores expurgat, flatu dissipat, circa tempora unctus et.

pitis sedat dolores.

O. SANCTUM, *Linna.*; *Fl. Br. Ind.* IV. 609; *Roxb. Fl. Ind.* III. 14.
—Nala-tirtava, *Rheede Hort. Mal.* X. t. 85.

Tálsi, *Konk.*

Flores in decocto dati, addita *Copa* feбри medentur calidæ; cum seminibus sèmul triti, addita aqua rosacea et momento Muscati, flatus dissipant.

GENOSPORUM PROSTRATUM, *Benth.*; *Fl. Br. Ind.* IV. 610.—Kattatumba, *Rheede Hort. Mal.* X. t. 92.

Bhūmya-tūsi, *Konk.*

Oleo frixa, et aurium orbi perfusa, intolerabiles capitis sedat dolores.

ANISOCHILUS CARNOSUS, *Wall.*; *Fl. Br. Ind.* IV. 627; *Plectranthus atrobiliferus*, *Roxb. Fl. Ind.* III. 28.—Kattu-kurka, *Rheede Hort. Mal.* X. t. 90.

Saikilo (?) Sujro hōrtelāmva, *Konk.*

Universale corporis linimentum ex hac planta, cum sacco corticis lānjæ levigata, conficitur ad inhibendum virus serpentis, Malabaribus *Palega* dicti si vero veneno infectum corpus ita infletur ac aestuet, ut extra vasa exsiliat, infessus ex decoctione hujus plantæ adhibetur.

PAGOSTEMON PANICULATUS, *Benth.*; *Fl. Br. Ind.* IV. 631.—Manam-podam, *Rheede Hort. Mal.* X. t. 65.

Odis ut et tota planta grati et aromati.

P. PATCHOULI, *Pelletier*; *Fl. Br. Ind.* IV. 633.—Cotam, *Rheede Hort. Mal.* X. t. 77.

Pāth, *Konk.*; Patchuli, *Port.*

Radix trita et aqua mixta lavamentum præstat adversus oris tumores et pustulas. Folia flores et fructus contrita et oleo permixti linimentum perhibent contra tumores.

ANISOMELES OVATA, Br.; *Fl. Br. Ind.* IV. 672; A disticha, Roxb. *Fl. Ind.* III. 2.—Tsjadaen, *Rheede Hort. Mal.* X. t. 88.

Tsjalo, *Lonk.*

Integra planta, excepta radice, pro balneo adversus frigidam adhibetur febris, inservit et sive in potu vel balneo, cum universali, tum cephalico, simul pro mania. In aqua decocta oris praestat collutionem, quae infantum tollit aptas.

A. MALABARICA, Br.; *Fl. Br. Ind.* IV. 673; Ajuga fruticosa, Roxb. *Fl. Ind.* III. 1.—Carim-tumba, *Rheede Hort. Mal.* X. t. 93.

Kal-tumbo, *Konk.*

Succus addito tantillo sacchari jagra dieti phlegmata ejicit. Decoctum antiarthriticum est, si corpus eo lavetur; flores eundem in finem condiuntur.

LEUCAS ASPERA, Spreng.; *Fl. Br. Ind.* IV. 690; Phlomis esculenta, Roxb. *Fl. Ind.* III. 10.—Tumba, *Rheede Hort. Mal.* X. t. 91.

Tumbo, *Konk.*

Oleo incocta scabiem sanat; succus vermes in ulceribus enecat; cum calce morsui medetur canis; naribus immixtus dolores sedat capitis; radix in decocto data lepram tollit; radices masticatae, vel etiam foliorum morsorum halitus, nubeculam tollit.

LXIV. NYCTAGINEÆ.

MIRABILIS JALAPA, Linn.—Audi Malleri, *Rheede Hort. Mal.* X. t. 75.

Endrana, Meremdt, *Konk.*; Maravilha de Perú, *Port.*

Floribus gentiles in ceremoniis utuntur.

BOERHAAVIA REPENS, Linn.; *Fl. Br. Ind.* IV. 700; B.

procumbens, *Roxb. Fl. Ind. I. 146.*—Talu-dama, *Rheede Hort. Mal. VII. t. 56.*

Punárnává, *Konk.*; Folhas do pitão, *Port.*

Decoctum hujus plantæ, febres ex endemicis morbo ortas quem indigenæ *Pitão* vocant, tollit. Radicis cortex cum camino et sero lactis pro potu adhibitas alvum laxat.

LXV. AMARANTACEÆ.

CYATHULA PROSTRATA, *Blume.*; *Fl. Br. Ind. IV. 723*; *Achyranthes prostrata, Roxb. Fl. Ind. I. 674.*—Scheru-cadelari, *Rheede Hort. Mal. X. t. 79.*

Dacolo-cante-mogaro, *Dákṭi káṣṭi mogri, Konk.*

Contrita et oleo permixta, urinam corrigit purulentam, reliquæ virtutes ut illæ *Cadelari.*

PUPALIA ATROPURPUREA, *Mog.*; *Fl. Br. Ind. IV. 723*; *Achyranthes lappacea, Roxb. Fl. Br. Ind. I. 673.*—Wellia-coddirieli, *Rheede Hort. Mal. X. t. 59.*

Citia-cuvadi, *Konk.*

Cum sero lactis trita radix anti-hæmorrhoidalis est; ejusdem pulvis intestinorum laucinationibus inhibet et medetur.

ACHYRANTHES ASPERA, *Linn.*; *Fl. Br. Ind. IV. 730*; *Roxb. Fl. Ind. I. 672.*—Cadelari, *Rheede Hort. Mal. X. t. 78.*

Kante-mogri, *Konk.*

Radix cathartica est; trita et cum *butyro* decocta dysenteriae medetur; decoctam ex illa præparatum stomachum confortat, flatus dissipat, plegmata corrigit, calculos vesicæ infringit; brachio alligata antifebrilis est, modo intermittentes aint et cum frigore invadentes: trita et cum mero assumpta calculosis prodest, urivam ciet, præcipue in hy-

dropicis ; cum limone trita impetigibes, tumores sub maxilla et sub mento obortos abigit : semina trita et naribus inmissa capitis sedant dolorem.

ALTERNANTHERA SESSILES, *Br.* ; *Fl. Br. Ind.* IV. 731 ; *Achyranthes triandra*, *Rorb. Fl. Ind.* I. 168.—*Coluppa*, *Rheede Hort. Mal.* X. t. 11.

Coipa, *Konk.*

Trita et capiti inflata illius dolores mitigat cum momento butyri aque *rosace* et *muschati* assumpta flatibus dissipandis inservit ; succus expressus et cum aqua calida epotus ventris dolores et flatus dissipat : radix trita, cum cunino et saccharo mixta, et pro ratione morbi vel cum lacte, vel aqua *Coqui Indice*, vel lacte acido sumpta, præcipue virium conservationi vel etiam reparationi confert.

GOMPHRENA GLOBOSA, *Linna.* ; *Fl. Br. Ind.* IV. 732 ; *Rorb. Fl. Ind.* II. 63.—*Wadapa*, *Rheede Hort. Mal.* X. t. 37.

Goindo, *Bûtaiva*, *Konk.*

Tussim et comitem præcordiorum fanciumque dolorem leniunt hujus folia, cum *Sandalo-Citrino* ex aqua epota.

(2) *Min-angani*, *Rheede Hort. Mal.* IX. t. 72.

Matsjadada, *Bûtaiva*, *Konk.*

In butyro cum aliis antinephriticis concoquitur, et sumente alienaria pro potu exhibetur.

LXVI. CHENOPODIACEÆ.

BASELLA RUBRA, *Linna.* ; *Fl. Br. Ind.* V. 20 ; *B. alba*, *Rorb. Fl. Ind.* II. 104.—*Basella*, *Rheede Hort. Mal.* VII. t. 24.

Wali, *vâicht-bhâji*, *Konk.* ; *Bredo-tala*, *Port.*

Lignum cum foliis tritum carbunculos aperit ; inter edulia habetur ; colitur in hortis.

LXVII. POLYGONACEÆ.

POLYGONUM ORIENTALE, *Lin.*; *Fl. Br. Ind.* V. 30; *P. smænum*, *Roxb. Fl. Ind.* II. 286.—Beluta-modela-muccu, *Rheede Hort. Mal.* XII. t. 76.

Davi-simsori-tonda, *Konk.*

Contrita et in lacte acido data, intestinorum tormina lenit.

P. GLABRUM, *Willd.*; *Fl. Br. Ind.* V. 34; *Roxb. Fl. Ind.* II. 287.—(1) Schovanna-modela-muccu, *Rheede Hort. Mal.* XII. t. 77.

Têm'ili-simsori-tonda, *Konk.*

Decocta cum oleo linimentum præstat antiarthriticum. Radix cum aqua calida assumpta ventrem expurgat: foliorum decoctum in lacte acido datum, tumores ventris detumescere facit.

(2) Beluta-modela-muccu, *Rheede Hort. Mal.* X. t. 80.

Simsori, *Konk.*

Totius plantæ, si radicem excipias, succus cum oleo *Sergelim* decoctus, linimentum præstat cephalicum, etiam in narium hæmorrhagia applicandum. Tenera folia cum oryzæ lotura in potiuçulam redacta, humorem, *Paddave* dictum minuit.

LXVIII. ARISTOLOCHIACEÆ.

BRAGANTINA WALLICHII, *Br.*; *Fl. Br. Ind.* V. 73.—Alpam, *Rheede Hort. Mal.* VI. t. 28.

Apámá, Pachioç, *Konk.*; Fructa tirilha, *Porç.*

Quodcumque hujus fructicis cum oleo in unguentum redegeris vel posam, vetustissimæque valet ulcera. Foliorum succus cum calamo aromatico contra serpentum exhibetur venenum. Speciatim vero reguli serpentis (Coltra Capella) venenæ resistit ex limonis contrita succo, in nodulum ligata naribusque pro errhino immessa. Ejusdem juniois colubri infringitur virus eadem radice cum vaccino lacte propinata: quem

in finem etiam cataplasmata é calamo aromatico atque hac radice confecta adhibentur.

ARISTOLOCHIA INDICA, *Linna.*; *Fl. Br. Ind.* V. 75; *Rarb. Fl. Ind.* III, 499—*Carcloe-regon*, *Rheede Hort. Mal.* VIII, t. 35,

Sapoessi, Sápûa, *Konk.*; Aterlusi, *Port.*

Decoctum hujus plantæ cum oleo pro linimento adhibitus venenatam serpentum sanat morsum. Radix trita cum aqua sumpta, vel in decocto data, idem præstat febres frigidas, dolores capitis, ventrem tumefactum ac dyssuriam sistit; pro lotione usurpata dolores podagricos sedat; pulvis cum pipere trito et aqua calida exhibitus fluxum sanguinis sistit.

LXIX. PIPERACEÆ,

PIPER LONGUM, *Linna.*; *Fl. Br. Ind.* V. 83; *Rarb. Fl. Ind.* I, 154.—*Cattu-tirgali*, *Rheede Hort. Mal.* VII, t. 14,

Bipali, Pipli, *Konk.*; *Pimenta longa*, *Port.*

Piper tritum affectibus oculorum et febribus intermittentibus inservit.

P. BEETLE, *Linna.*; *Fl. Br. Ind.* V. 83; *Rarb. Fl. Ind.* I, 158.—*Bectla-codi*, *Rheede Hort. Mal.* VII, t. 15.

Beetla, Kháinchitá-púnáin *Konk.*; *Betel*, *Port.*

Per totam Indiam supra oryzam et frumentum comeditar, ac maxima cum cura excolitur,

P. NIGRUM, *Linna.*; *Fl. Br. Ind.* V. 90; *Rarb. Fl. Ind.* I, 150.—*Molago-codi*, *Rheede Hort. Mal.* VII, t. 12.

Miri, Mirvel, *Konk.*; *Pimenta*, *Pimenta redonda*, *Port.*

Tota hæc planta in pulverem redacta ac cum butyro cocta, pustulis aurium confert. Radix trita et in aqua communi decocta, pro lavamento oris adhibetur, catarrhus enim et gingivæ affectus tollit. Fractus tritus cum aqua calida sumptus, febrî ardenti in morbo sacro

medetur ; dolores ventris ac flatus discontit, podagram tollit. Oleum ex pipere destillatum, tenue est, valde clarum et flavesceus, levem piperis odorem spirans, saporis parum acris.

LXX. MYRISTICÆ.

MYRISTICA MALABARICA, *Lamk.*; *Fl. Br. Ind. V.* 103.—Panem-Palka, *Rheede Hort. Mal. V. t. 5.*

Ambadeki, Palka Rân jâiphal, *Konk.*; Noz de Molucca falsa, *Port.*

Porro folia in edulis sunt : succus é foliis expressus, et cum oleo palmæ in unguenti consistentiâ coctus, scabiem sanat si eo pars affecta ungetur. Nuclei fructuum in pulvere rediguntur, isque diarrhæam sanat si cum fimo caprino, saccharo, et lacte ebutyrato mixtus exhibeatur ; si vero cum zinzibere et succo limonum sumatur, tenesmo medetur ; urinæ humanæ si admisceatur quibuscumque venenis antidotum est ; cum vino si propinetur, colicam passionem sanat ; cum aqua mixtus et exhibitus, vel foris applicatus hæmorrhoidum dolores placat ; tandem cum lacte muliebri epotus vomitum excitat, nec non icterum, aliosque morbos biliosos curat, at oculis adhibitus eorum affectibus cogducit.

LXXI. LAURINÆ.

CINNAMOMUM INERS, *Rein.* ; *Fl. Br. Ind. V.* 130 ; *Laurus nitida*, *Rozb. Fl. Ind.* III.300 —Katon-karna, *Rheede Hort. Mal. V. t. 53.*

Davo Bahena Tiqui, Tamala patra, *Konk.*; Canella do mato, *Port.*

Ex arboris foliis in aqua coctis balneum fit contra quoscumque articulorum dolores. Ex radice cortice cum cardamomo et nucis moschate in aqua cocta potus conficitur, qui ad ventris tormina sedanda valde laudatur.

C. MACROCAPUM, *Hook. f.*; *Fl. Br. Ind. V.* 133.—Carna, *Rheede Hort. Mal. I. t. 57.*

Tiqui, Tikht *Konk.*

Radiceis cortex in decocto datus vel in pulvere cum molle seu saccharo servit pro tussi et phlegmate expurgando. Idem contritus et permixtus cum aqua confert in podagra facta perunctione. Cortex Scipitum in decocto datus flatu quoque discutit. Idem in pulvere datus cum aqua calida dolores ventris sedat fluxumque ex frigore abortum sistit. Foliorum succus cum pipere et saccharo datus pro doloribus ventris et renum flatulenta materia servit; folia in pulvere data cum saccharo conferunt in vertigine capitis, uti et flores in pulvere cum saccharo et aqua frigida dati. Oleum quod ex cortice radiceis cum sale volatili, Camphora dicto, per distillationem simul extrahitur: insignium et multarum est virium; optimè confert in omnibus affectibus paralyticis exterius in tempore applicatum: in podagra summum ac presentaneum remedium; vehementes partium affectarum dolores illico sedans iis inunctum, ad quod etiam confert intus sumptum; in asthmate aliisque affectibus pulmonaribus sanandis intus sumptum etiam maxime confert, uti et malignitatem febrium corrigendam, atque sudorem pellens in gangraena et sphacelo aliisque ulceribus malignis optimè quoque prodest, juvatque etiam pro impetiginibus, doloribusque artuum, ventris, oculorum; nec non tumoribus membrorum ex frigidis et pituitosis humoribus abortis; praeterea in pedum contusione ut et vulneribus sensum partium stupefactum reparans; prodestque in rheumate seu fluxu capitis; ejus odor qui illico ex titillatione ac sternutationem, quam rheuma, ciet, sistit; in flatibus discutiendis quoque efficax est intus sumptum; appetitum quoque excitat ac calculosis prodest, suntque hae virtutes intra breve tempus, que illud oleum à nobis distillatum, ad usum medicum adhibitum, propriâ experientiâ compertae et sine dubio plures indies se prodent, estque hoc oleum in Nasocomio nostro medicamentum maximè catholicum. Camphora servit in affectibus uterinis da provocanda menstrua, sudores quoque ciet usurpaturque etiam loco Camphorae communis. Oleum cinnamomi puta Corticis arboris confert in affectibus ventriculi, in torminibus ventris à frigore ortis. Aqua cinnamomi cardiaca. Oleum ex foliis prodest in Colica exterius applicatum, summum remedium paralyticis, eorum aqua conducit in affectionibus cardiacis frigidis, daturque in potionibus sudoriferis. Aqua Florum Cinnamomi distillata cardiaca. Oleum ex fructibus decoctum usurpatur in doloribus artuum.

MACHILUS MACRANTHA, Nees; Fl. Br. Ind. V. 146.—Kat-

Kandelo, *Rheede Hort. Mal. V. t. 13.*

Kandelo, *Konk.* ; Avore de pao salgado, *Salgueira; Port.*

Cum arboris foliis agri stercoreantur. Etiam ex iisdem tenerioribus in oryza intuso coctis, oris collatio fit, aphthis curandis summe utilis.

CASSYTHA PILIFORMIS, *Linna.* ; *Fl. Br. Ind. V. 188* ; *Roxb. Fl. Ind. II. 314.*—Acatja-valli, *Rheede Hort. Mal. VI. t. 44.*

Medica-tali, *Konk.* ; Ramos da sebe, *Port.*

Integra planta cum zinzibere exsiccato, et *Nirvale-Pulli* tosta, pulverisata, et butyro mixta, inveterata ulcera mundificat. Cum oleo *Sergelim* capiti illita capillorum radices firmat ; cum cortice *Arckere* et *Tsjangelam-Parendi*, tosta pulverisata et opio mixta capitis ulceribus medetur ; cum *Cardamomo*, lacteo et oleo *Sergelim* ad liquidam consistentiam redacta, capitis aestum tollit. Succus cum saccharo oculorum ardorem et suffusionem amovet ; per se loco balnei adhibitus hemieranium mitigat.

LXXII. LORANTHACEÆ.

LORANTHUS LONGIFLORUS, *Desrouss.* ; *Fl. Br. Ind. V. 214* ; *L. bicolor, Roxb. Fl. Ind. I. 548, II. 185.*—Belatta-itti canni, *Rheede Hort. Mal. X. t. 4 (3).*

Planta hæc trita et aqua oryzae incocta, incantamenta frustra facit, si fides habenda incolta.

L. ELASTICUS, Desrouss. ; *Fl. Br. Ind. V. 216.*—Valli-itti canni, *Rheede Hort. Mal. X. t. 3 (4).*

Cortex fructuum cum lotura oryzae tritus oedematosos extenuat pedes.

L. LONICEROIDES, Linna. ; *Fl. Br. Ind. V. 221.*—Itti-canni, *Rheede Hort. Mal. VII. t. 39.*

Medecanni, *Konk.* ; Fula monrisca, *Port.*

Radiceis cortex dentes figit.

LXXIII. SANTALACEÆ.

SCLEROPYRUM WALLICHIANUM, *Arn.*; *Fl. Br. Ind.* V. 284.—Idou-Moulli, *Rheede Hort. Mal.* IV. t. 18.

Elasticanto, *Konk.*; Pereira dos diabos, *Port.*

At vero ex arboris, ejusque radicis cortice, nec non floribus, fructibus, nucleisve, variis modis remedia præparantur ad Maniam, phrenitidem, similesque affectus cephalicos. Adhuc è cortice in aqua communi decoctio fit, que icterum hydropem, aliosque chronicos morbos potenter sanat. Radicis cortex cum santalo rubro in pulverem redactus, ex eoque cum lacte muliebris cataplasma confectum, ac inguinibus impositum bubonibus venereis medetur.

LXXIV. EUPHORBIACEÆ.

EUPHORBIA HYPERICIFOLIA, *Lin.*; *Fl. Br. Ind.* V. 249; *E. parviflora*, *Rozb. Fl. Ind.* II. 472.—Nir-cottam-pala, *Rheede Hort. Mal.* X. t. 51.

Integra hæc planta cum aqua *Lavje* exhibitâ mixturem sanat cruentam: foliorum succus colicum sedat dolorem.

E. THYMIFOLIA, *Burm.*; *Fl. Br. Ind.* V. 252; *Rozb. Fl. Ind.* II. 473.—Caicotten-pala, *Rheede Hort. Mal.* X. t. 33

Dûdini, *Konk.*

In lacte acido data intestinorum tormina sedat, cum aqua decocta et pro lotionè adhibita, capitis dolores mitigat.

E. TIRUCALLI, *Lin.*; *Fl. Br. Ind.* V. 254; *Rozb. Fl. Ind.* II. 470.—Tiru-calli, *Rheede Hort. Mal.* II. t. 44.

Portugâl-Nivuli, *Konk.*

Radix in decocto data servit pro doloribus ventris; lac ejus cum butyro decoctam purgativum est, viribus quoque cum *Schadiki-calli* est isidem.

E. NIVULIA, *Ham.*; *Fl. Br. Ind.* V. 255; *E. nereifolia*, *Rozb.*

Br. Ind. II. 467.—Ela-Calli, *Rheede Hort. Mal. II. t. 43.*

Nivuli, *Konk.*

Radiciæ cortex tritus et epotus in aqua in qua oriza cocta et lota est, servit pro hydropse, estque medicamen valde lenes; ejus lac cum butyro in quo decoctum est datum blande et leniter purgat ventrem. Folia ad ignem calefacta urinam provocant; eorundem decocti fumus seu vapor exceptus doloribus corporis seu membrorum mitigandis ac pelleudis confert. Succus ex foliis calefactis seu parum tostis expressus et auribus in litus eorum dolores sedat, idemque oculis instillatus ocalorum nubecule tollendæ confert, quin et in lotione corporis prodest pro pudendis tumefactis.

E. ANTIQUORUM, *Linu.*; *Fl. Br. Ind. V. 255*; *Rozb. Fl. Ind. II. 468.*—Schadida-Calli, *Rheede Hort. Mal. II. t. 42.*

Pâda-Nivuli, *Konk.*

Ex radice addito paucillo assæ-fætidæ vulgo *Hinc* emplastrum præparatur quod ventri pærorum pro lumbricis commode super imponitur. Cortex radiciæ contritus et sumptus cum aqua purgativus est. Lignum ejus contritum et decoctum cum aqua juvat in doloribus Podagræ si ejus fumus seu vapor excipiatur in parte affecta.

BRIDELIA STIPULARIS, *Blume*; *Fl. Br. Ind. V. 270*; *B. scandens, Rozb. Fl. Ind. III. 736.*—Scherunam Cottiam, *Rheede Hort. Mal. II. t. 16.*

Phâtarphadi, *Konk.*

Foliorum decoctorum vapor ore exceptus dentium dolorem mitigat, et vermiculos in dentibus enecat.

PHYLLANTHUS RETICULATUS, *Poir.*; *Fl. Br. Ind. V. 288*; *P. multiflorus, Rozb. Fl. Ind. III. 664.*—Niruri vel Nirpulla, *Rheede Hort. Mal. X. t. 27.*

Pâna-poi, *Konk.*

Singulæ partes cum pipere longo ac cumino in aqua decoctæ catharrosæ adversantur tussi et febribus eam comitantibus. Folia vel radix

in aqua oryzae cataplasmatibus consistentiam redacta, tumores oedematosos immanuunt. Radix trita et cum lacte vaccino butyro recenti ac melle in epithema confecta et lateri affecto applicata *pleuritidi* medetur; ejusdem *cortex* vel etiam ipsa *radix* foliave in ebutyrato lacte cocta phlegma eliciunt. Ex eodem cortice in oleo decocto linimentum adaptur anti-oedematosum: admixto sale in aqua oryzae apozema exhibet anti-pleuriticam.

P. EMBLICA, *Linna.*; *Fl. Br. Ind. V.* 289; *Roxb. Fl. Ind.* III. 671.—Nili-camarum, *Rhede Hort. Mal.* I. t. 33.

Añváli, *Konk.*

Decocta in aqua servit pro morbis endemicis. Folia ejus tenera et in lacte acido epota conferunt fluxui dysenterico. Fructus exsiccati et in pulvere cum lacte acido spisso dicto *Tage* dati quoque in dysenteria prosunt. Iidem in decocto dati proficui sunt pro febre calida, uti et pro ardore pectoris, cum saccharo decocti et epoti vertiginem capitis sedant. Aqua quæ ex fructibus distillatur, epota ardori jecoris restinguendo convenit.

P. NIRURI, *Linna.*; *Fl. Br. Ind. V.* 298; *Roxb. Fl. Ind.* III. 259—Kirganeli, *Rhede Hort. Mal.* X. t. 18.

Buján-añváli, *Konk.*

Folia una cum radice trita, apostemata resolvunt; sola, ulceras mundant; in oleo Nucis Indicæ fixa vulnera sanant; radix paucis aliis ejusdem energis, additis et in pulverem redactis tussientibus et rheumaticis prodest; cum alio trita, testicularum exacerationes mundificat et consolidat; et contra dysenteriam oppositissimam remedia est.

P. DISTICHUS, *Muell.*; *Fl. Br. Ind. V.* 304; P. longifolius, *Roxb. Fl. Ind.* III. 672.—Nelli-Paali seu Biliabi, *Rhede Hort. Mal.* III. t. 47, 48.

Añváli, Rojãñváli, *Konk.*; Cheramela, *Port.*

Radix hujus arboris cum semine sinapi et cumini contusa, atque exhibita vomitum dicit, alvumque movet ut vero cum fructu tamarelongæ se usurpetur, nimium alvum fluxum compescit, et dyspepsiam

sanat. E foliis cum aqua communi decoctum conficitur, quod adorem⁸ movet, ac variolas expellit. Ex iisdem etiam cum croco Malabarico (quem *Morayo Cosa* indigenae vocant) in aqua decoctis balneum fit, quod quibuscumque membrorum doloribus potenter moleatur. Ipsi autem fructus summoopere refrigerant, atque ideo ad sitim ingentem in febris continua compescendam perquam utile sunt.

BREYNIA PATENS, *Benth.* ; *Fl. Br. Ind.* V. 329 ; *Phyllanthus patens*, *Rosb. Fl. Ind.* III. 667.—*Perin Nirouri*, *Rheede Hort. Mal.* V. t. 43.

Paja, *Poem*, *Konk.* ; *Fructa da trindade* *Port.*

Cæterum ex arboris foliis, fructibus et radicibus in aqua cum piperone longo et cumini semine coctis potus conficitur, qui in asthmate, tussi, pthisi, similibusque pulmonis affectibus valdè commendatur. Folia cum cortice oryzae infuso cocta, et in cataplasmaticis formam redacta, ac tumoribus imposita, potenter eos maturare fertur. Ex arboris cortice cum lacte, melle, et butyro cocto balsamus paratur, quem intus sumptam pleuritidem sanare dicunt.

B. RHAMNOIDES, *Muell.* ; *Fl. Br. Ind.* V. 330 ; *Phyllanthus Vitis-idaea*, *Rosb. Fl. Ind.* III. 665.—*Tejeria Nirouri*, *Rheede Hort. Mal.* V. t. 44.

Pana-poja, *Pân-poch*, *Konk.* ; *Folhas de dentes*, *Port.*

Ex arboris foliis in aqua communi coctis oris collutio conficitur, ad erosas gingivas sanandas, dentesque vacillantes roborandos. Ex foliis cum fructibus, cortice et radice coctis [Balneum fit antearthriticum. Ex radice cortice cum pipere longo, et zinzibere cocto potus paratur, qui ad ventriculorum roborandum, pituitosos humores incidendos et attenuandos summe utilis perhibetur.

PUTRANJIVA ROXBURGHII, *Wall.* ; *Fl. Br. Ind.* V. 336 ; *Nugelia putranjiva*, *Rosb. Fl. Ind.* III. 766.—*Pongolam*, *Rheede Hort. Mal.* VII. t. 59,

Samana, *Konk.* ; *Raiz da mostarda*, *Port.*

Uusus hujus plante in medicina magnus est, calefacit enim, exsie-

cat, discutit omnia vitia ex frigore orta, ut et humores pituitosos ac febres.

ANTIDESMA BUNIUS, Spreng. ; *Fl. Br. Ind.* V. 358 ; *Stilago Bunus*, Roxb. *Fl. Ind.* III. 758.—Noeli-tali, *Rheede Hort. Mal.* IV. t. 50.

Bestram, Konk. ; Cordocira, Port.

Porro ex arboris hujus cortice, haud secus ac è cannabe, funes texuntur. Fractus in deliciis comeduntur, lique impensè refrigerant, uti Berberes. Folia antidotum habentur morsui Colubæ HERSTIMANDEL Malabarensibus dicti ; cujus morsu homines quidem non statim intereunt, sed interim totius corporis carnes corrumuntur, computrescunt, decidunt, tandemque post tot miseris debitum naturæ persolvunt ; nisi utantur potu, qui ex foliis hisce cum salito mangæ fractu in aqua coctis conficitur.

CROTON TIGLIUM, Linn. ; *Fl. Br. Ind.* V. 393 ; *Roxb. Fl. Ind.* III. 682.—Cadel-Avanaca, *Rheede Hort. Mal.* II. t. 33.

Japala, Jempál, Konk. ; Croton tiglio, Port.

Folia trita et cum aqua epota purgativa sunt ; pro morsu serpentis dicti *Cobra Capella* juvant si in pulverem trita vulnere indantur ; eadem cum foliis *Pandi avanacu* et floribus *schem-pariti* in melle permixta pro capitis pustulis serviant facta unctio ; unum fractus seorsum sumptum usum purgandi obtinet, si tritum in aqua propinetur.

CLAOXYLON MERCURIALIS, *Thecaitos.* ; *Fl. Br. Ind.* V. 412 ; *Tragia mercurialis*, *Roxb. Fl. Ind.* III. 576.—Pec-cupamoni, *Rheede Hort. Mal.* X. t. 82.

Sapor ut *Acalypha Indica*.

ACALYPHA PANICULATA *Miquel* ; *Fl. Br. Ind.* V. 415.—Welia-cupamoni, *Rheede Hort. Mal.* X. t. 83.

Masaru, Konk.

Cum prioribus ex omni parte convenit. Integræ hujus plantæ partes in nodulum obligatas, infusæ parti calide applicatæ, venenum, cucurbitularum instar, extrahunt ; eandem ob causam foliorum pulvis

in aqua oryzae levigatus temporibus fricando applicatur. Succus oleo sergelim permixtus, erysipelati medetur, hæmorrhoidibus, ventris cruciatibus, Malabaribus *guinæo* dictis.

A. INDICA, *Linna* ; *Fl. Br. Ind.* V. 416, *Roxb. Fl. Ed.* III. 675.—Cupameni, *Rheede Hort. Mal.* X. t. 81.

Maserasesade, *Konk.*

Succus cum oleo decoctus; linimentum est anti-arthriticum, dolores à luc venerea exortos tollit, ut et impetigines; cum calce permixtus idem in morbis præstat cutaneis. Radix trita et cum aqua calide assumpta cathartica est. Folia trita et cum aqua epota ventrem laxant, illorum decoctum auribus imissum earundem mitigat dolorem.

TREWIA NUDIFLORA, *Linna* ; *Fl. Br. Ind.* V. 423; *Roxb. Fl. Ind.* III. 837.—Cumbulu, *Rheede Hort. Mal.* I. t. 42.

Bon-varò, *Konk.*

Radix in decocto data addito paucillo oryzae prodest in febre symptomatologica, comitante podagram seu dolorem arthriticum. Eadem dita in lacte acido vel in oleo *Schirchelin* proficua est pro flatibus et dolore thoracis. Radicis cortex contritus et in aqua decoctus juvat in febre frigida, idem contritus et per tostionem in pulverem redactus servit in podagra facta peruncione partis affectæ. In lacte acido datus intestinorum sedat tormina, ad quod etiam confert succus foliorum epocus.

MALLOTUS REPANDUS, *Muell.* ; *Fl. Br. Ind.* V. 442; *Rottlera tricocea*, *Roxb. Fl. Ind.* III. 829.—Watta-tali, *Rheede Hort. Mal.* V. t. 33 (?)

Comâñi, *Konk.* ; Folhas da minta, *Port.*

Arboris folia cum viridi tabaco et oryzae infuso trita, ac ulceribus inveteratis et verminosos imposita, potenter iis medetur. Ex iisdem foliis in aqua coctis balneum paratur adversus febriles febres. E floribus et fructibus contusis, et in nodulam colligatis, lactique maliebrici incoctis conficitur errhinum, quod algidis febribus moderi fertur.

M. PHILIPPINENSIS, *Muell.* ; *Fl. Br. Ind.* V. 442; *Rottlera tinctoria*, *Roxb. Fl. Ind.* II. 827.—(1) Ponnagam, *Rheede Hort. Mal.*

V. t. 21.

Beyisa, *Konk.* ; Arola, *Port.*

Ex arboris foliis et fructibus cum melle contusis cataplasma paratur, quod ictibus ac morsibus serpentum, aliorumque venenatorum animalium impositam, eos potenter sanat. Similiter radix trita, et castipiasmatjs forinā locis contusis imposita, sanguinem coagulatum dissolvit, et contusionses curat.

(2) Pee-Ponagam, *Rheede Hort. Mal.* V. t. 24.

Sonbenisa, *Konk.* ; Arola pennachoso, *Port.*

Ex radice et foliorum succo cum melle cocto linimentum paratur, potentissimum adversus venenatorum animalium ictus, morsive praesidium. Idem praestat balneum, quod ex foliis hisce cum allio decoctis conficitur.

RICINUS COMMUNIS, *Linn.* ; *Fl. Br. Ind.* V. 457 ; *Rozb. Fl. Ind.* III. 689.—(1) Avanacoe seu Citavanacu, *Rheede Hort. Mal.* II. t. 457.

Eranda, *Konk.* ; Carrapateiro, *Port.*

Radix dolores ex flatibus in visceribus obortis levat in decocto data, atque hoc pacto si per dies aliquot sumatur pedum tumorem tollit, uti et rennum dolorem ac ventris ; nec minus ejus decoctum juvat pro tympanitide et asthmaticis et igne sacro uti et in podagra. Folia trita et capiti apposita ejus dolorem sedant ; eadem super igne tosta in podagra servinut parti affectae applicata, quin et foliorum decoctorum vapor exceptus in parte affecta proficius ; urinae cursum promovet si cum ejus decocto balneum instituantur. Fructus purgativi sunt si in pulverem frixi cum Saccharo dentur semina rennum dolorem mitigant, si trita e regione partis affectae apponantur. Oleum ex seminibus expressum purgativum est ; quod etiam cum lacte dulci epotum purgat, ac doloribus ventris sistendis confert ; juvat etiam in doloribus corporis olei perunctio.

(2) Pandi-Avanacu, *Rheede Hort. Mal.* II. 60.

Vhadolo-Eranda, *Konk.*

Cohibet vomitum si cortex ejus ex collo suspendatur.

TRAGIA INVOLUCRATA, *Linn.* ; *Fl. Br. Ind. V.* 465.—Schorigenam, *Rheede Hort. Mal. II. t.* 39.

Pita-Gásureuli, Pitha-Khathkhúthli, *Konk.*

Radix prodest in febre ex pituita oborta in modum annuli imposita pedum digitis, succus ex ea expressus ac in lacte vaccæ cum saccharo epotus conducit in febre ossium ac servit pro prurita corporis. Radix in decocto data trinitam suppressam movet. Lignum cum fructibus contritum vulnere inflictio ex cauda spinosa piscis *Ráye* ad ejus sanationem inditur.

SAPIUM INDICUM, *Willd.* ; *Fl. Br. Ind. V.* 471 ; *Rozb. Fl. Ind. III.* 692.—Bengiein, *Rheede Hort. Mal. IV. t.* 51.

Girimaso, *Konk.* ; Nilica d'inferno, *Port.*

Contrita et pulverisata hujus arboris folia ulceribus insperguntur ad fungosam, luxuriantemque carnem tollendam. Eodem folia concisa, et cum bubali fascibus in nodulo consuta, ac calefacta convulsis et spasma affectis partibus utiliter applicantur.

EXCÆCARIA AGALLOCHA, *Linn.* ; *Fl. Br. Ind. V.* 472.—(1) Cammetti, *Rheede Hort. Mal. V. t.* 45.

Ouro, uro, *Konk.* ; Guarda-olhos, *Port.*

Ex arboris foliis in aqua coctis balneum conficitur antiarthriticum. Eodem decocto si ulcera antiqua et verminosa laventur, vermes necantur, ac ulcera potenter mundantur. Ex lacteo arboris succo et pulvere carcapule pilulæ fiunt, quæ in hydrope miris laudibus extolluntur.

(2) Amuetti, *Rheede Hort. Mal. V. t.* 54.

Ana daliqui, vro, *Konk.* ; Querilhas macho, *Port.*

Ex arboris radice in aqua cocta apozema conficitur, quod assumptum, salivum laxat, nec non hepatis, lienisque obstructions potenter aperit. Follis Tengam arborem fricant Iudi, ubi rami sunt abscissi, ut hoc modo potum *Zuri* dictum elicere queant; de quo potus genere in parte primâ latius actum est.

SEBASTIANA CHAMÆLEA, *Musl.*; *Fl. Br. Ind.* V. 475; *Tragia chamælea*, *Roxb. Fl. Ind.* III. 577—Codi Avanaca, *Rhede Hort. Mol.* X. t. 34

Boin-Erañda, Bhumbya erañda, *Kook.*

Totius plantæ succus cum vino epotus fluxui sistente proficuum; idem cum oleo coctus proficue bibitur ad vires debiles reparandas; oleum quod ex tota planta paratur capitis ablationi commodum ad ejus vertiginem tollendam et cerebro confortandum.

LXXV. URTICACEÆ.

CANNABIS SATIVA, *Lin.*; *Fl. Br. Ind.* V. 487; *Roxb. Fl. Ind.* III. 772—(1) Kalengi-causjava, *Rhede Hort. Mol.* X. t. 60.

Bāngi, *Kook.*; Canbamo, *Port.*

Folia insolata et in pulverem redacta diarrhoeam sistunt, stomachi debilitatem emendant, morbumque endemium *Pitoo* dictam sanant. bilem temperant: qui etiā pulvis, *Nectiani* loco fumatus, inebriat; cum illo vero commixtus et in suffragium adhibitus herniis medetur. Comesta folia geniale semen, in concubitu, inhibent, auripigmenti viri enervant. Flores ejusdem sunt virtutis, qui aliis corroborantibus permixti, trochiscorum forma, ad genitalium partium corroboracionem exhibentur.

(2) Tsjeru-causjava, *Rhede Hort. Mol.* X. 61.

Tsjada-bāngi, *Kook.*

Utriusque folia largius comesta mentem movent ac vi inebrianti pollent, in mascula vero vehementiori. Fructus et semina à *Milou* rianis expetuntur.

STREBULUS ASPER, *Low.*; *Fl. Br. Ind.* V. 489; *Trophis aspera*, *Roxb. Fl. Ind.* III. 761.—Tindli-pura, *Rhede Hort. Mol.* I. t. 45

Pavañi, Khāroto, *Kook.*

Ejus decoctum in lotionis corporis servit pro febre calida. Rola

confert pro morbo sacro et cum aqua oryzæ in lotionè adhibita. Eadem trita apostematis apponitur : folia decocta proficua sunt pro doloribus quibuscumque parte affecta cum iis linita ; eodem quoque modo juvant in puerperis

FICUS GIBBOSA, *Blume.*; *Fl. Br. Ind.* V. 496 ; *F. excelsa*, *Rorb. Fl. Ind.* III. 552.—Attî-Meer-Alon, *Rheede Hort. Mal.* III. t. 58. ?

Rouka-Pârai, *Konk.* ; Arvore da raiz ladrão, *Port.*

Ex arboris hujus radice decoctum fit, hepar obstructum potenter aperiens ; eodemque si os colluatur præstantissimum evadit adversus quoscumque oris affectus remedium : foliorum succus febribus medetur ardentibus. Fructus quoscumque alvi fluxus sistit.

F. BENGALENSIS, *Linn.* ; *Fl. Br. Ind.* V. 499 ; *F. Indica*, *Rorb. Fl. Ind.* III. 539.—Per alu, *Rheede Hort. Mal.* I. t. 28 (27).

Vadhô, vhad, *Konk.* ; Arvore da gralha, *Port.*

Liquor radicum seu filamentorum quæ ex ramis deorsum pendent, cum aqua simpliciter potus, vel in decocto datus mitigat dolorem febrilem purificatque hepar et sanguinem. Cortex arboris tritus proficuus est pro morbo sacro parti affectæ appositus. Ablutio corporis cum corticis decocto in febre confert.

F. MYSORENSIS, *Heyne.* ; *Fl. Br. Ind.* V. 500.—Katou-Alon, *Rheede Hort. Mal.* III. t. 57.

Donio-vadhu, Gôl, *Konk.* ; Raizeira vidroada, *Port.*

Ex arboris cortice in aqua decocto conficitur oris collutio, quæ aphthas maturat et absterget, nec non dentes vacillantes firmat : idem decoctum potum renes expurgat, et urinam ducit. Insuper ex eadem cortice cum cancri pedibus in oleo cocto Balsamum paratur, quod auribus instillatum earum exulcerationes sanat, nec non tinnitum et surditatem tollit. Denique ex radice et arboris cortice simul coctis Balneum fit, quod curandæ lepræ, nec non quibuscumque artuum doloribus mitigandis mirificè conducit.

F. RETUSA, *Linn.* ; *Fl. Br. Ind.* V. 511 ; *F. Benjamin* t, *Rorb.*

Fl. Ind. III. 550.—(1) Ittialu, *Rheede Hort. Mal.* I. t. 26.

Arôca-Gáli, Naindrúka, *Kook.*; Figueira de Gôa, *Port.*

Cortex arboris tritus ac in lacte per pannum exprimendo datus vertigini capitis sedandæ confert. Ulceribus curandis prodest foliorum decoctum cum oleo, si cum eo corpus perungatur; habet quoque hæc easdem vires cum prima, dictis modis, quibus illa usurpata.

(2) Itta-Arealon, *Rheede Hort. Mal.* III. t. 55.

Donadeke-goli, Naindrúka, *Kook.*; Arvore da raiz menor, *Port.*

Ex arboris hujus cortice, radice et foliis in oleo decoctis Balsamum paratur vulnerarium. Ex cortice in lacte ebutyrato cocto fit oris collutio, quæ aphthas absterget, flaccidas et esosas gingivas sanat, nec non vacillantes dentes firmat.

F. RELIGIOSA, *Linna.*; *Fl. Br. Ind.* V. 513; *Rarb. Fl. Ind.* II. 447.—Arealu, *Rheede Hort. Mal.* I. t. 27 (28).

Pipalòe, Piápala, *Kook.*; Figueira dos pagoles, Pimpollo, *Port.*

Radicis cortex in decocto datus coleræ acrimonium obtundit et sanguinem purificat. estque in febribus fixis et radicalis præsidis. Cortex arboris ad ulcerum sanationem conducit tritus et appositus, ac cum aqua eodem modo adhibitus prodest pro morbo sacro. Succus foliorum expressus, ac cum oleo decoctus, conducit in febre podagrica corpore cum eo peruncto.

F. TJAKELA, *Burm.*; *Fl. Br. Ind.* V. 514.—Tsjakela, *Rheede Hort. Mal.* III. t. 64.

Porro ex arboris cortice peculiari artificio Chorda torquentur, quibus arcus tenduntur. Nec non color paratur rubicundus, quo vestimenta *panos de Cambaya* ipsis diota, tinguntur. Cæterum arbor hæc eodem habet in Medicina usus ac *Alu Alu* (F. glomerata).

F. TSIELA, *Rarb.*; *Fl. Br. Ind.* V. 515; *Rarb. Fl. Ind.* III. 549.—Tajela, *Rheede Hort. Mal.* III. t. 63.

Asonaton, Kela, Pipri, *Kook.*; Moseguciro, *Port.*

Ex arboris hujus radicis cortice cum pipere longo in aqua communi decoctam paratur, quod tussi inveteratæ, aliisque pulmonis affectibus medetur. Lactens e radice et fructibus expressus succus efficax in oculorum vitiiis remedium est.

F. HETEROPHYLLA, *Linna.*; *Fl. Br. Ind.* V. 518; *Roxb. Fl. Ind.* III. 583.—Valli-Teregam, *Rheede Hort. Mal.* II. t. 62.

Caravatti-valli, Kharvainta-vel, *Kook.*; Arvore de raspa perigosa, *Port.*

Succus e radice expressus et assumptus alvi cruciatus lenit: similiter e foliis cum lacte dulci contusus expressus succus dysenteriam curat. Radicis cortex cum coriandri semine in pulverem redactus et exhibitus, tussi, asthmathi, similibusque thoracis affectibus medetur.

F. ASPERRIMA, *Roxb.*; *Fl. Br. Ind.* V. 522; *Roxb. Fl. Ind.* III. 554.—Teregam, *Rheede Hort. Mal.* V. t. 60.

Caravatti, Karvainta, *Kook.*; Arvore de raspa. *Port.*

Folia hujus arboris usurpantur ad scrimia, ac quæcumque lignea cornea, stannæ, et argentea vasa fricanda, atque scabritie suâ polienda ac læviganda, quam ob causam Malabarensibus *Terega*, Lusitanis *folhas de raspa*, Belgis *Rijc-blasteren* nuncupantur. Radix cum aceto e nucæ Indica confecto contusa, et mane jejuno ventriculo assumpta visceram ardorem compescit. Fructus itidem impensè refrigerant.

F. CUNIA, *Haw.*; *Fl. Br. Ind.* V. 523; *Roxb. Fl. Ind.* III. 561.—Perin Teregam, *Rheede Hort. Mal.* V. t. 61.

Meri Caravatti, *Kook.*; Arvore da raspa maior, *Port.*

Fructus contusi usurpantur ad aphthas: insuper ex iisdem in lacte caprino coctis potus conficitur, qui hepatis obstructioni ejusdem que scyrrho potenter medetur: etiam ex fructibus hisce cum arboris cortice in aqua coctis Balneum fit, quod endemicis corporis maculis leprosis tollendis conducit.

F. GLOMERATA, *Roxb.*; *Fl. Br. Ind.* V. 535; *Roxb. Fl. Ind.* III. 558.—Atti-ala, *Rheede Hort. Mal.* I. t. 25.

Roendudoc, Rundud, *Kook.*

Radix decoctum aquatum servit ad purificandum sanguinem et caput, repulsiōne coloris acrimoniae; ejusdem decoctio succus ex-
 stillatus quae in vase supposito excipitur, etiam hepatis male affecto con-
 venit, conferente illis quae venas habent solutas et fissas. Cortex ac-
 cidialis hepatis restringendis in decocto datur, atque hoc modo usur-
 patus etiam us. servit qui in ore alioque partibus sulcos habent. Ideo
 tribus us. et aliis profectus apponitur, uti et parti laboranti morbo
 sicut Lactantius dicit, *Cibellia*. Pulverem succus cum oleo decoctus
 in oleo calida conducit, si vicibus iteratis corpus ex caput cum eo
 lavetur. Fructus alvum adstringit, etque comestus profectus pro
 partu hominibus mala temperie corrigenda.

MYRTACARPUS HIRSIUTA, *Loenk. Fl. Ro. Ind. V. 541; Boiss. Fl. Ind. III. 521.*—Angeles, *Phaed. Hist. Nat. III. 4. 32.*

Data pomaron, Pat. pomos *Kosk. ; Anzeli, Part.*

Cortexum casicata, calefactoque hujus arteris totum insuper lig-
 nentum arteris us. et fabuli sereno hinc, ex caput ingentis sistit, naves
 glabrescunt.

A. INTERIFFOIA, *Loenk. Fl. Ro. Ind. V. 541; Boiss. Fl. Ind. III. 522.*—Tsjaka-mamun, *Phaed. Hist. Nat. III. 4. 26, 28.*

Pat. pomaron, Pomos, *Kosk. Depicta, Part.*

Fructus decoctum paratū diarrhoeam sistens. E hujusmodi
 pulvere Radix excrementis admixta cataplasma conficitur, quod oculis
 morosis appositum quomodo tunc adhaeret. Lactens fructum succus
 cum pulvere calidum utramque tritus, oculisque datus Nyctalopia con-
 ducit. Tritum cum aceto liquore oculis relaxatum, et tantum ton-
 sillumque inflammationi praesens. Radix cum fructu pulpe trita, et
 admixto succo in cataplasmi formam confecti, ne hoc dolenti appositum,
 multum ac vasculari hepatis cum vitium non excedit.

LXXVI. CYCADACEAE.

CYCAS CIRIVALLIS, *Loenk. Fl. Ro. Ind. V. 541; Boiss. Fl. Ind. III. 522.*

rica, *Rozb. Fl. Ind.* III. 747.—Toddā-Panna, *Rheede Hort. Mal.* III. t. 9.

Andaxa Motha-panna, *Konk.*; Armatoria das eggjās, Palma d'igreja, *Port.*

Fructibus vescuntur Malabarenses cum saccharo Thomæo, alioquin alvum relinquunt adstrictam. Succus e novellis foliorum sarculis expressus, atque exhibitus intestinorum cruciatus compefcit, stomachi ardorem sedat, et vomitui cruento medetur. Fructigernus conus contusus, et in cataplasmaticis formam redactus, lumbisque applicatus dolorem nephriticum tollit, et involuntarium seminis in gonorrhæa effluxum mitigat. At vero è fructibus tenerioribus in aqua decoctis medicamentum paratur, quod vomitum ciendo ventriculum egregie expurgat. Ipeus arboris gummi assumptum quibuscumque venenis resistit, aque cum gallinæ stercore mixtum et foris applicatum viperarum morsus spirifice sanat. Ex arboris trunco Japonenses farinam ex eaque panem faciunt, Sagou ipsis dictum.

LXXVII. HYDROCHARIDÆ.

OTTELIA ALISMOIDES, *Pers.*; *Fl. Br. Ind.* V. 662; Damasonium Indicum, *Rozb. Fl. Ind.* II. 216.—Ottel ambel, *Rheede Hort. Mal.* XI. t. 46.

Adeca aloen, *Konk.*

Hæc ut et illa reliquarum specierum in edulis adhibentur.

LXXVIII. ORCHIDÆ.

MICROSTYLIS RHEEDII, *Wight.*; *Fl. Br. Ind.* V. 690.—Basaala-poulou-maravara, *Rheede Hort. Mal.* XII. t. 27.

Keli, *Konk.*

Decoctum plantæ bilem purgat, antifebrilis est; terniuos sive motus epileticos infantum, morbillos curat, diaphoretica est.

LIPARIS PARADOXA, *Reichb.*; *Fl. Br. Ind.* V. 697.—Katon-pouanam-maravara, *Rhesde Hort. Mal.* XII. t. 28.

Succus ~~ex~~ radice trita, adustionem, Carcinomata, Gangrenam curat. Succus foliorum omnem ardorem febrium sistit malignarum; magna efficacia humorem superfluum ex tumefactis manubus, brachiis, pedibus, illic loci pedes *S. Thomæ* dicti, qui sæpius ita intumescunt, ab crassitiem hominis superent, expellit.

DENDROBIUM CHLOROPS, *Lindl.*; *Fl. Br. Ind.* V. 719—Anatali maravara, *Rhesde Hort. Mal.* XII. t. 7.

Tota hæc planta recens usquepata, succus imprimis exhibitus, omnis generis ventris dolores et colicam sistit, bilem movet, alvum laxat.

PHOLIDOTA IMBRICATA, *Lindl.*; *Fl. Br. Ind.* V. 845; Cymbidium imbricatam, *Rozb. Fl. Ind.* II. 460.—Wellia-theka-maravara, *Rhesde Hort. Mal.* XII. t. 24.

Tolasi, *Kouk.*

Radices capillares tritæ, et capiti raso impositæ furorem in febribus ardentibus, imò extra illas, curat, modo in tempore adhibeantur, imò morbum ipsum impediunt. Nodi fructus, purgant inveteratæ et maligna ulcera, aurium dolorem sistunt, non tantum sed et totius capitis; somnum excitant, evaporationes biliosas expellunt. Plantis pedum applicati, febres intermittentes et illarum symptomata tollunt. Tota planta in formam cataplasmatiis redacta, et circa lumbos applicata, partum promovet, menses et urinam, semper aliquid virinum illarum retineus arborum quibus insidet.

EULOPHIA VIRENS, *Brown.*; *Fl. Br. Ind.* VI. 1; Limodorum virens, *Rozb. Fl. Ind.* III. 467.—Kathon-theka-maravara, *Rhesde Hort. Mal.* XII. t. (?) 25.

Radices siccatae in folliculis repositæ serpentes abigunt; in pulvere, perem redactæ et assumptæ, veneno resistunt ex morsu canis rabidii contacto, vulnera et omnem illorum malignitatem sanant. Bulli per medium dissecti et asati, omnia apostemata resoluunt. Bulli ven-

num sunt, furibundi enim evadunt, si de illis comedant

E. NUDA, *Lindl.* ; *Fl. Br. Ind.* VI. 5.—Katon-kayda-maravara, *Rheede Hort. Mal.* XII. t. (?) 26.

Bhumya-keli, *Konk.*

Succus radicis si supra arborem kansjira inveniatur amarus est. alvum laxat, bilem promovet. Succus bulbi et foliorum omnem adustionem ex pulvere pyrio, oleo ferventi, vel igne causatam cum sanguine canino mixtus, tollit. Pulvis venenum, sive externum sive internum expellit. Si supra arborem Fava, vermes intestinorum enecat, febris resistit, ventriculum corroborat, flatus dissipat. Succus cum carne totius plantæ in formam cataplasmatibus reductus apostemata emollit, et, sine dolore, ad maturitatem perducit.

CYMBIDIUM ALOIFOLIUM, *Swartz* ; *Fl. Br. Ind.* VI. 10 ; *Roxb. Fl. Ind.* III. 458.—Kansjiram-maravara, *Rheede Hort. Mal.* XII. t. 8.

Souñ, *Konk.*

In pulvrem reducta cum zinzibere, et a qua assumpta vomitum excitat et diarrhæam, morbos inveteratos, oculorum caligenem, vertiginem, paralyzin curat.

GEODORUM PURPUREUM, *Br.* ; *Fl. Br. Ind.* VI. 16 ; Limodorum nutans, *Roxb. Fl. Ind.* III. 470.—Bela pola, *Rheede Hort. Mal.* XI. t. 35.

Bulbus cum aqua oryzae in linimenta non preparatur a leucis phlegmonodes, tumores et abscessus.

LUISIA TENUIFOLIA, *Blume.* ; *Fl. Br. Ind.* VI. 24.—Tsjeiron-man-maravara, *Rheede Hort. Mal.* XII. t. 5.

Ambokeli, *Konk.*

Tota planta in formam cataplasmatibus preparata abscessus sine dolore ad maturitatem perducit, in tempore alibita affluxum humorum impedit. Pulvis cum aceto omnem renem pituitam expellit, ardorem in urinando et gonorrhœa restringit, ut et impluvia alba mulierum menses supra modum fluentes sistit.

BHYNCHOSTYLIS REFUSA, *Blume; Fl. Br. Ind. VI. 32*; *Abrides guttatum, Roxb. Fl. Ind. III. 471.*—*Angeli Maravara, Rheede Hort. Mal. XII. t.*

Ponosa—keji, *Konk.*

Tota planta cum sero lactis et butyro concocta, vellicationes nervorum, spasnum, motus epilepticos infantum curat; in pulverem redacta et aquæ cannæ ex qua saccharum conficitur immixta, caput confortat, cerebrumque, vertiginem, febribus præcedentem, tollit: in cinerem combusta, et sale ex cinere extracto, palpitationem cordis sedat: majora folia cum illorum succo umbilico imposita, urinam, arenas imo calculum et menses promovent. Radix trita cum melle recenti et bene cocta antiasthmaticum est imo antiphthysicum est medicamentum: succus viscosus ex caulibus et foliis expressus temporibus et manuum arteriis impositus, febris sistit ardorem.

VANDA SPATHULATA, *Spreng.; Fl. Br. Ind. VI. 50*—*Pouampou Maravara, Rheede Hort. Mal. XII. t. 3.*

Souana pouspa, *Konk.*

Tota planta trita, cocta et cum *Cootaji—Leotsji—Pulle* et oleo *Nucis Iudicæ* usurpata lepram sanat; pulvis cum flore *Oryzæ, Nucis Moschata, Naega-Pan* et melle permixtus diarrhæam sistit; succus cum *Nuce Moschata* dysenteriam. Pulvis cum melle exhibitus furiosos sanat, bilicem temperat. Flores in pulverem redacti, contra phthysin, astham, maniam adhibentur.

SACCOLABIUM PRÆMOR-UM, *Hook. t.; Fl. Br. Ind. VI. 62*; *Gymbidium præmorsum, Roxb. Fl. Ind. III. 465.*—*Thali maravara, Rheede Hort. Mal. XII. t. 4.*

Thali, *Konk.*

Radix trita et in pulverem redacta, adhibetur in febribus ardentibus, morbillis, variolis: sudorem enim promovet. Succus foliorum recens melle permixtus, alvum laxat.

LXXIX. SCITAMINEÆ.

CURCUMA ZEDOARIA, *Roxb. ; Fl. Br. Ind. VI. 279 ; C. Zerumbet, Roxb. Fl. Ind. I. 10.*—Kna, *Rheede Hort. Mal. ΔΛΔ 7.*

Ákua *Konk.*, Zedoaria, *Port.*

Radicis raspatae, aliquoties lotae, pollinem reliquunt, ab indigenis multum aestimatum, qui pulvem ex illo conficiunt. Radix contusa et succus recens epotas, omnem intestinorum ardorem sistit, renes purgat, fluxum album inhibet, gonorrhæam sanat, sanguinem purgat. Foliorum succus hydropicis propinatur, intumescentiam abdominalis aufert, modice laxat, riscidam intestinorum pituitam expurgat.

C. LONGA, *Lin. ; Fl. Br. Ind. VI. 214 ; Roxb. Fl. Ind. I. 32.*—Manjellakua, *Rheede Hort. Mal. XI. t. 11.*

Alady, Aladj, *Konk.* ; Curcuma, *Port.*

Succus cum radice contusus vel levigatus orificium reficit, halitum gratum facit, exhilarat, melancholiam pellit, sanguinem purgat, venerem excitat, ventriculum et cerebrum confortat, obstructions renum, vesicæ tollit, menstrua provocat, leniter alvum laxat, hydropisim curat. Brevi, omnium consensu planta præexcellens est et excellentissimis præditis virtutibus.

KÆMPFERIA GALANGA, *Lin. ; Fl. Br. Ind. VI. 219 ; Roxb. Fl. Ind. I. 15.*—Katsjula-kelenga, *Rheede Hort. Mal. XI. t. 41.*

Capura catari, *Konk.*

Radix siccata in transversas inciditur lamellas, et dividitur. Bulbus cum recenti butyro in pillulas redactus, asthmaticis datur.

K. PANDURATA, *Roxb. ; Fl. Br. Ind. VI. 220 ; Roxb. Fl. Ind. I. 18.*—Manja-kua, *Rheede Hort. Mal. XI. t. 10.*

Davikua, *Konk.* ; Raiz do Zafrão, *Port.*

Succus radices dysenteriam et immodicum mensium sistit fluxum, vires corroborat, spiritus reficit, sanguinem purgat, mixtus cum aliis medicamentis, inveteratos ex frigore sanat morbos.

K. ROTUNDA, *Linn.*; *Fl. Br. Ind.* VI. 222; *Roxb. Fl. Ind.* I. 16.—*Malan-kua*, *Rheede Hort. Mal.* XI. t. 9.

Bluŕiŕya chaŕiŕpho, *Konk.*

Tota planta in formam unguenti redacta, mirum in modum vulnera recenter inflictis sanat; intus sanata sanguinem in corpore coagulatum et omnem purulentam materiam consumit; est et unguentum oculare. Succus radicis omnem pituitosum et quasi hydropicam materiam de manibus, pedibus, atque ipsis etiam articularis, quamvis quasi emortui, et extra omnem naturalem motum videntur abigit.

ZINZIBER OFFICINALE, *Roxb.*; *Fl. Br. Ind.* VI. 246; *Roxb. Fl. Ind.* I. 47.—*Inschi vel Inschi-kua*, *Rheede Hort. Mal.* XI. t. 12.

Alein, *Konk.* *Geugibre*, *Port.*

Precipuus usus in radice est, quae praeterquam quod in cluŕiŕis adhibetur, etiam intus sumpta asthmaŕi, tussi, pituitae viscidae, nausae ventriculo male disposito conducit, exterius applicata artuum dolores, chiram et podagram tollit. Cum aqua contusa et oculis infusa, vertiginem sanat, illum nempe, quae post partum malariis non bene per menstrua purgatis, accidit, quae nisi in tempore curetur, epilepsias, paralytes, manias, imo ipsam mortem, in illis regionibus saepissimè producit.

Z. ZERUMBET, *Smith.*; *Fl. Br. Ind.* VI. 247.; *Roxb. Fl. Ind.* I. 48.—*Katou Inschi kua*, *Rheede Hort. Mal.* XI. t. 13.

Kolinjana, *Konk.*

Indigenae, lucri causa, hanc cum praecedente commiscunt.

COSTUS SPECIOSUS, *Smith.*; *Fl. Br. Ind.* VI. 249; *Roxb. Fl. Ind.* I. 58.—*Togena-kua*, *Rheede Hort. Mal.* XI. t. 8.

Poinvo, *Konk.*

Radix cum zinzibere mixta in aurium tinnitum auferit, auditum iuvat, omnem fluxum cerebri tollit et vertiginem.

ELETTARIA CARDAMOMUM, *Molun.*; *Fl. Br. Ind.* VI. 251; *Alpinia cardamomum*, *Roxb. Fl. Ind.* I. 70.—*Elettari*, *Rheede Hort.*

Mal. XI. t. 4, 5, 6.

Elú, *Koak*; Cardanomo, *Port.*

De viribus nihil addendum duxi, sub enim superque sunt cognita.

ALPINIA ALLUGHAS, *Rosci.*; *Fl. Br. Ind.* VI. 253; *Roxb. Fl. Ind.* I. 61.—Mala-Inuschi-kua, *Rheede Hort. Mal.* XI. t. 14.

Giri kolinjan, *Koak.*

Succus è radice recenti expressus intus et extus Podagricis datur; cocta radix capitis dolorem aufert, in vino macerata omnes artuum cruciatus è frigore ortos tollit, in pulverem reducta cum succo *Raphani* permixta, et epota, calculos diminuit, aremulus è renibus deterget, mulierum colicam sistit, menstrua provocat; succus cum vino coctus lochias promovet, sanguinem purgat; et efficacissime secundinas expurgat.

CANNA INDICA, *Linn.*; *Fl. Br. Ind.* VI. 260; *Roxb. Fl. Ind.* I. 1.—Katu bala, *Rheede Hort. Mal.* IX. t. 43.

Râna keji, *Koak.*

E fructibus parum tostis succus elicitur, qui auribus immissus dolores illarum mitigat. Ex iisdem et saccharo massa componitur, et umbilicali regioni applicatur contra diabetem, ex calidis febribus ortam. Succus radicis *Mercurii* sublimati toxicam infringit.

MUSA SAPIENTUM, *Linn.*; *Fl. Br. Ind.* VI. 262; *Roxb. Fl. Ind.* I. 663.—Bâla, *Rheede Hort. Mal.* I. tt. 12, 13, 14.

Keji, *Koak*; Bananeira, *Port.*

Radix contrita et epota in lacte vertiginem capitis sedat; ejus aque cum saccharo permixta proficue ebibitur pro ardore renam, quin et eadem aqua simpliciter epota pro doloribus ex urina obortis confert, daturque proficue iis, quorum corpus argento vivo distillato infectum est, ut et iis qui inter edendum capillos hauscrunt: corculum arboris patâ caulem albicantem, qui fructum fert, tritam et cum melle intus sumptam matris ocularum convenit ad quod etiam servit batyram in quo fractus seu fici

in fructa secti tostī sunt epotam.

Bala ex diversitate fructuum plures ac diversae sunt species, ut *Nendera-Bala* quae fructum fert oblongiorem caeteris, qui in cortice est, colore rubro, et intus carne robescente, suntque ejus species *Nendera-Nendera*, quae fructibus est grandioribus, et *Curbo-Codli* quae fructibus est minus oblongis, *Cadali-Bala* fructus fert gravis et jucundi odoris, qui cortice sunt tenui; ejus species *Shiru-Cadali*, quae minores fructus fert, et *Erada-Cadali*, quae sapore praefertur: *Pudra-Bala* fructus fert exacte rotundos, et oblongiores, ac crassiores quam *Cadali-Bala*, qui saporis sunt optimi, estque ejus species *Turenale-Bala* utpote grandior. *Mannem-Bala* fert fructus angulatos, quatuor superficiem, qui carne non nihil oleosa ac pingui, sunt saporis magis dulcis, cortice crasso, habetque haec folia crassiora caeteris et magis lata ac oblongiora; *Cingya-Bala*, fert fructus oblongos ut *Nendera-Bala* sed minus crassos, et qui maturi viridi-clari sunt; *Canim-Bala* fructus fert multos minores caeteris, qui maturi, coloris sunt subaevi; ejus species est *Schindila-Canim-Bala*, quae fructus fert valde parvos ac minores caeteris ac nullos alios flores nisi qui in fructibus insident, atque adeo rami totam usque ad verticem fructibus onerata: *Caléa-Bala* fert fructus cortice crassio, in quibus semina nigra continentur. *Bangila-Bala* flores fert, qui sunt calore caeruleofusco.

Bala species communiter intra sex menses flores ferunt; *Pudra-Bala* autem intra duodecim menses, fructus post quatuor menses maturescunt; una arbor, nam ex radice edit ac fructu dato et ad maturitatem perducto emoritur, stolonibus qui ex ejus radice circum quoque expullant in arbores excrecentibus.

LXXX. BROMELIACEÆ.

BROMELIA ANANAS, Willd.; Roxb. Fl. Ind. II. 116.—Kakatojaka, Rheede Hort. Mal. XI. t. 1, 2.

Ananá, Konk. Ananaz, Port.

Folia in aqua *Oryza* cocta, et pulveri *Balasi* mixta, in potum assumpta, hydropicorum ventres purgant. Fructus immaturi cum *Acto* propinati, foetum ex utero pellunt. Item comesti ablocinis ex flatibus intumescenciam corrigant.

LXXXI HÆMODORACEÆ

SANSEVIERA ROXBURGHIANA, *Schult. fil.; Fl. Br. Ind.* VI. 271, *Katu kapel seu Cadeunco, Rheede Hort. Mal. XL₂ t. 2.*

Murgali. *Konk.*

Folia trita et in formam boli redacta, adversus ophtalmiam et oculorum suffusionem assumuntur: cum radice addito *Allio* ac *Auripigmento* in oleo *Sergelim* decocta, gonorrhœam sanant, si nempe caput cum oleo illo illinatur; Bulbus cum sandalo *citriño* et *butyro* *babulino* tritus linimentum exhibet, in nervorum contractionibus et ardoribus adhiben; dum. Tota denique planta oleo *butyroque* incocta omnium oculorum vitia emendat.

LXXXII. IRIDEÆ.

BALAMCAUDA CHINENSIS, *Lemna; Fl. Br. Ind.* VI. 277 - *Moræa chinensis, Roxb. Fl. Ind.* I. 170.—*Belam cauda scholar mani, Rheede Hort. Mal. X. t. 38.*

Ârli, *Konk.*

Planta integra cocta et pro lotionem corporis adhibita antidotum est contra omne venenum. Radix trita et applicata morsui serpentis *Cobra Capella*, dicti, medetur. Folia cum *Schirgelim* ab indigenis adhibetur, ad vaccas et jumenta, edulis venenosis infecta, vel animalibus venenatis læsa, tum intus, tum foras, sumpta et applicata curanda.

LXXXIII. AMARYLLIDEÆ.

CURCULIGO ORCHIOIDES, *Gavin.; Fl. Br. Ind.* VI. 279; *Roxb. Fl. Ind.* II. 144.—*Mella-pana-kelangu, Rheede Hort. Mal. XII. t. 59.*

Masulkolen, Masalakândo, *Konk.*

Decocta cum oleo *Nucis Indicæ* et *asapino* *cervicæ* epota, capitis dolores sedat, vertiginosos affectus et oculorum caliginem abigit, visum acuit. Cum aqua decocta et epota antifebrile præstat medicamentum

presertim in colera; in pulverem redacta et ventri imposita stranguriae medetur. Radix trita et assumpta idem efficit; in lacte dulci assumpta ardorem renum et ossium restringit.

CRINUM ENSIFOLIUM, *Roxb.*; *Fl. Br. Ind.* VI. 281; *Roxb. Fl. Ind.* II. 129.—Pelnta pola tali, *Rheede Hort. Mal.* XI. t. 38.

Ex planta concisa et tosta bini fiunt noduli, qui utriusque maxillae appositi, spasmodum curant Cynicium.

C. LATIFOLIUM, *Lin.*; *Fl. Br. Ind.* VI. 283; *Roxb. Fl. Ind.* II. 137.—Sjovanna pola tali, *Rheede Hort. Mal.* XI. t. 39.

Gola kairi, *Konk.*

Radix bulbosa trita et tosta hæmorrhoidibus apponitur, conducitque apostematibus aperiendis et maturandis; eadem tosta et cani data, dentes illius excidere facit: folia tosta carbunculis applicata dolorem ex illis abortum mitigant, angues excarnificatos sanant.

LXXXIV. DIOSCOREACEÆ.

DIOSCOREA DÆMONA, *Roxb.*; *Fl. Br. Ind.* VI. 289; *Roxb. Fl. Ind.* III. 805.—Padava-kelengu, *Rheede Hort. Mal.* VII. t. 51, 52.

Karodi, *Konk.*; Raiz da bolsa, *Port.*

Folia cum Coriandro in aqua decocto presentaneum pro algida febre sunt remedium.

D. PENTAPHYLLA, *Linn.*; *Fl. Br. Ind.* VI. 289; *Roxb. Fl. Ind.* III. 806.—(1) Katunuren-kelengu, Nuren-kelengu, *Rheede Hort. Mal.* VII. tt. 34, 35, et 33.

Dhovi-kairandi, Koneti, Tija Kairandi, *Konk.*; Grubosa redonda, Grubosa ovada, *Port.*

Inter edulia recensetur; in medicina nullius usus.

(2) Tjageri-nuren, *Rheede Hort. Mal.* VII. t. 33.

Kairandi, *Konk.*; Grubosa, *Port.*

Radix cocta pro balneo usurpata vel potu assumpta hæmorrhoides sanat.

D. SPINOSA, *Roxb.* ; *Fl. Br. Ind.* VI. 291 ; D. aculeata. *Roxb. Fl. Ind.*, III. 800.—Mu-kelengu, *Rheede Hort. Mal.* *Ÿ!²?* t. 51.

Neyá, *Konk.* ; Inhame do cão, *Port.*

Folia in decocto orizæ trita abcessibus, medentur.

D. ALATA, *Linn.* ; *Fl. Br. Ind.* VI. 290 ; *Roxb. Fl. Ind.* III. 797. Katiji kelengu, *Rheede Hort. Mal.* VII. t. 38.

Foliorum succus scorpionum morsui medetur. Radicis pulvis cum *Catu-Panna-Kelengu*, ulceribus malignis summo cum successu inspergitur ; fofus loco adhibiti, idem præstant.

LXXXV. LILIACEÆ.

SMILAX ZEYLANICA, *Linn.* ; *Fl. Br. Ind.* VI. 309.—Cari-villandi, *Rheede Hort. Mal.* VII. t. 31.

Karâpi, *Konk.* ; Raiz da baba, *Port.*

Radix cephalica cum gingibere et curcumâ, panis oleo Sergalini lucto iuspersa, per modum suffimigii capitis dolores mitigat ; cum glycyrrhizâ, cortice Caniram et succo Tamarindorum, loco balni adhibita, idem præstat, ut in oleo cocta et capiti inuncta vel auribus immissa. Concretus radicis bulbus cum Curcumâ tritus et in oleo Sergalini coctus, catarrhorum fluxum impedit ; cum gingibere vel pipere, oleo foliorum de Emferno, vel melle intinctus eundem habet effectum. Loco vero Salsaparillo Peruviano à Lusitanis usurpatur.

ASPARAGUS RACEMOSUS, *Willd.* ; *Fl. Br. Ind.* VI. 316 ; *Roxb. Fl. Ind.* II. 151.—Schadaveli-kelangu, *Rheede Hort. Mal.* X. t. 10.

Sasara-mulj, *Konk.*

Radices hepatis calorem inguiter temperant, sanguinis effervescentiam sistunt, acrimoniam bilis obtundunt, melancholiam repellunt, eorum exhilarant ; ab indigenis cum Saccharo coniunguntur, ut et in aceto ad promovendam appetitum : succus radicis expressus et epotus ardorem pectoris ac febriam calidam mitigat ; prodest et in capitis vertigine si

cum Saccharo exhibentur : cum oleo decoctus et ad perunctionem capitis adhibitus inseruit pro quibuscumque morbis cutaneis ex causa calida abortis ; decoctum radicis cum oleo dolores podagricos emollit, si pars affecta cutis perungatur : folia in oleo tosta, et in formam emplastrum redacta, commodè vesiculis imponantur, quæ in partibus adustis expululant.

GLORIOSA SUPERBA, *Lin.* ; *Fl. Br. Ind.* VI. 358 ; *Roxb. Fl. Ind.* II. 143.—Mendon, *Rheede Hort. Mal.* VII. t. 57.

Arty, Vâgâchyo-dâvalyo, *Konk.* ; Raiz d'empoc. *Port.*

Indigenæ isti radicis parti, quæ ad Boream vergit, magnam vim ascribunt in sympathia, magia, et aliis Metaphysicis operationibus. Fructus alioquin radici adnatus luxuriantem ulcerum carnem impedit : cum oleo *Sergilim* et haustus et pudenda applicatus hujus pulvis, parum facit facilem.

LXXXVI. PONTEDERIACEÆ

MONOCHORIA VAGINALIS, *Presl Reliq. Houk* ; *Fl. Br. Ind.* VI. 363 ; *Pontederia vaginalis*, *Roxb. Fl. Ind.* II. 121.—Carimgod, *Rheede Hort. Mal.* XI. t. 44.

Nelota-phala, *Konk.*

Tata planta contrita et in lacte data, feбри medetur colericæ. Oculorum affectus tolluntur, si caput cum illius decocto ungetur et oleo. Radix cocta cum s. celaro assumpta, vitia hepatis corrigit, flatus dissipat ; trita in butyro et oleo et sic epota inflammationem seu rubedinem oculorum tollit. Cortex radicis in pulverem redactus cum Saccharo sumptus antiasthmaticum est. idem masticeas et in ore detentus odontalgiam sedat et abigit.

LXXXVII. XYRIDEÆ.

XYRIS INDICA, *Lin.* ; *Fl. Br. Ind.* VI. 364 ; *Roxb. Fl. Ind.* I. 169.—Kotojiletti-pulla, *Rheede Hort. Mal.* IX. t. 71.

Dâdancârt, *Konk.*

Foliorum succus cum aceto mixtus impetigini resistit. Folia cum radice oleo incocta, contra lepram sumitur; cum *Mungo* decocta et epota somnum conciliant.

LXXXVIII. COMMELINACEÆ.

ANEILEMA NUDIFLORUM, *Br.*; *Fl. Br. Ind.* VI. 378; *Commelinus nudiflora*, *Roxb. Fl. Ind.* I. 173—(1) Tali-pullu, *Rheede Hort. Mal.* IX. t. 63.

Planta cum lact. o Nucis Indicæ succo capiti superfusa capillos promovet. Surcus cum oleo *Tzil-Elu* decoctum lepræ, Malabaribus Ben-Cuttam, Carin-Cuttam, adversatur.

(2) Nelan-pullu, *Rheede Hort. Mal.* X. t. 19.

Nil-pulla, *Konk.*

Ex hac planta cum *sero lacticis* decoctum præparatur et linimentum, in umbilicali regione applicandum; quod egregium præstat antidotum.

CYANOTIS AXILLARIS, *Roen. & Sch.*; *Fl. Br. Ind.* VI. 388; *Tridacantia axillaris*, *Roxb. Fl. Ind.* II. 118.—Nir-pulli, *Rheede Hort. Mal.* X. t. 13.

Tap.

Decoctum hujus plantæ tympanitidem minuit.

LXXXIX. PALMEÆ

ARECA CATECHU, *Fl. Br. Ind.* VI. 405; *Roxb. Fl. Ind.* III. 615.—*Conuga*, *Rheede Hort. Mal.* I. t. 5, 6, 7, 8.

Mâdi, Phojhal, Supâri, *Konk* Ariqueira, *Port.*

Ralix decocta in aqua servit pro ore sulcato si eam ea diluat, ut sit pro ejus pastulis. Succus foliorum tenerorum expressus et cum oleo *Schuzgelem* datus confert pro lumbricis.

PHENIX SYLVESTRIS, *Roxb.*; *Fl. Br. Ind.* VI. 425; *Roxb. Fl. Ind.* III. 787.—Katou-indel, *Rheede Hort. Mal.* III. t. 22-25.

Kájni, *Konk.*; Tamara do mato, *Port.*

Fructus hujus arboris, quem admodum fructus *Tanfel* sive *Arækas*, cum folio *Betel* et calce viva a pauperibus manducantur; cæterum folia, fructus, atque arboris partes validissimè astringunt, et fluxus quoscunque potentissime sistant. Insuper e foliis pileos contextunt indigene.

CORYPHA UMBRACULIFERA, *Lin.*; *Fl. Br. Ind.* VI. 428; *Camb. Fl. Ind.* II. 177.—Coddá-Panna, *Rhede Hort. Mal.* III. t. 1-12.

Karetela, Satrycho máđ, *Konk.*; Arvore das sombreiros, *Port.*

Cæterum arbor hæc in Medicina vix ullum habet usum: nihilominus tamen succus e surculis fructiferis expressus vomitum excitando conducit ex morsa serpentis vertiginosis, ac delirantibus. Fractum theca tenella adhuc si discindatur liquor exstillat, qui radiis solaribus in substantiam duriorém condensatus, ac mulieri gravidæ exhibitus faciem necit, et potenter expellit. Insuper folia velium tectis inserviunt. adeo ut coram libri non ex libris, hoc est, arborum corticibus interioribus ipsi ligno adherentibus, sed ex hujus arboris foliis confectur admodum duribiles et si bene afferventur pene perennes; quibus ferreo stilo suos characteres imprimunt, unde superiore cuticulâ dehiscent: literæ signate remanent. E fructibus autem globuli ad armillas, brachialia, moniliaque pro Domicellis tornantur, hique lævigati et rubro colore tincti pro genuino rubro corallo imperitis facile obtraduntur.

CALAMUS TRAVANCORICUS, *Kort. Fl. Br. Ind.* VI. 452; *Tsjera-tsjurel*, *Rhede Hort. Mal.* XII. t. 64.

Veta, *Konk.*

Succus radicis super craticulam torrefactæ, capiti illinitur adversus Cephalæam.

COCOS NUCIFERA, *Lin.*; *Fl. Br. Ind.* VI. 482; *Rach. Fl. Ind.* III. 614.—Tonga, *Rhede Hort. Mal.* I. t. 1, 2, 3, 4.

Máđ, *Konk.* Coqueiro, *Port.*

Radix decocta in aqua et cum siccis gingibere epota confert pro febre calida, eadem trita et decocta cum oleo fructus seu *Coqui* adhibetur

in ablutione oris pro pustulis in gingiva obortis; succus ex ramis tenellis expressus et mixtus cum momento mellis ocalis ad sedandum dolorem adhibetur facta lotione, succus foliorum cum oleo fructus seu *Cogui* in decocto datus proficuum est pro hæmorrhoidibus; flores cum saccharo comesti juvant urinantes materiam purulentam; succus ex floribus expressus ac in lactæ vaccæ datus proficuum est pro gonorrhœa; capsulae florum trita et cum oleo decocta prodest in ulceribus ex adustione ortis facta perunctione, succus ex fructu tenello expressus servit pro pustulis oris in infantibus facta lotione, ut et pro oculorum doloribus eodem modo adhibita; aqua *Caryje* epota cum floribus arbori jecoris restringendo confert, eadem in iterata lotione capitis pro rubeline oculorum conducit; medulla fructus seu *Cogui* valet pro sulcis oris masticata; oleum ex medulla extractum pustulas capitis pellit facta perunctione, idem proficuum quoque est pro hæmorrhoidibus eodem modo usurpatum; pyrum quod ex aqua in cavitate *Cogui* exerescit cum oryza tostam datur pro tussi ex melancholia nata, ex cortice arboris exprimitur oleum quocumque angitur pars affecta morbo cutaneo nato ex vermibus.

XC. PANDANÆ.

PANDANUS FASCICULARIS, *Lamk.*; *Fl. Br. Ind.* VI. 485: *Roxb. Fl. Ind.* III. 738.—(1) Kaida, *Rhede Hort. Mal.* II. tt. 1, 2, 3, 4 et 5.

Bomdaki, Bomagi, *Konk.*

Foliorum simul et radicis succus pro balneo maniacis subministra-
tur. Fores cum sandalo ac camino a l potinuncalam aptati simulque com-
minuti atque hypogastrio inuncti genitales vires instaurant. Ex radi-
ce paratum apozema dysuriam tollit. Ex ejusdem succo deponitur co-
quendo oleum antiarthriticum.

(2) Kaida Taddi, *Rhede Hort. Mal.* II. t. 6.

Ex foliis teneris exactus succus cum saccharo sumptus dysenteria
medetur; ex maturo autem fracta pressus liquor saccharo mixtus apli-
this adversatur.

(3) Perin-Kaida-taddi, *Rhede Hort. Mal.* II. t. 7.

Eandem cum prima est *vivum*.

(4) Kuida Tsjeria, *Rheede Hort. Mal.* II. t. 8.

Bomduka, Bon, *Konk.*

Eerundem cum caeteris est virium.

XCI. AROIDEÆ.

LAGENANDRA TOXICARIA, ; *Dolz.* ; *Fl. Br. Ind.* VI. 495.
Karin-pola, *Rheede Hort. Mal.* XI. t. 23.

Balneum ex hac planta præparatum omnem corporis æstam reficit.

PISTIA STRATIOITES, *Linn.* ; *Fl. Br. Ind.* VI. 497 ; *Rorb.*
Fl. Ind. III. 131.—Kodda pail, *Rheede Hort. Mal.* XI. t. 32.

Zelo, *Konk.*

Folia cum oryza in lacteo Nucis Indicæ succo lævigata medicamentum præstant antidysentericum. Cum aqua rosacea et saccharo data, tussim graviores et parakuta plegmata corrigant, hæmoptisiam inhibent. Radix cum camino in lacte vaccino trita et epoca alvum promovet, tenesinum levit, lumborum et hypogastrii dolores emollit. Idem præstat si cum Calamo Aromatico et aqua calida assumatur.

TYPHONIUM DIVARICATUM, *Decn.* ; *Fl. Br. Ind.* VI. 510 ; Arum divaricatum, *Rorb. Fl. Ind.* III. 503.—Nelenschena major, *Rheede Hort. Mal.* XI. t. 20

Cayeri-surna, *Konk.*

Bulbus in pulverem redactus, cum butyro et saccharo sumtus alvum adstringit.

T. GRACILE, *Schott* ; *Fl. Br. Ind.* VI. 512 ; Arum gracile, *Rorb.*
Fl. Ind. III. 505.—Katu-schena, *Rheede Hort. Mal.* XI t. 21.

Cujuro-surno, *Konk.*

Bulbus contritus et in decocto cum oleo datus fluxum sistit hæmorrhoidum ; cum lacte acido assumptus appetitum excitat.

THERIOPHONUM INFAUSTUM, *N. E. Br.* ; *Fl. Br. Ind.* VI.

513.—*Neluschena minor*, *Rheede Hort. Mal.* XI. t. 17.

Toro, *Kook*.

Patio ex foliis preparata colicos mitigat dolores.

AMORPHALLUS COMPANULATUS, *Blume*; *Fl. Brit. Ind.* VI. 513; *Arum companulatum*, *Rox. Fl. Ind.* III. 509—*Mullenchena*, *Rheede Hort. Mal.* XI. t. 19.

Caleri-surau, *Surna*, *Kook*.

Radix contrita et cum capræ lacte assumpta, vires corroborant.

A. DUBIUS, *Blume*; *Fl. Br. Ind.* VI. 514.—*Shena*, *Rheede Hort. Mal.* XI. t. 18.

Surana, *Kook*.

Bulbus in pates discipags, ni sale edlicatus et pulverisatus cum lacte vaccino atrabilaris propinatur,

REMUSATIA VIVIPARA, *Schott*; *Fl. Br. Ind.* VI. 521; *Rorb. Arum viviparum*; *Fl. Ind.* III. 496.—*Maravara tsjembo*, *Rheede Hort. Mal.* XII. t. 9.

Bonkalou, *Kook*.

Radix cum *Manjella* vel *Carcuna* et oleo *Nacis Indicæ* in forum unguenti relecta, herpem omnesque inveteratis scabiei species sanat. Succas cum viresc urina hantias, omnis generis ventrum expellit, precipue autem serpentis *Marapeathæ*, belgi; *le Vercatter* dicti, qui ias incurabilis. Si quis ab hoc serpente ictus per anti lota supersit et non statim moriatur, corpus tamen putredine afficitur, ita ut quotidie frusta ex illo decendant, et sic miserrima morte pereat æger.

COLOCASIA ANTIQUORUM, *Schott*; *Fl. Br. Ind.* VI. 523;—*Arum Colocasia*, *Roxb. Fl. Ind.* III. 494; *A. nymplucifolium*; *Roxb. l. c.* 495—*Weli-ila*, *Rheede Hort. Mal.* VI. t. 22.

Folia, trita, assata, moluloque implicita, fotum exhibent, paribus, ex nervorum compressione, stupore affectis, conducens; razura fructus, rubrarum *formicarum* ovis permixta, idem præstat. Bulbus radice sanguifluæ medetar gonorrhææ.

POTHOS SCANDENS, *Linna.*; *Fl. Br. Ind.* VI. 551; *Roxb. Fl. Ind.* I. 430.—*Ana-Parva*, *Rheede Hort. Mal.* VII. t. 40.

Benderli, *Kouk.*; Folhas da lança, *Port.*

Vires acuti cum *Tinda-Parva*. In febribus ardentibus alihibetur.

ACORUS CALAMUS, *Linna.*; *Fl. Br. Ind.* VI. 555; *Roxb. Fl. Ind.* II. 169.—*Va emba*, *Rheede Hort. Ind. Mal.* XI. t. 48.

Bembi, *Vekhauda, Kouk.*

Folia cum zinzibere sicco trita artuum lincinationes et arthriticos dolores ex pituita salsa et acri, mitigant. *Radix* in carbonem exusta et in pulverem relecta dentifricium est, quo si gingivæ superpota oryxæ aqua perfricentur; cynicus curatur spasmus. Idem pulvis, cum convenienti liquore assumptus, cholerae medetur; imo contri colicos et ventrem lincinantes, assumitur dolores. Comestus prostratum appetitum tan efficaciter excitat, ut etiam salivam moveat. In aqua lavigatus et propinatus imo pro balneo adhibitus epilepticos sanat infantes.

XCII. CYPERACEÆ.

KYLLINGIA CREVIFOLIA, *Roxb.*; *Fl. Br. Ind.* VI. 58^s.—*Mattenga*, *Rheede Hort. Mal.* XII. t. 52.

Musta, *Kouk.*

Decoctum hujus plantæ sitim restringit. *Radix* Lusitanice *Cochinha* dictæ in decocto usurpatur, conlucant in febribus calidis et diabete; oleum ex radicibus extractum hepatis inservit, sitim restringit, ardor in febrium sistit, diabete curat, costis illo inanes, etiam crines auget. Oleum per distillationem ex radicibus extractum, crassum est et turbidum cum tempore multas faeces ad fundum demittens, pinguis et viscidose consistentiæ, coloris virido-flavo-fusci, odoris grati, sapore pinguis et subaris, in distillatione cum aqua simul a leccidens eique immittens.

JUNCCELLUS INUNDATUS, *C. B. Clarke*; *Fl. Ind. Ind.* VI. 595; *Cyperus inundatus*, *Roxb. Fl. Ind.* I. 291.—*Iris cen Ballari*, *Rheede Hort. Mal.* XII. t. 56.

Derjua, *Kouk.*

Vires conveniunt ut *Ira* (*Mariscus albescens*).

CYPERUS CEPHALOTES, *Vahl*; *Fl. Br. Ind.* VI. 597; *C. monocephalus*, *Roxb. Fl. Ind.* I. 188.—*Pec motenga*, *Rheede Hort. Mal.* XII. t. 53.

Badera musta, *Konk.*

Cum oleo decocta pruritus sedat facto corporis inunctione. Reliquæ virtutes cum illis primæ speciei conveniunt.

C. MALACCENSIS, *Lamk.*; *Fl. Br. Ind.* VI. 608; *C. incurvatus*, *Roxb. Fl. Ind.* I. 196; *C. procerus*, *Roxb.* l. c. 203.—*Potapulla*, *Rheede Hort. Mal.* XII. t. 50.

Lanon, *Lovo*, *Konk.*

Cum hocce junco aedes obteguntur, incolas per biennium contra æris æstus, ventorumque injurias, fartos et integros servans. In medicina extra usum est.

C. EXALTATUS, *Retz*; *Fl. Br. Ind.* VI. 617; *C. umbellatus*, *Roxb. Fl. Ind.* I. 205; *C. slopecuroides*, *Roxb.* l. c. 208.—*Wara-pulla*, *Rheede Hort. Mal.* XII. t. 42.

Pena, *Konk.*

Succus cum *Nuce Moschata* permixtus ventris dolores, *Malabarice Rama Cua* et *Sura* dictos, mirum in modum sistit et emollit.

MARISCUS SQUARROSUS, *C. B. Clarke*; *Fl. Br. Ind.* VI. 623; *Cyperus squarrosus*, *Roxb. Fl. Ind.* I. 190.—*Mulen-pulla*, *Rheede Hort. Mal.* XII. t. 54.

Jasculum ex hoc graminæ præscriptam æstam corporis temperat.

M. ALBE CENS, *Grud.*; *Fl. Br. Ind.* VI. 623; *Ira*, *Rheede Hort. Mal.* XII. t. 55.

Râna derpu, *Konk.*

Folia in decoctum præparata dolores ventris sedant, menstrua provocant.

SCIRPUS ARTICULATUS, *Linm.*; *Fl. Br. Ind.* VI. 656; *Roxb. Fl. Ind.* VI. 214.—*Tsjeli*, *Rheede Hort. Mal.* XII. t. 71.

Tanapocula, *Konk.*

Ex radice cum *Mirabolanis* syropus conficitur catharticus.

8. SQUARROSUS, *Lin.*; *Fl. Br. Ind.* VI. 663; *Rorb. Fl. Ind.* I. 222.—Motta-pullu. *Rheede Hort. Mal.* XI. t. 38.

Integra planta in aqua *Oryze* et oleo *Mbrolli*, et virente *Cucurbita*, vel etiam in oleo *Nucis Indicae* et *Cumina Piperisque* longo decocta, linimentum praestat adversus morbum hepaticum vitiligine et speciatim Alrho comitatum.

SCLERIA LITHOSPERMA, *Sw.*; *Fl. Br. Ind.* VI. 685; *S. tenuis*, *Rorb. Fl. Ind.* III. 514.—Kaden-pullu. *Rheede Hort. Mal.* XII. t. 48.

Ex radice antinephriticum conficitur apozema.

XCVII. GRAMINEÆ

PANICUM ITALICUM, *Lin.*; *Rorb. Fl. Ind.* t. 302.—Tenna. *Rheede Hort. Mal.* XII. t. 79.

Varia, *Konk.*

Planta sola trita tubonibus veneris imponitur, cum aqua levigata et epota, sanguinem ex gravi causa aliave externa causa grumescens rarefacit, dolorem colicum lenit, ventris torminibus, gonorrhœae, abscessibus illinendo medetur.

ESPINIFEX SQUARROSUS, *Lin.*; Is-nullo. *Rheede Hort. Mal.* XII. t. 75.

Saranto, *Konk.*

Radix trita et cum cinere capilli humani decocta a maniacis cum successu assumitur.

COIX LACHRYMA, *Lin.*; *Rorb. Fl. Ind.* III. 568.—Ostri-sopda. *Rheede Hort. Mal.* XII. t. 70.

Rân-jundlo, *Konk.*

Fructus, corallæ instar, in annillas nectuntur.

LEERSIA ARISTATA, *Roxb. Fl. Ind. II. 207.*—Nir-valli-pullu, *Rheede Hort. Mal. X. t. 12.*

Aurium tinnitus ex obstinate pituita lenta contractus, hac planta in *Oleo Sergelim* excocta, vel foliorum succo auribus in simul instillato tollitur. Endemius ille morbus, *Pitao* dictus, per decoctam foliorum in aqua cum saccharo curatur.

SACCHARUM ARUNDINACEUM, *Petr. ; S. exaltatum, Roxb. Fl. Ind. I. 245.*—Herpa, *Rheede Hort. Mal. XII. t. 46.*

Bala, *Konk.*

Ex foliis apozema fit emmenagogum. Abscessibus imposita, illos ad maturitatem perducunt et aperiunt. Radix oleo incocta scabiem ac pruritum tollit.

ANDROPOGON CITRATUS, *DC.*—Ramacciano, *Rheede Hort. Mal. XII. t. 72.*

Bocalo, Oli chã, *Konk.*

Apud indigenas principem obtinet locum pro febribus, ventris doloribus, capitis affectionibus, intestinorum torminibus et colicis passionibus, in decocto simpliciter vel cum aliis medicamentis propinata.

CYNODON DACTYLON, *Pers. ; Panicum dactylon, Roxb. Fl. Ind. I. 289.*—Beli-Caraga, *Rheede Hort. Mal. XII. t. 47 (?)*

Durba, Haryali, *Konk.*

Rheumata capitis et oculorum minuit linimentum ex hac planta, affuso *Nucis Indicæ* oleo et *Sandalo*, applicatum : Gingivarum dolores lenit, si nempe cum oryziæ decocto teratur.

ELEUSINE CORACANA, *Gaertn. ; Roxb. Fl. Ind. I. 342.*—Tjötti-pullu, *Rheede Hort. Mal. XII. t. 78.*

Nächno, *Konk.*

Pista ex hac planta farina in pillulis formatur, quæ capitis adversus

maniam imponuntur. Eadem farina cum *Ovi* albumine, vel *Nuce Indica* in scobem conquassato et commixta, distortisque manibus, pedibus aliisque partibus magno cum levamine circumlinitur; lumbis applicata robur gestale promovet. Prædictæ pillulæ in oleo *Sergolin*, hoc est *Tsit-Etu* frictæ, panno insutæ ac dolenti parti impositæ, artuum dolores sedant; cataplasma ex hac farina confectum idem præstat: semen nodulo illigatum et in aqua coctum cum successu in cholera adhibetur.

ERAGROSTIS CYNOSUROIDES, *Rom. & Sch.*: *Poa cynosuroides*, *Roeb. Fl. Ind. I.* 333.—*Kodi-pullu*, *Rheede Hort. Mal. XII.* t. 57.

Darpu, kusâ, *Konk.*

Radix in potuancham preparata salivationem in febris sistit.

BAMBUA ARUNDINACEA, *Retz., Roeb. Fl. Ind. II.* 192.—*fy*, *Rheede Hort. Mal. I.* t. 16.

Vasi, Mân, *Konk.*

Corticis et foliorum decoctum epotum servit ad sanguinem in corpore ex vulnere retentum expurgandum, confertque etiam puerperis ad materis sanguinolentæ que post partum retenta est, excretionem. Cals que in stipitibus vetustis crescit, prodest in stranguria, iisque qui urinam purulentam mingunt.

B. BACCIFERA, *Roeb. Fl. Ind. II.* 197.—*Beesha*, *Rheede Hort. Mal. V.* t. 60.

Tivo, *Konk.*; *Bambu d'escrever*, *Port.*

Ex hoc frutice indigenæ sagittas conficiunt, et corbes. Ex ramulis arundinaceis calami fiunt scriptori. Folia si in aqua coquantur, ejusque decoctio exhibeatur menstrua obstructa provocat: eodem decocto si os collinatur erasæ gingivas sanat, et odontalgiam tollit.

XCIV. FILICES.

POLYPODIUM QUERCIFOLIUM, *Spr.*—*Panna-k-leugo-mara-vata*, *Rheede Hort. Mal. XII.* t. 11.

Kadebou, *Konk.*

Tota hæc planta, si quando supra arbores *Cassipiram* invenitur, etiam easdem habet vires; si supra *Nucum Indicum*: apertas rigricantes curat; si supra Alou, omnem viscerum refrigerat; cum *Sandalo* et hæc mulierum post aures applicata, oculorum fluxum et caliginem abigit.

P. TAXIFOLIUM, *Spr.*—Welli-panna-keleugu, *Rheede Hort. Mal. XII.* t. 12, 13.

Kadebou mäs, *Konk.*

Succus radicis vermes enecat, bilem sistit et temperat. Folia in pulverem redacta cum melle assumpta secundinas, menses, imo lactum ipsum fortiter eiciunt; mulieres ergo cavete vobis.

P. ADNASCENS, *Willd.*—Marotta-mala-maravara, *Rheede Hort. Mal. XII.* t. 29.

Bendarlé *Konk.*

Succus foliorum cum aqua juniorum *Nucum Indicum* permixtus, dentes firmat, intumescenciam gingivarum tollit. In morbillis cum fructu adhibetur, citissime illos produens. Cum planta *Tondeia* Kortz omnes affectus venereos sanat.

LOMARIA SCANDENS, *Willd.*—Panna-valli, *Rheede Hort. Mal. XII.* t. 35.

Succus cum oleo *Sergelim*, *Zuzibere* ac *Pipere* longi permixtus capitiq; illitus, cephalalgiam biliosam emendat et abigit.

ASPLENIUM FALCATUM, *Willd.*—Nella-panna-usaravara, *Rheede Hort. Mal. XII.* t. 18.

Pännä, *Konk.*

Folia contusacum illorum succo assumpta, alvum leniter laxant sanguinem purgant. Tota planta in formam balnei præparata, et per incessu, ad umbilicum usque, usurpata, mirum in modum partum promovet, pituitam pulmonum attenuat, lienem induratum et obstructum aperit et imollit, si quando succus cum radice arboris *Canelle* jejuni assumatur.

A. AMBIGUUM, *Willd.*—Para-pana-maravara, *Rheede Hort. Mal. XII. t. 15.*

Adversus morbos adhibetur endemios, febres intermittentes curat : rissim solat, alvum laxat. Succus cum sanguine gallinae permixtus odorem ex pulvere et serventi oleo contractum refrigerat.

ASPIDIUM SPLENDENS, *Sp.*—Arana-panna, *Rheede Hort. Mal. XII. t. 32.*

Folia in cocco lacte trita venenam abdominis praecordia et viscerum arens expellunt.

A. PARASITICUM, *Willd.*—Kari-welli-panna-karavara, *Rheede Hort. Mal. XII. t. 17.*

Māa pānā, *Konk.*

Tota planta adhibetur in Morbo Endemio, illi est languor vel infirmitas membrorum, decoloratio vividi cutis coloris : indigence oculi, non tantum instar mortui pallidi sunt, sed et flavi, imo ipsa oculorum albedo, dispuxa et intolerabilibus corporis doloribus continuo subjecti, qui ex malignis ventis nocturnis, et irregulari vita caesuntur. Cadaverum horum dissecta, semper licu deprehenditur lapidis instar induratus.

XCV. LYCOPODIACEÆ.

LYCOPODIUM PHLEGMARIA, *Willd.*—Panna-povel-pasteja-maravara, vel Eneadi konrengo, *Rheede Hort. Mal. XII. t. 14.*

Bendary, *Konk.*

Habetur pro clypeo, omnium omnium generis fascinationes, incantationes, execrationes, atque omnibus bene fore, modo secundum regulas ab illi prescriptas adhibetur : sed illic tot cavillationibus, observationibus et determinationibus sunt implicatae, ut merito à sapientioribus detestentur et repellantur. Quae quavis fabulosa sint et invera, hoc tamen verum est, plantam esse omnino praestantissimam, cujus viridulae excellentissimas et efficacissimas ex asse describere, in paginae sequenti paginam. Doctissimus et excellentissimus Do. *Pantus Herrera*, Med.

clique Doctor, jam vero, Lugduni Batavorum Botanicus Professor celeberrimus, obnixè à me petiit ut illam, cum Insula Ceylone degeret, transmitterem, sed licet totæ regionis et illarum incolæ, ex auctoritate principum illorum, mihi ad manum essent, nunquam tamen ipsam potui consequi; sed jam ad iter accinctus, transmissa mihi est per celeberrimum Dom. *Alexandrum* istius regionis indigenam Archiepiscopum Montis et Christianorum Sancti Thomæ in insula Malabariensi.

PLANTAS NÃO CLASSIFICADAS.

PANEL.—*Rheede Hort. Mal. II. t. 9.*

Kálo-apakáro, *Kook.*

Totæ plantæ trita et decoctæ vapor in parte affecta exceptus sedat dolorem arthritici. Radix humoribus evocandis trita et cum aqua in qua oriza macerata fuit in lotionè adhibita, eadem trita et in aqua sumpta appetitum acuit; in decocto data flatu disentit. Folia in capitis affectionibus conferunt, ut et in ejus dolore ac præcipue in phrenesi agrotorum. Foliorum decoctorum vapor in ore attractus dentium dolorem mitigat. Foliorum succus nna cum oleo decoctus et auribus immixtus, earum dolorem sedat.

—————*Rheede Hort. Mal. II. t. 14. (15).*

Ejus decoctum cum oleo servit pro pruritu in unctione partis affectæ.

—————*Rheede Hort. Mal. II. t. 27.*

Radix servit pro inflatione ventris vel etiam alienas partis tumefactione trita et apposita in modum placentalæ. Folia apostematismatarandis servant trita et cum lacte acido iis apposita, ad quod etiam coadjuvat. Foliorum et corticis simul tritorum cum aqua calida lotio.

VALLI-SCHORIGENAM, *Rheede Hort. Mal. II. pg. 79.*

Pitta-Gasareuli, *Kook.*

Radix decocta in aqua et epota hepatis ardorem restinguit, atque eodem modo servit pro tumore ventris et membrorum urinamque suppressam conitante; eadem trita et mixta cum lacte ac cum saccharo

data proficua est pro pruritu corporis seu membrorum; succus ex ea contrita expressus et epotus confert micturientibus urinam viscosam ac purulentam.

TSIRROU-MEER-ALOU—*Rheede Hort. Mal.* III. t. 56.

Paray, Konk. : Arvore das raizes, *Port.*

Vires hujus arboris eadem sunt, ac præcedentis (*Ficus religiosa*) præterquam quod ex radice cum calce et curcuma in aqua decocta balneum conficitur ad Epilepsiam et Leporam curandam.

HANDIR ALOU—*Rheede Hort. Mal.* III. t. 59.

Vodon, Konk. : Figos do buzio, *Port.*

Arboris hujus foliorum tenellorum succus expressus ad erosas gingivas, similesque oris affectus egregium est remedium, si eo os colluatur. Ex eodem succo cum butyro recenti digestivum fit, ulceribus mandibularibus et consolidandis perquam utile. Ex radicibus et foliis simul in aqua decoctis balneum paratur, quod sanandæ lepræ, et epilepsiæ conducere dicitur.

MALA-KATOU-TSAMBOU, *Rheede Hort. Mal.* IV. t. 8.

Malambetti, Konk. : Jambos dos bujos, *Port.*

Radix extrinsecus variis modis usurpatur ad Cephalalgiam, aliosque capitis affectus.

TSJEM-TANI—*Rheede Hort. Mal.* IV. t. 11.

Tanis-Morij, Konk.

Hujus arboris cortex calefacit, viscidos ac pituitosos humores incidit, attenuat, debilitata viscera, roborat nec non aquos hydropicorum ducit. Idem cortex cum fractus pulpa in pulverem relictus et exhibitus, febrem tertianam intermittentem tollit. Fractum nuclei comestis alvum laxant.

KATOU-NAREGAM—*Rheede Hort. Mal.* IV. t. 13.

Ranu-nimba, Codivo nuú, Konk. : Limão covado, *Port.*

Parto arboris hujus foliorum succus egregium quoque capiti expurgando habetur erithinum. Idem succus cum pipere longo, zinzibere, et saccharo exhibitus tussim sedat, ceterosque pulmonis affectus è causa frigida natos potenter sanat. Insuper è foliis hisce in aqua cœtis Babuennu fit, quod lassitudini, nec non artuum doloribus tollendis mirifice conducit.

NYAYEL, *Rhede Hort. Mal. IV. t. 16.*

LASSA, *Kook. ; Maquinla, Port.*

Fructus in deliciis comedantur. At nuclei cum zinzibere recentè contusi, et addito saccharo exhibiti alvum movent. Ex fractum immaturorum succo cum saccharo syrupus præparatur, tussi, asthmati, aliisque thoracis affectibus præprimis conveniens.

KAYOL-ADAMBOD—*Rhede Hort. Mal. IV. t. 22.*

DAYA-sotulari, *Kook. ; Catapumea brava, Port.*

Cæterum ex foliis hisce contusis cum Nucis Indicæ aqua Emplasticum conficitur, quod Babosibus venericis, aliisque glutulorum tumores impositum nocet.

PERIN-KARA—*Rhede Hort. Mal. IV. t. 24.*

GALI-douso, *Kook. ; Azeitomas do Malabar. Port.*

Cæterum fructus hi in deliciis comedantur : nec non saccharo conduntur, ac uti olivæ in muria et aceto servantur pro Achuar : liquoribus cibis inter prædandum et cœmandum comesti ventriculum roborant, ac alimenterum in eo fermentationem potenter javant.

KAYHOT-TIRKA—*Rhede Hort. Mal. IV. t. 28.*

DAYA-saibo, VINA papalo, *Kook. ; Tava brava, Port.*

Cæterum hi loco Ateque seu Kaunge cum folio Betel frequenter manucantur. Arboris cortex exsiccatus, et in pulverem redactus siogue exhibitus, bilis ardorem compescere dicitur.

BESTIRKA—*Rhede Hort. Mal. IV. t. 30*

KUSIBO, *Kook. ; Teen-iacho, Port.*

Ex arboris foliis cum melle medicamentum paratur, quod exhibitum sudores movent, aëstum, febrilem temperat, et variolas expellit.

IRIPA.—*Rheede Hort. Mal. IV. t. 31.*

Iripou, *Konk.* ; Fructa bolsa, *Port.*

Arboris hujus radices alvum movent. — E foliis in lacte yacino coctis, addito melle, potio paratur, quæ scabiem, lepram, aliosque cutaneos affectus sanare dicitur. Ex iisdem foliis cum mangas foliis in lacte dulci coctis Apozema conficitur, quod Ictero, Asthmati, Ictere alimentorum in ventriculo fermentationi, indeque nato capitis dolori medetur. E fructibus oleum fit contra scabiem, aliosque cutaneos affectus.

BEN KALESJAM.—*Rheede Hort. Mal. IV. t. 34.*

Mourmoura, *Konk.* ; Arvore da folha parida, *Port.*

Usus vero hæc arbor eosdem habet in medicina ac *kolajjan*.

PONGA.—*Rheede Hort. Mal. IV. t. 35.*

Kelay *Konk.* ; Masto spinosa, *Port.*

E viridibus hujus arboris fructibus contusis cataplasma conficitur, quod tumoribus impositum eorum suppurationem potenter promovet. E cortice et radice in aqua coctis fomentum paratur, quod celestias crurum tumoribus (nalo India Endemio, et *pé do St. Thomé* Lusitanis dicto) supervenienti inflammationi medetur.

MALLAM-TODDALL.—*Rheede Hort. Mal. IV. t. 40.*

Chori-bori, *Konk.* ; Tarilla d'agua, *Port.*

Arboris hujus partes, radix viz. cortex, folia, et fructus, specificum habentur adversus Epilepsiam, Parenitidem, similesque cerebri morbos remedium.

KATOU-KADELI.—*Rheede Hort. Mal. IV. t. 43.*

Cit-nsqveri, *Konk.* ; Fructa da gralha do mato, *Port.*

Folia hujus arboris contrita, et cum pipæris foliis sic ut in pulverem redacta, atque cum saccharo exhibitâ, tussim solunt, ne phlegmata in pulmone ejiciunt.

COURONDI.—*Rheede Hort. Mal.* IV. t. 50.

Caundi, *Koak* ; Asotas, *Port.*

Succus é foliis hujus arboris expressus, et cum serg^{le} casu cullé exhibitus Diarrhæe ac Dysenteriae meletur : idem præstant Nuclei fractum quocumque modo sumpti.

KATOU-MAIT-ÉLOU.—*Rheede Hort. Mal.* V. t. 2.

Davi-rinti, *Koak* ; Carrilha de serra, *Port.*

Lignum arboris operæ fabrili accomodum. Ad hæc insignes ejusdem arboris vires extolluntur in diarrhæa, dysenteria, et tenesmo. Ex foliis cum pipere et semine Coddæ-pale in oryzæ infuso exotis antidotum fit serpentum, scorpionum, aliorumque venenatorum animalium ictibus. E cortice contusa et cocto medicamentum conficitur, ad sanguinem ex casu in corpore coagulatum dissolvendam.

————— *Rheede Hort. Mal.* VII. t. 13.

Succus ut et *Cattu-Tirpali* simul expressus cum butyro sumptus tussi convenit.

————— *Rheede Hort. Mal.* VII. t. 18.

Semen cum oleo et croco coctas, rabidi canis morsum frustra facit, modo in tempore adibentur.

————— *Rheede Hort. Mal.* VII. t. 25.

Radix in aqua oryzæ cocta et pro potu usurpata, idem præstat.

KATU-KATSJIL.—*Rheede Hort. Mal.* VII. t. 36.

Karendo, *Koak* ; Fructa barruga, *Port.*

Radix decoctum cum pulvere radicem *Chinæ* ulcera mundificat et sanat.

KATTU-KELANGU.—*Rheede Hort. Mal.* VII. t. 37.

Carando, *Koak* ; Fructa barruga penachoso, *Port.*

Fractus á plebe comeduntur. Radix cum croco mixta et apposita curam tumores dissipat ; succus foliorum cum urina vaccæ dolores au-

riam sistit.

PERIPU.—*Rheede Hort. Mal.* VII. t. 54.

Ogoanim, *Kōnk.*; Herva bendita, *Port.*

Succus pro balneo preparatur contra herpetem et impetiginem. Radix alexipharmaca est, praesertim in aqua oryzae decocta, trita, et umbilico illita.

TSJERA-PU-PAL-VALLI.—*Rheede Hort. Mal.* VII. t. 55.

Vannalla-valli, *Kōnk.*; Fula leitica, *Port.*

Folia cum sandalo citrino et camino in aqua macerata et melli permixta, febres ex articulari morbo ortas, tollit.

TSJERIA-CAMETTI-VALLI.—*Rheede Hort. Mal.* VIII. t. 46.

Ura-valli, *Kōnk.*; Favas de aya, *Port.*

Radix hujus tosta, trita et oleo commixta linimentum sanat abscessibus externis adversum.

KUDICI KODI.—*Rheede Hort. Mal.* IX. t. 9.

Duda-valli, *Kōnk.*

Linimentum ex hac planta cum vaccino lacte, oleo *Sergelin* puratum, temporibusque applicatum, narum sistit haemorrhagiam.

WALLIA-PAL-VALLI.—*Rheede Hort. Mal.* IX. t. 10.

Folia recenti butyro commixta pro linimento adversus exiles adhibentur carbonemias.

MALAN-TODDA-VADDI.—*Rheede Hort. Mal.* IX. t. 21.

Gentis superstitione plantae huic occultas tribuit vires, nempe: si credere fas sit) ad amissam virginitatem restituendam, et mulierum amorem conciliendam, si sanguisuga intentae virginis pedi sinistro ad saturitatem applicata, frustulatinque dissociata et cum planta huic trita exhibentur, vel etiam petita: foeminae eadem miscella conficitur manu. Virenti *Curcumae Camphoraeque* commixta impetigini medetur.

MAX-TODDA-VADDI.—*Rheede Hort. Mal.* IX. t. 22.

Balneum ex hac planta preparatum, lepræ ac pruriginoso acrique ardori medetur; cum oleo *Tsit-Etu* cum *Sergelim* ex eadem linimentum conficitur antispasmodicum. Succus cum *Sandalis* tritus frontale est adversus cephalalgiam calidam.

NIR-MURRI.—*Rheede Hort. Mal. IX. t. 32.*

Sauitu, *Konk.*

Planta hæc excepta radice in olla bene obturata aquæ incoquitur, cujus vapor tumorem illum cacochymicum, quem endemius ille morbus, *Pitio*, dictus inducit, dissipat.

VALLIA-CAPO-MOLAGO.—*Rheede Hort. Mal. IX. t. 35.*

Furibundi canis virus enervatur, ubi læsa pars, trito hujus plantæ fructu, vel etiam radice illinatur.

NIR-PULLARI.—*Rheede Hort. Mal. IX. t. 36.*

Integra hæc planta cum *sere* lactis, vel quoque per se in balneo preparatur, antidotale contra morsum serpentis *Poléga*: trita et cum oleo *Naris* Indicæ fortiter frixa, in colica ac dysuria cum successu assumitur; mingeudi difficultatem tollunt folia ex *etqua Lanja* cum *Calamo* Aromatico exhibita. Succus cum *jure galinaceo* epotus lithon-thripticus est.

KODATSJERI.—*Rheede Hort. Mal. IX. t. 67.*

Folia cum *Oryzæ* lotura lævigata, vel etiam oleo incæta et exhibita abdominis cruciatus mitigant, menses promoveant.

COROSINAM.—*Rheede Hort. Mal. IX. t. 68.*

Corosinam, *Konk.*

Respirandi difficultas tollitur, ubi plantæ hujus *sucus* cum *Cucurbita* præcordiis illinatur.

IRIBELI.—*Rheede Hort. Mal. IX. t. 74.*

Carabalo, *Konk.*

Radix in decoctis adhibetur anticacheticis, præsertim pro febre calida et ardore jecoris, ut et manuum ac pedum tumores, etiam pro

flatibus; dolores capitis sedat si trita cum lacte muliebri misceatur et capiti inungatur: *oleum* cum aqua calida epotam feбри calida medetur, ut et ardori jecoris, plurimisque malis; ac non dysenteriae parulenta materia permixtae; habitum insuper corrigit gravem et fastidum, prodestque in oculorum doloribus. Oleum ex radice per distillationem extractum, primum turbidum, est ac nigricans, dein, faece albicante seu cinerea ad fundum demissa, clarum et transparens, pulchre rubescens et rutilans, odoris pergrati, saporis subicris, in distillatione simul cum aqua ascendens eique innatans.

PERIM-MUNJA.—*Rheede Hort. Mal. IX. t. 25.*

Nara-valu, *Kook.*

Folia cum *Calamo aromatico* et *Allis* in aqua oryzae trita linimentum praestant antispasmodicum, quod tanto efficacius, si radicis pulverisatus cortex cum oryzae lotura butyroque indies assumatur.

PER-TARDA-VELA.—*Rheede Hort. Mal. IX. t. 79.*

Incantatis apitulatur haec planta.

KALU-TALI.—*Rheede Hort. Mal. IX. t. 80.*

Calidam cephalalgiam conspescit fons ex hoc fructice preparatus.

BILITSJIRA.—*Rheede Hort. Mal. IX. t. 84.*

Balneum ex hac planta conficitur alexicacum adversus omnigenam serpentum virus. Folia cum succo corticis Louje levigata illitaque, carbunculis, phlegmonique melentur.

KANNELI-ITTI-KANNI.—*Rheede Hort. Mal. X. t. 5.*

Dovi-phala, *Kook.*

Ex foliis balneum paratur, pedum tumores, quos incantamenti viribus attribuit, gentis hujus credulitas, dissipat: cortex cum oryzae aqua in linimentum adaptatus, idem praestat.

MANJA-ADKA-MANJEN.—*Rheede Hort. Mal. X. t. 17.*

Cum *Uvis pastis*, *Cariophyllis* et *Glyceriza* succo exhibita haec

planta cacochymicam illud malum endemium (Pitao) eradicat, sanguificationem juvat.

BULA.—*Rheede Hort. Mal. X. t. 30.*

Dacalo-tandulo, *Konk.*

Radix cum *Scheru-bola* trita, et pro lotionē adhibita, a pueris humores dissolvit et expellit.

NANSHERA-CANSCHABU.—*Rheede Hort. Mal. X. t. 50.*

Schanga-cuspi, *Konk.*

Trita et cum lacte epota, morbo sanat illius regionis endemios; succus expressus, cum lacte dulci assumptus, per vomitum venenum expellit, atque etiam catharticus est.

NIUREX.—*Rheede Hort. Mal. X. t. 55.*

Folia una cum seminibus lacti muliebri admixta succum stillant, cujus binæ guttaturæ naribus injectæ utili sternutamento catharticos solvant; radix oleo incocta capitiq; illita cæphaleam tollit.

KILKOLA-TSJETTI.—*Rheede Hort. Mal. X. t. 57.*

Algidæ febres apozemate ex singulis hujus plantæ partibus, admixto *Soudalo, Piperis*; vel etiam linimento ex ejusdem radice, affuso oleo, fugantur vel præveniuntur. Folia trita vulneribus immittuntur: Vulnerarium præterea linimentum præparatur ex radicis cortice, cum *butyro*, quod etiam in ulceribus adhibetur.

NARI-PALSJA.—*Rheede Hort. Mal. X. t. 62.*

Vassini, *Konk.*

Succus cum illo *Herbæ mamme* simul expressus, linimentum præstant antihæmorrhoidale. Folia cum lacteo *Naris Indica* sacco contendantur, quæ assumpta intestinorum flatu vellicantes inhibent.

NAGA-DANTI.—*Rheede Hort. Mal. X. t. 76.*

Danti, *Konk.*

Folia, radix atque fructus, tanta purgandi pollent energia, ut siccis

odor catharsiu excitet : folia extrinsece applicata articulari medentur morbo.

TSJERU-MANGA-NARI.—*Rheede Hort. Mal. X. l. 89.*

Ambli, *Konk.*

Cum *Carinta-Tali* et *Codagen* in sero lactis decocta, morbo, *Pitas* dicto, medetur. Succus, cum *Gallis* (qui Malabarensis *Ari de Beagala* dicuntur) pulverisatis, saper eroticulam tostus, ac denno in pulverem reductus, ventrem laxat.

TSJERU-PARDAVEL.—*Rheede Hort. Mal. X. t. 94.*

Cum stercore vetusto bufali in oryzae decocto levigata, vel etiam pulverisata, et lææ parti imposita, noxios vesperum, succorumque (Malabarice *Magalla*) morsus, frustra facit.

ELA POLA.—*Rheede Hort. Mal. XI. t. 36.*

Ex foliis, radice et virente *curcuma* linimentum præparatur temporibus pro *Cephalæa* applicandum.

CATULLI POLA.—*Rheede Hort. Mal. XI. t. 40.*

Kola-kañdo, *Konk.*

Radix in sale essiccata et in pulverem redacta cum saccharo nigro exhibetur pro hæmorrhoidibus ; ejus decoctum in aqua idem præstat, pro lotionè nempe adhibita. Tosta et dein trita apostematibus aperendis et maturandis super imponitur ; addito oleo podagræ cum illo perunguntur ; folia in quibus circumdata illorum dolores sedant.

MARETA-INCALI.—*Rheede Hort. Mal. XI. t. 68*

Succus cholerae medetur.

BITI-MARAM-MARAVARA.—*Rheede Hort. Mal. XII. t. 2.*

Giriy, *Konk.*

Succus cum oleo *Sergelim* et recenti butyro concocis febris ardentem restringit, stragularie medetur, calculos et menstrua prævoct. hy-

dropi adversatur, tympanitidem discutit, morbum endemium curat, sanguinem melancholicum purgat. Sed ubi hæc planta supra arborem *Kanjiyam* invenitur, tum vomitum ciet, totum corpus immodice turbat, alvum laxat et quidem tanta cum vehementia, ut non nisi summo cum periculo et præcautione adhiberi possit; nam illico sæpius hominem occidit.

PATETSJIVI-MARAVARA.—*Rheede Hort. Mal.* XII. t. 10.

Sonna-sjika, *Konk.*

Succus radicis cum pulvere dentis *Tigris*, dolorem ex morsu serpentum et scorpionum sedat, illorumque venenum tollit, fluxum sanguinis narium sistit, sanguinem ex casu vel iotu, in corpore coagulatum, attenuat et discutit.

KAL-PANA-MARAVARA.—*Rheede Hort. Mal.* XII. t. 16.

Alpam, *Konk.*

Adversus morbos chronicos, hecticos, tussim, dispuseam adhibetur cum *Para-Pana* et *Kaci-Velly-Panna*.

PANNAMARA-MARAVARA.—*Rheede Hort. Mal.* XII. t. 19.

Thola, *Konk.*

Cum saccharo in syrupum redacta, tussim, morbum endemium, omnia pulmonum vitia, dispuseam, morbum laiticum, phtysia curat.

THEKA-MARAVARA.—*Rheede Hort. Mal.* XII. t. 22.

Rou-kakely, *Konk.*

Planta cocta et in formam lotus adhibita, omnis generis catharros et gravedines sanat. In pulverem redacta et salse mixta Hydritides. Cum foliis *Cassia fistulæ* vel *connar*, *zingibere* et *Muria* supra ignem siccata et torrefacta, herpeti medetur, variolis, scabiei. Pulvis fractus cum stercore glirum circa inferiorem abdominis partem cum *melle oleo Nucis Indicæ* illitus, urinam brevi tempore promovet. Succus uoli auribus inditus, illarum apostemationem juvat, surditatemque accidentalem abigit.

TSJRRGU TSOKA MARAVARA—*Rheede Hort. Mal.* XII, t. 23.

Bonka-kely, *Kook.*

Sopor, odor, vires usus idem (t. 22.)

VALLI-VARA KODY-MARAVARA—*Rheede Hort. Mal.* XII, t. 30.

Gugano, *Kook.*

Folia cum illis *Aconitæ* calce trita in totum antipodagricum meli-
camentum faciunt, in formam cataplasmatæ redacta et applicata.

PURDI-PEDA—*Rheede Hort. Mal.* XII, t. 37.

Unguis pollicis dextri pedis, hujus plantule sacro illitus, cataractam
sinistri oculi depellere creditur, et vice versa.

TSJAMA-PULU—*Rheede Hort. Mal.* XII, t. 45.

In vaccino lacte levigata abscessus phlegmonodes disiecit: cum
Assa Fetida et *Zinzibere* in potumendam præparata tormina ventris mi-
tigat.

KATOU-TSOLAM—*Rheede Hort. Mal.* XII, t. 60.

Suaroka, *Kook.*

Fructus cum succo *Arcko* levigatus, aphtas infantum sanat, si nempe
lingua cum illo illinatur.

KATU-TSUREL—*Rheede Hort. Mal.* XII, t. 65.

Rama-vete, *Kook.*

Nucleus fractus siccatus et pulverisatus gemmæ oleo sanat.

PERIU-TSUREL—*Rheede Hort. Mal.* XII, t. 66.

Vodi vete, *Kook*: Rotas grandes, *Pact.*

Fructus in edulis solidentur.

TSJOLAP-PULLI—*Rheede Hort. Mal.* XII, t. 67.

Tota planta cum utriusque *Apocynæ* in linimentum collecto coarctis-
sima. Cæciliæ rotas. Folia cum aqua crassa trita ossium dolorem levi-

III. Sucus in variolis, si nempe febris adsit, adhibetur.

TSIERU—GOSMILETI—PULLA—*Rheede Hort. Mal.* XII. t. 68.

Óleo Nucis Indicæ mixto scabiem et impetiginem sanat.

NAIN—CANXA, *Rheede Hort. Mal.* XII. t. 73.

Piscocia, Kook.

Sucus per se sumptus, vel cum *alio* tritus, palmisq[ue] ena manuum, t[ame]n pedum inunctus, spasmo medetur: cum zinzibere levigatus temporibusq[ue] illitis, manib[us] hypochondriacisq[ue] confert. Flores cum *cautina sleyace* in lotura oryze trit[ur]ati, idem prestant. temporibus applicari.

TIRI—PAYXA—*Rheede Hort. Mal.* XII. t. 74.

Sucus ex foliis extracto aurium leniuntur dolores.



Classificação therapeutica das plantas mais uteis de Gôa e Sâvantvâdi

+ Este signal indica que as plantas não estão mencionadas nos autorizados
[opinas].

Devese notar que estão incluídas n'esta lista, um grupo separado, porém
delegas exóticas, úteis e interessantes, que se encontram nos bazares.

ADSTRINGENTES.

- + *Azadirachta indica*, *Kora*; *Wai*. — Casca e caule.
- Azoreum Calamus*, *Linn.*; *Vaikhond*. — Raiz (na diarrheia).
- Egle Marmelos*, *Cole*; *Bel*. — Fructa seminada.
- Astonia scholaris*, *Ber*; *Sâtavin*. — Casca.
- Amorodium occidentale*, *Linn.*; *Kaju*. — Casca.
- Arco Catechu*, *Linn.*; *Madi*, *Phuphi*. — Caule.
- + *Kathina racemosa*, *Lomb.*; *Âpelo*. — Casca.
- + *Bixa Orillena*, *Linn.*; *Kosari*, *Sinduri*. — Polpa em redor da semente.
- Colicus cruciatus*, *Baloch*; *Pansa-alambão*. — Fungo.
- Conium Malabaricum*, *DC.*; *Sântvata*. — Gomo.

- Bridelia retusa*, Spreng. ; Phátarphá].—Casca.
- Butea frondosa*, Roxb. ; Pa]as.—Gomma.
- Casalpinia Sappan*, Linn. ; Pátamg.—Lenbo.
- Calotropis gigantea*, R. Br. ; Rù].—Casca.
- Careya arborea*, Roxb. ; Kombyo.—Casca.
- Cocos nucifera*, Linn. ; Mada.—Casca e raiz.
- + *Cylista scariosa*, Ait. ; Râna-gevaço.—Ruiz.
- Diospyros embryopteris*, Pers. ; Tembiri.—Fructo.
- Elephantopus scaber*, Linn. ; Hathipáym.—Planta.
- Engenia Jambulana*, Lamk. ; Jambú].—Casca.
- + *Peronia elephantum*, Choix ; Koñvañ].—Fructo e gomma.
- Ficus religiosa*, Linn. ; Pimpô].—Casca da raiz.
- Flacourtia cataphracta*, Roxb. ; Jaggam.—Fructo, folhus e casca.
- Grewia microcos*, Linn. ; Sasali, Añsá].—Folhus tenues (na dyacueria chronica).
- Holarrhena antidysenterica*, Wall. ; Kudo, Dhavo kudo.—Casca.
- Jussiaea suffruticosa*, Linn. ; Káuaphùl, Panna.—Planta.
- + *Lagerstrœmia Indica*, Linn. ; Jose-marta.—Casca da raiz.

Lawsonia alba, *Link.* : Pádachi methi.—Folhas.

Lesou macrophylla, *Roxb.* : Diúdo, Gino.—Raiz.

Lesou sambucina, *Willd.* : Diúdi, Gino.—Raiz.

Mangifera Indica, *Lin.* : Aníbo.—Casca, gomma, folhas, fructo e amendoas da semente.

Melastoma Malabathricum, *Lin.* : Nákeri.—Folhas.

Menecydon edule, *Roxb.* : Sarani.—Folhas e raiz.

Mesua ferrea, *Lin.* : Vhadlo campo.—Casca.

Mimusops Elengi, *Lin.* : Vaníval.—Casca e fructo.

Naregamia alata, *W. & A.* : Timapúni, Pitamári.—Raiz (na dysenteria).

+ *Nyctanches arbor tristis*, *Lin.* : Párdik.—Casca.

Ochrocarpus longifolius, *B. & H.* : Suratúg.—Botões da flor.

Odina Wodier, *Roxb.* : Moy.—Casca.

Phyllanthus Emblica, *Lin.* : Anívali.—Casca e fructo.

Psidium Guayava, *Lin.* : Per.—Casca e folhas.

Pterocarpus Marzipannus, *Roxb.* : Póle ásaga.—Goramu.

+ *Punica granatum*, *Lin.* : Dálímbo.—Casca da fructo e casca.

Rhizophora ancerantus, *Link.* : Kanúdi.—Casca.

- Sonchus Indica*, *Linna.* : Âsoka.—Casca. (na menorrhagia.)
- Sesbania grandiflora*, *Presl.* : Aggâta.—Casca.
- Spondias mangifera*, *Willd.* : Ambâjo.—Casca e folhos.
- + *Symplocos Bosbonici*, *Clarke.* : Lolâr.—Casca.
- Tamarindus Indica*, *Linna.* : Chinch.—Casca.
- Tectona grandis*, *Linna.* : Sâilo.—Casca.
- Terminalia Belerica*, *Roxb.* : Gotinaga.—Polpa do fructo.
- .. *Chabula*, *Roxb.* : Haradi.—Fructo verde.
- + .. *tomentosa*, *Bodd.* : Mârâti, Asim, Ânga.—Casca.
- .. *paniculata*, *Bodd.* : Kichâj.—Flores.
- Tylophora asthmatica*, *H & A.* : Pita-vela.—Raiz (na dysenteria.)
- Woodfordia floribunda*, *Nelis.* : Dhavan.—Flores.
- Zizyphus Jujuba*, *Link.* : Bhora.—Casca.
- + .. *rugosa*, *Link.* : Chinnul.—Flores (na menorrhagia.)
-
- + *Quercus infectoria*, *Presl.* : Mâiphul.—Galbas.

ALTERANTES.

(Clas. Depurantes e alterantes.)

AMARGOS E TONICOS.

Acorus Calamus, Linn. ; Vaikunthi.—Raiz.

Andropogon paniculata, Voss. ; Kiriyachin, Vhadokan kiriyachin. —Planta

+ *Asteris tomentosus, Lessert.* ; Jāmūdi.—Semente.

Aristolochia Indica, Linn. ; Sāpta.—Raiz.

Azadirachta indica, Linn. ; Surpā, Māmapari.—Folhas.

+ *Calaca argentea, Linn.* ; Kūrdi.—Semente.

+ *Chrysanthemum cucumerium, Linn.* ; Sivanti.—Flores.

Cissampelos Pavina, Linn. ; Pijavēl.—Raiz.

+ *Citrus medica, Linn.* ; Marlaing.—Casca do limão.

Cleistanthus lanceus, Gaert. ; Cirita-mari.—Folhas.

Cleistanthus infortunatus, Gaert. ; Sūkili, Hivraingi.—Folhas.

Cocculus tibeticus, DC. ; Vasavēl.—Raiz.

+ *Coffea Arabica, Linn.* ; Kāphē.—Semente.

Cordia Myxa, *Linn.* : Quarema, *Schult.*—Casca.

+ *Kaythraea Roxburghii*, *G. Don.* : Lamtak.—Planta.

+ *Exacum bicolor*, *Roxb.* : Udikirayateñ.—Planta.

+ *Ficus hispida*, *Linn. f.* : Vhadali kharavanñ.—Casca.

Gloriosa superba, *Linn.* : Vagáchio dávallo.—Raiz.

Gmelina arborea, *Linn.* : Sivanni.—Raiz.

+ *Justicia procumbens*, *Linn.* : Ghási-pítapápaño.—Planta.

Luffa acutangula, *Roxb.* (var. *amara*) : Goñsáli Rám-goñsáli.—Planta.

+ *Melia dubia*, *Coe.* : Kaca, Kadù khájju.—Fructo.

Michelia Champaca, *Linn.* : Chihimpo.—Casca.

Rauwolfia serpentina, *Benth.* : Átaki.—Raiz.

Sida carpinifolia, *Linn.* : Tupakay.—Raiz.

Strychnos nux vomica, *Linn.* : Kajro.—Semene e follas.

Tinospora cordifolia, *Miers.* : Vhadli-amrit-vel, Amritvel.—Raiz e tallo.

Toddalia venkata, *Pearc.* : Borinñi.—Raiz.

+ *Ventilago Madagascariana*, *Gussl.* : Klantvel.—Casca da raiz.

+ *Wrightia tinctoria*, *Dr.* : Kalo-kidol.—Casca.

ANALEPTICOS

- Amorphophallus campanulatus*, *Blume* ; Suran.—Raiz
- Benincasa cerifera*, *Savi* ; Kinnváji.—Fructo.
- Cocos nucifera*, *Linn.* ; Mãça.—Oleo do fructo.
- Colocasia antiquorum*, *Schott* ; Alun.—Planta.
- Cleusine corocana*, *Gært.* ; Náchni.—Fecula da semente.
- + *Manihot utilisima*, *Pohl* ; Pãu de phãrã—Tapioca ou fecula da raiz.
- Musa sapientum*, *Linn.* ; Keli.—Bananas (de Moiri).
-
- + *Orchis latifolia*, *Linn.* ; (e outras especies), Sãlep.—Tuberculos.

ANALGESICOS.

(Vide Anodynes e Narcotics.)

ANODYNES, ANALGESICOS E NARCOTICOS.

- + *Argemone Mexicana*, *Linn.* ; Phirãlgi-ghãrãpã.—Sementes oleosas.
- Datura fastuosa*, *Linn.* ; Dhutãro.—Folhas e sementes.
- Hydrocotyle Asiatica*, *Linn.* ; Ekpãnt, Uãdã, Kãrãndã.—Folhas, etc.

grandes doses.

Cannabis Indica, *Linna.* : Bhurungi.—Summitades floridas e sua parte fructifera.

+ *Papaver somniferum*, *Linna.* : Khaskhas (semente), aphiasón.—Opio.

ANTHELMINTICOS OU VÈRMIFUGOS.

(a) **Contra lombrigas** (*Ascaris lumbricoides*).

Abouia scholeris, *B.* : Sântavin.—Casca.

Artemisia vulgaris, *Linna.* : Mampasari.—Folhas.

Bacca frondosa, *Reich.* : Paka.—Amendoas da semente.

+ *Carica papaya*, *Linna.* : Papaia.—Leite do fructo.

Cleodendron infortunatum, *Garcl.* : Kudavi, Sanyakjo.—Folhas.

Gynandropsis pentaphylla, *Dal.* : Tiloni.—Semente.

Holarrhena antidysenterica, *Wall.* : Dhavo Kudo, Kudv.—Semente.

Mangifera Indica, *Linna.* : Ambo.—Amendoas da semente.

+ *Melia dubia*, *Cor.* : Karo, Kadû-khajur.—Fructo.

Momordica charantia, *Linna.* : Kâreçá, Vhaduli Kâreçá.—Fructo e folhas.

Mucuna peruviana, *Dal.* : Khatkhûti.—Dolichos do fructo.

Sapiindus trifoliatas, *Linn.* : Kíngi, cínthi.—Fructo.

Veronica anthelmintica, *Willd.*—Kalcin jircin.—Semente.

(b) **Contra tenia ou solitaria** (*Tenia solium*).

Azox caracha, *Linn.* : Mañ, phophol.—Semente

— *Cucurbita Pepo*, *L.* : Bobliq.—Semente decorticada.

— *Kantelis ribes*, *Burm.* : Vayavaring.—Fructo.

Mallotus Philipponensis, *Moell. Arg.*—Beniss, Shendri, Kamou.— Pa glanduloso da superficie das capsulas.

— *Punica granatum*, *Linn.* : Dálmib.—Casca da raxa.

(c) **Contra ascarida vermicular** (*Oxyuris vermicularis*).

Mentha Viridis, *Linn.* : Oratchoiv.—Infusa das folhas em glyster.

ANTIABORTIVOS.

— *Viburnum carydota*, *Walt.* : Narvaloo—Baites.

Piper somiferum, *Linn.* : Khaskhoshcho (pá).—Opac.

ANTIBLENNORRHEICOS.

(1) Na gonorrhœa.

- + *Amaranthus spinosus*, *Linna.* : Kamçe-bhâjl.—Raiz.
- Boerhaavia repens*, *Linna.* : Panârnâvâ.—Raiz.
- + *Buchanania latifolia*, *Roxb.* : Châr, Chârolî.—Folhas.
- Cassytha filiformis*, *Linna.* : Medica-tali, Âkâsavêl.—Planta.
- + *Dalbergia volubilis*, *Roxb.* : Aloy.—Sumo da raiz.
- + *Hardwickia pinnata*, *Roxb.* : Jiran.—Oleo resina, obtido por incisões do tronco (em vez de copaiva).
- Holostemma Rheedii*, *Wall.* : Dudurli, Karâbphûl.—Raiz.
- Ixora coccinea*, *Linna.* : Padkâli.—Raiz.
- Lippia nodiflora*, *Rich.* : Âdâjî.—Planta.
- Michelia Champaca*, *Linna.* : Champo.—Flores.
- Ocimum gratissimum*, *Linna.* : Bhunyn-tûlî, Râna-tûlî.—Sumo das folhas.
- Plumeria acutifolia*, *Poir.* : Khair-champo.—Casca.
- + *Polianthes tuberosa*, *Linna.* : Gûla-sabû.—Raiz.
- Sida carpinifolia*, *Linna.* : Tupakati.—Raizes.

Tinospora Cardifolia, *Miers.* : Amarfavel.—Sumo do talo.

Zobonaria Umbellata, *Thecrites* : Goimtini. —Raiz.

(2) Na leucorrhœa

Cylista scariosa, *Ait.* : Râna-gevaço.—Raiz.

+ *Dosilaleonthus roseus*, *T. Anders.* : Râna-âboli.—Raiz.

+ *Flemingia tuberosa*, *Dolz.* : Biramojo.—Raizas.

Mnema jauriens, *DC.* : Khâtakhûitali.—Amendoas da semente.

+ *Piper cubeba*, *Linn. f.* : Kabab.—Bagas.

+ *Santalum album*, *Linn.* : Chamdan.—Oleo do pau.

(3) Na otorrhœa e otalgia

Alocasia Indica, *Schott.* : Mâdi-âjûm.—Sumo do peccolo.

Cardiospermum halicacabum, *Linn.* : Kanphûti.—Sumo da planta.

+ *Cleome viscosa*, *Linn.* : Kânaphûti, Tijomi.—Sumo das folhas.

Pandanus fascicularis, *Loftk.* : Bonvlaki.—Oleo das bracteis flores.

Vitis quadrangularis, *Wall.* : Mhoavel.—Sumo do tubo.

ANTIDARTROSOS E PARASITICIDOS.

(Para uso externo)

(1) Geraes.

Anacardium occidentale, *Linna.* : Khajál.—Oleo do pericarpio da noz.*Calophyllum inophyllum*, *Linna.* : Urdí.—Oleo.+ *Jatropha curcas*, *Linna.* : Jempó]. Gálanárg.—Oleo e succo latices.*Pongamia glabra*, *Vahl.* : Karáñj].—Oleo da semente.+ *Stenospermum xylocarpum*, *Wight.* : Kharsing.—Oleo obtido pela destillação do pan.*Thecospira papulnea*, *Corr.* : Blumáñ].—Leite viscoso do fructo.

(2) Especies.

(a) Nos carbunculos e furunculões.

+ *Garcinia Indica*, *Chois.* : Bluráñj].—Oleo do succo.*Heliotropium Indicum*, *Linna.* : Ájerá.—Folhas.*Ipomea qasareñú*, *Linna.* : São João vel.—Folhas.+ *Tricosanthos palmata*, *Reich.* : Kumbadal.—Raiz.

(b) Na campigera e picostase.

Carica papaya, *Linna.* : Papáy.—Leite do fructo.

Cassia fistula, *Linn.* : Bâio. — Sumo das folhas.

Cassia Sophia, *Linn.* : Alliphûli. — Semente e folhas, verdes.

Cassia Tora, *Linn.* : Taikija. — Sumo das folhas.

Euphorbia thymifolia, *Burm.* : Dûdini, Dûdandi. — Sumo leitoso.

Nymphaea arbor tristis, *Linn.* : Pâmûka. — Semente.

Rhumeanthus communis, *Nes.* : Dûdunîri. — Folhas e raiz.

Sarcocapnum cheloneoides, *Wight.* : Pûri, Kharsing. — Resa extrahida da arvore.

Nyris Indica, *Linn.* : Dûda-mârî. — Sumo das folhas.

(c) Na erysipela.

Acanthas ilicifolia, *Linn.* : Morâmûdi. — Raiz.

Acerthoa bilimbi, *Linn.* : Bilimbi. — Flores.

Capriem frutescens, *Linn.* : Mirsuing. — Folha.

Cosmosigma zeylanosma, *Wahl.* : Sûtakamûli. — Folha.

Portulaca oleracea, *Linn.* : Goli. — Sumo das folhas.

Portulaca quadrifida, *Linn.* : Bhûnîya goli. — Sumo das folhas.

(d) Fissuras na pele.

Eleo Bengalensis, *Linn.* : Vûj. — Sumo leitoso.

(e) Lepra.

Calatropis gigantea, *R. Br.* ; Rûi.—Succo leitoso, interna e externamente.

+ *Celastrus juncinata*, *Willd.* ; Kuingul Málahaingul.—Oleo da semente.

Hydrocotyle Asiatica, *Linn.* ; Karamô.—Folhas, interna e externamente.

+ *Nerium odorum*, *Solan.* ; Dhavi kanerci.—Raiz.

(f) Piolhos.

Avonia squamosa, *Linn.* ; Âtin.—Semente.

+ *Citrus acida*, *Roxb.* ; Lâmbi.—Sumo do fructo.

(g) Sarnas.

Hydrocarpus Wightiana, *Blume.* ; Kâsati, Kanvati.—Oleo da semente.

Lavsonia alba, *Lamb.* ; Methi, Padachi methi.—Folhas.

+ *Schleichera trijuga*, *Willd.* ; Kassiub.—Casca.

(h) Ulcerae chronicae

Azadirachta officinalis, *Linn.* ; Kândolu, Oepoti, Upûi.—Fructo verde.

+ *Argemone Mexicana*, *Linn.* ; Phiriungi dhuvare.—Succo leitoso.

(i) Vermes de Guine.

Acauthus ilicifolius, *Linn.* ; Morand.—Râiz.

Asamirta Cocculus, *W. & A.* : Kák-phal, Garumð-phal, Kodûphal.—Sumo das folhas.

Leea macrophylla, *Roxb.* : Dimço, Jino.—Raiz.

Moringa pterygosperma, *Gaert.* : Maisting, Mosing.—Casca.

Fraxia involucrata, *Lin.* : Pinta-khâthkhûthli.—Raiz.

(h) Vermes ordinarios nas feridas.

Anona squamosa, *Lin.* : Âtin.—Folhas.

Erythrina Indica, *Lamk.* : Pomgero.—Sumo das folhas verdes.

Ficus Bengalensis, *Lin.* : Vad.—Succo leitoso.

(i) Verrugas.

Euphorbia nerifolia, *Lin.* : Nivult. S Succo leitoso.

+ *Andira Anacola*, *Agriv.* : Goá-pândar, Pó de Bahis.—Pó que se encontra nas veias do lenho (na tuihu, eczema, &c.)

Vernonia anthelmintica *Willd.* : Kâleu jirein.—Semente (na leucoderma e psoríase).

ANTIDOTOS OU CONTRAVENENOS.

(a) Nas mordeduras de cobras venenosas em geral e nas de cobra de capello em especial.

Achyranthes aspera, *Lin.* : Âglado Kulte-magri.—Sumo das folhas (ext.)

- Aristolochia Indica*, *Linna.* : Sápús.—Raiz, interno e externamente.
- Benincasa cerifera*, *Savi.* : Kumvalo.—Fructo (em canja, como preventivo de haemorrhagia).
- Bragantia Wallichia*, *H. B.* : Apôniá.—Raiz.
- Chlartropis gigantea*, *Br.* : Rôí.—Casca da raiz.
- Clerodendron serratafa*, *Spreng.* : Donda-Sáilo, Bhâranugi.—Raiz, interna e externamente.
- Cosmostigma racemosum*, *Wight.* : Sítakamú.—Folhas.
- Euphorbia antiquorum*, *Willd.* : Páda-Nivúli, Tíva-dharemchem-nivalakamú.—Raiz interna e externamente.
- Euphorbia nerifolia*, *Willd.* : Nivalakamú.—Raiz, interna e externamente.
-
- + *Glycosmis pentaphylla*, *Cavaca.* : Megaki.—Pao, internamente.
- Kyllingia monocephala*, *Rottb.* : Nirviki.—Raiz, internamente.
- Limonia acidissima*, *Linna.* : Sít-rán-limbi, Ran-limbi.—Polpa do fructo, internamente.
- + *Murraya exotica*, *Linna.* : Paindayi.—Pao, usado como beugala para augmentar todas as cobras.
- Musa sapientum*, *Linna.* : Kéí.—Sumo do centro do tronco, como refrigerante e adstringente.
- + *Plumeria acutifolia*, *Poissol.* : Khura-champo.—Semente, internamente.

Rauwolfia serpentina, *Benth.*; *Ātaki*.—Raiz, interna e externamente.

+ *Strychnos colubrina*, *Linn.*; *Dhavo-kājro*, *Pañdari*.—Raiz e pro.
internamente.

+ *Tricosanthes palmata*, *Roxb.*; *Kamvadai*.—Fructo, internamente.

+ *Zingiber Cassmanan.* *Roxb.*; *Málabari-balaal*.—Raiz.

(b) Nas mordeduras de víboras.

Pogostemon parviflorus, *Benth.*; *Pañgalo*.—Raiz, interna e externa-
mente (na de *echis carinata* .)

+ *Raphidophora pertusa*, *Schoff.*; *Ganesa-vel*.—Planta interna e ex-
ternamente (na de *deboia Russellii*).

(c) Nas mordeduras de cães dançados.

+ *Cerbera odollam*, *Goertl.*; *Khāro uro*.—Semente, na hydrophobia.

Datura fastuosa, *Linn.*; *Dhāturo*.—Folhas, na hydrophobia.

Indigofera tinctoria, *Linn.*; *Nill*.—Planta, como prophylactic.

(d) Nas mordeduras de escorpídeos.

Moringa pterygosperma, *Goertl.*; *Mosiñig*.—Sumo das folhas.

(e) Nas mordeduras de centopéas

Mimusops elengi, *Linn.*; *Vanval*.—Flors.

(f) No envenenamento por arsenico

+ *Erem. lanata*, *Juss.* ; Tãndã].—Sumo da planta.

(g) No envenenamento por datura.

Oxalis corniculata, *Loos.* ; Ambuñi.—Sumo da planta.

(h) No envenenamento por opio.

+ *Celastrus paniculata*, *Willd.* ; Kañgani, Málakañgani.—Sumo das folhas.

+ *Coffea Arabica*, *Lin.* ; Kaphé.—Café.

ANTIPERIODICOS E FEBRIFUGOS.

Acorus Calamus, *Lin.* ; Vaikañd].—Raiz.

Alstonia scholaris, *Br.* ; Sãntaviñ].—Casca.

Andrographis paniculata, *Nees.* ; Kiráyatenu, vhadoleñ kiráyatenu.—Planta.

+ *Anthocephalus cadamba*, *Miq.* ; Niv.—Casca.

Aristolochia Indica, *Lin.* ; Sãpã].—Raiz.

Cephalandra Indica, *Nood.* ; Teñd].—Sumo das folhas e da raiz applicado externamente.

Clerodendron infortunatum, *Geert.* ; Bharangi.—Folhas.

+ *Ficus hispida*, *Lin. f.* ; Vhadoli kharavãñ].—Casca.

Gloriosa superba, *Lin.* ; Vãgãchyò dãvolyò.—Raiz.

Holarthra antidiysenterica, Wall. : Kudo.—Casca.

Hymenodictyon excelsum, Wall. : Daudeli.—Casca, nas febres terçanas.

Michelia champaca, Linn. : Champo.—Casca.

Oklolandia corymbosa, Linn. : Poripát.—Planta.

Pittosporum floribundum, W. & A. : Yakañi, vekañi.—Casca.

Piper nigrum, Linn. : Mir-vel.—Fructo.

Rauwolfia serpentina, Benth. : Ataki.—Raiz.

Strychnos nux-vomica, Linn. : Kájaro.—Semente e folhas.

Thevetia nerifolia, Juss. : Holadavi kaneri.—Casca de raiz.

Tinospora cordifolia, Miers. : Amritavel.—Talo.

Toddalia aculeata, Pers. : Borimti (Raiz de Lopes).—Casca de raiz.

Tricosanthes cucumerina, Linn. : Poulí, Ráua-pudával.—Planta.

Cesalpinia bonducella, Flam. : Gájri.—Semente.

Melia azadirachta, Linn. : Nimb.—Casca e folhas.

+ *Swerdia chirata*, Kam. : Kiráyatem.—Planta.

+ *Swerdia decussata*, Nees. : Klámáyatem.—Planta.

ANTISCORBUTICOS.

Averrhoa Bilimbi, *Linna.* : Bilimbí.—Fructo.

Averrhoa Caranbola, *Linna.* : Karanoj.—Fructo.

+ Citrus acida, *Roeb.* : Limbi.—Sumo do fructo.

+ Garcinia Indica, *Chois.* : Bhirand.—*Solans* do fructo.

+ Garcinia xanthochymus, *Horsk. f.* : Oñt.—*Solans* do fructo.

Mangifera Indica, *Linna.* : Ambo.—Fructo verde e *solans*.

Phyllanthus distichus, *Muell. Arg.* : Roj-âmvâli.—Fructo.

Phyllanthus emblica, *Linna.* : Ainvâli.—Fructo.

+ Raphanus sativus, *D.C.* : Mukk.—Raiz.

Spondias mangifera, *Willd.* : Âmbádo.—Fructo.

ANTISEPTICOS.

+ Adina cordifolia, *Horsk. f.* : Adû.—Casco.

+ Cardenia lucida, *Roeb.* : Nananât.—Rezina.

Crucifera Madraspatana, *Poir.* : Modâgorû.—Semente, mas ulceitas.

Limnophila guttiatoides, *Ber.* : Amboli.—Sumo, applicado nas feridas eruptivas de caracter maligno.

Mollugo stricta, *Linna.* : Jarási.—Planta, em banhos na variola.

Piper Bete, *Linna.* : Khámvachín pávár. —Folhas recentes.

ANTISPASMODICOS.

Acalypha Indica, *Linna.* : Moserasesade, Kupámeni.—Folhas.

Adathoda vasica, *Vass.* : Áchaso.—Folhas e raiz.

Anamirta Cocculus, *W. & A.* : Kolúphal.—O principio activo-picroto-sina.

Andropogon citratus, *D.C.* : Gamjun, Pathichicháva.—Folhas.

Artemisia vulgaris, *Linna.* : (var. *Indica*) : Mána parari.—Folhas.

Datura fastuosa, *Linna.* : Dhutaro.—Folhas e semente.

+ *Euphorbia pilulifera*, *Linna.* : Dudurii.—Planta.

+ *Gardenia Incida*, *Roeb.* : Nanamí, Dekamáli.—Gomma-resina.

Garuga pinnata, *Roeb.* : Kunák.—Sumo das folhas.

Grangea Maderaspatana, *Poir.* : Modágoró.—Planta.

Indigofera tinctoria, *Linna.* : Nili.—Anil.

+ *Lobelia nicotinafolia*, *Hegue.* : Bokanaí.—Folhas.

Ocimum basilicum, *Linna.* : Saláje, Bhuníya-ámbi.—Planta.

+ *Opuntia Dillenii*, *Haw.* : Nágu-nival.—Fructo.

+ *Tricosanthes palmata*, Roxb. ; Kainvadal.—Casca do fructo secco, fumado como tabaco na asthma.

Viburnum fœtidum, Wall. ; Narvela.—Folhas, na dysmenorrhœa.

Cannabis sativa, Linn. ; Bhangî.—Saumidades floridas e em parte fructíferas.

+ *Ferrula alliscia*, Boiss. ; Hing.—Assafetida.

+ *Nicotiana tabacum*, Linn. ; Pân.—Tabaco.

Papaver somniferum, Linn. ; Khasakbas (semente).—Opio.

ANTISYPHILITICOS.

Calotropis gigantea, R. Br. ; Rai.—Succo leitoso, internamente.

Hemidesmus Indicus, R. ; Upársali.—Raiz.

Hydrocotyle Asiatica, Linn. ; Ekpâni, Umîri, Karnûdo.—Planta.

Smilax Zeylanica, Linn. ; Kariipi, Kavala-kamti.—Raiz.

APHRODISIACOS.

Asparagus racemosus, Willd. ; Sasara-mûli.—Raiz.

Hygrophyla spinosa, P. Anders. ; Kalaso, Kalasûndô.—Semente.

Iponoea digitata, *Lin.*; Kûmváli, Bhumya-kumválo.—Raiz.

Mucuna pruriens, *D.C.*; Khátakhúfali.—Semente

+ *Stereospermum suaveolens*, *D.C.*; Kúsgo.—Flores.

Strychnos nux vomica, *Lin.*; Kájro.—Folhas e semente.

+ *Trigonella Frenum-graecum*, *Lin.*; Methi.—Semente.

CARDIACOS.

+ *Cereus pentagonus*, *D.C.*; Phiringi niválakanitem. — Tronco e flores.

Coffea Arabica, *Lin.*; Káphe.—Caffeina.

Strychnos nux vomica, *Lin.*; Kájro.—Folhas e semente.

CARMINATIVOS E ESTOMACHICOS.

Acorus Calamus, *Lin.*; Veyakhamd.—Raiz.

+ *Allium cepa*, *Lin.*; Kamdo.—Raiz.

+ *Allium sativum*, *Lin.*; Losún.—Raiz.

+ *Alpinia galanga*, *Sw.*; Kúlimjan.—Raiz.

Andropogon citratus, *D. C.*; Gamjan, Páthlehi-cháva.—Oleo.

Anisochilus carnosus, *Wall.*; Sujaro-ortelámbva.—Folhas.

- Anisomeles Malabarica, *Br.* ; Kák-tumbo.—Folhas.
- Artemisia vulgaris, *Linna.* ; Mánspatari.—Folhas.
- Chrysanthemum Indicum, *Linna.* ; Râya-sivanti.—Flores.
- Cinnamomum iners, *Reinw.* ; Tamala-patrara.—Folhas.
- + Coleus aromaticus, *Benth.* ; Koramojo.—Folhas.
- + Coriandrum sativum, *Linna.* ; Kanphir.—Fructo.
- Curcuma aromatica, *Salisb.* ; Râna-halad, Ambe-halad.—Raiz.
- Curcuma longa, *Linna.* ; Alad.—Açafrão da Índia.
- Curcuma zedoaria, *Rosc.* ; Akúa.—Raiz.
- Elettaria cardamomum, *Maton.* ; Elú, Karadamaiva.—Cardamomo.
- Feronia elephantum, *Correa.* ; Kaiivarit.—Fructo maduro e folhas.
- + Foeniculum vulgare, *Goertl.* ; Fünch.—Fructo.
- + Mentha sylvestris, *Linna.* ; Oratelâiva.—Folhas.
- Mukia scabrella, *Arn.* ; Devâstovosini.
- Murraya Koenigii, *Spreng.* ; Kadi-nimba.—Folhas.
- + Origanum marjorana, *Linna.* ; Mijirikâiva.—Folhas.
- + Peucedaneum graveolens, *Benth.* ; Sepo.—Fructo

Piper Betle, *Lin.* : Khâmvaumchih-pânâm.—Folhas

Piper nigrum, *Lin.* : Mirvel.—Fructo.

+ Trigonella Fœnum-grœcum, *Lin.* : Methi.—Semente.

Zanthoxylum Rhetsa, *D. C.* : Tiraphaj, Timpli, Agadini, Tipali.—Fructo e casca.

+ Zingiber Casuinar, *Rarb.* : Málabári-halaç.—Raiz.

Zingiber officinale, *Roscoe.* : Alein.—Raiz.

Zingiber Zerumbet, *Roscoe.* : Kolinjana, Râna-alem.—Raiz.

+ Caryophyllus aromaticus, *Lin.* : Kâlâphûr.—Cravo da India.

+ Cinnamomum Zeylanicum, *Brega.* : Tiki.—Canella.

+ Myristica fragrans, *Houtt.* : Jâyaphaj.—Amendoa da semente.

CHOLAGOGOS.

(*Vide* Depurantes e alterantes ; e Purgantes e laxantes).

+ Cosmoptigma racemosum, *Weight.* : Ghârâphûli.—Casca da Raiz.

CONTRA VENENOS.

(*Vide* Antidotos ou contravenenos).

DEMULCENTES.

(Vide Emollientes e demulcentes).

DENTIFRICIOS.

Areca Catechu, *Linna.* ; Mãdi, Phophol.—Pó ou cinzas da semente.

Anacardium occidentale, *Linna.* ; Kaju.—Folhas recentes.

+ Jatropha Curcas, *Linna.* ; Jempál, Galânarag.—Raminhos recentes.

Mangifera Indica, *Linna.* ; Âmbo.—Folhas e raminhos recentes.

DEPURANTES E ALTERANTES.

Amorphophulus campanulatus, *Blume.* ; Sírara.—Raiz, nas haemorrhoidas

+ Argemone Mexicana, *Linna.* ; Phiringi dbutaro.—Succo leitoso.

Aspidium parasiticum, *Willd.* ; Mãhã-pânãm, kali-pândau.—Raiz, nas chronicas febres palustres.

Benincasa verifera, *Savi.* ; Kunvâlô.—Fructo, no diabetes, phthisica e mordeduras de cobras.

Calotropis gigantes, *R. Br.* ; Rûi.—Succo leitoso e raiz.

+ Casearea esculenta, *Roxb.* ; Sâtágân.—Raiz, nã diabetes e obstrucções do figado.

Cassytha filiformis, *Linna.* ; Âkásavel, Medica-tali.—Planta, nas haemorrhoidas.

+ *Celastrus paniculata*, Willd. ; Kamgani, Mal-kamgani.—Oleo da semente, na paralysis e rheumatismo.

Cephalandra Indica, Naud. ; Temdli.—Raiz no diabetes.

Cocculus villosus, D. C. ; Vasagavel.—Raiz.

Costus speciosus, Smith. ; Pombno.—Raiz.

+ *Crateva religiosa*, Forst. ; Nûravel.—Sumo das folhas, internamente, no rheumatismo.

+ *Croton oblongifolia*, Roxb. ; Ghanasuraing.—Casca, nas obstrucções do figado e nas chronicas febres palustres.

Dalbergia sympatheticum, Niessne. ; Katikamto, chimchono, titaboli.—Folhas.

Eclipta alba, Hassk. ; Mâho.—Herva, nas obstrucções do figado e do laço.

Emilia sonchifolia, D. C. ; Umdiram pânâm.—Planta, nas obstrucções do figado.

Eugenia jambolana Lamk. ; Jâmbûl.—Semente, no diabetes.

Euphorbia antiquorum, Willd. ; Tina-dhârechem-nivala-kamçem.—Raiz.

+ *Ficus glomerata*, Roxb. ; Rumbad.—Succo aquoso da arvore.

Hemidesmus Indicus, Br. ; Uparsâli.—Raiz.

+ *Hydrocarpus Wightiana*, Blume. ; Kâsatî, kodu-hamvâli.—Oleo.

Hydrocotyle Asiatica, Linn. ; Karumdo, Ekpâni, Umdri.—Folhas

Launea pinnatifida, Cass. ; Almiro.—Raiz, nas obstrucções do figado.

+ *Lactuca Heyneana*, D. C. ; Uñdaráche-kán.—Planta.

Piper nigrum, Lam. ; Mirvel.—Fructo, nas hæmorrhoidas.

Smilax Zeylanica, Linn. ; Karápi, Kavala-kañti.—Raiz.

Sphærantus Indicus, Linn. ; Múndi.—Casca, nas hæmorrhoidas.

+ *Tagetes erecta*, Linn. ; Rojt.—Flores.

Vitis Indica, Linn. ; Rân-dák.—Raiz.

Zehneria umbellata, Thwaites. ; Goimtini.—Planta.

DETERGENTES.

Acacia concinna D. C. ; Síkekai.—Vagens.

Cocos nucifera, Linn. ; Máç.—Sumo leitoso do fructo.

Sapindus trifoliatus, Linn. ; Ringi, Rintti.—Fructo.

+ *Trigonella Fœnum-græcum*, Linn. ; Methi.—Pó da semente.

DIAPHORETICOS OU SUDORIFICOS.

Abutilon Indicum, G. Don. ; Petari, Vhadji petari, Tapuculo.—Folhas, em banhos.

Andropogon-citratum, D. C. ; Ganjan, Pathichi-cháv.—Folhas.

- + *Andropogon muricatus*, *Retz.*; Vãlerũm.—Raiz.
- Anisochilus carnosus*, *Wall.*; Sujro-hortelãnuva.—Folhas.
- Anisomeles Malabarica*, *Br.*; Kãk-tũbo.—Folhas.
- Calotropis gigantea*, *R. Br.*; Rãi.—Casca da raiz.
- + *Celastrus paniculata*, *Willd.*; Kaĩngani, Mãla-kaĩngani.—Oleo da semente.
- + *Crinum Asiaticum*, *Linna.*; Nãga-dauna.—Raiz
- Hemidesmus Indicus*, *Br.*; Uparsãli.—Raiz
- Leucus aspera*, *Spreng.*; Tũbo.—Planta.
- Leucus linifolia*, *Spreng.*; Tũbo.—Planta.
- Ocimum basilicum*, *Linna.*; Sabaji, Bhumya-talsi.—Semente.
- Ocimum sanctum*, *Linna.*; Talsi.—Raiz.
- Oldelandia corymbosa*, *Linna.*; Parapato.—Planta, nos sarampos.
- Oroxylum Indicum*, *Vent.*; Phalaphaço. Domvadak.—Casca, nas bevi-gas.
- Plumbago Zeylanica*, *Linna.*; Dhavo-chitrak.—Casca da raiz.
- Tylophora asthmatica*, *Wight.*; Pitavel.—Folhas
- Vitex negundo*, *Linna.*; Liĩgũd.—Folhas em bauchos e casca da raiz e sumo das folhas, internamente.

Zingiber officinale, *Broc.* ; Âlem.—Raiz seccada (svânt).

DIGESTIVOS.

+ Carica papaya, *Linna.* ; Popáya.—Sacco leitoso do fructo semimaduro.

DISCUTIENTES E RESOLVENTES.

Acorus Calamus, *Linna.* ; Veyakhamda.—Raiz.

Aristolochia Indica, *Linna.* ; Maserasesade, Sápús.—Raiz.

Calotropis gigantea, *R. Br.* ; Rúi.—Succo leitoso.

Cosmostigma racemosum, *Wight.* ; Maroi, Ghârúphúli.—Folhas, mas cysipelas.

+ Croton oblongifolius, *Rorb.* ; Ghanasraung.—Casca.

+ Curcuma aromatica, *Sabib.* ; Rána-halaç.—Raiz.

Curcuma longa *Linna.* ; Alaç.—Raiz.

+ Dæmia extensa, *Br.* ; Utarant.—Sumo das folhas, no rheumatismo.

Ficus retusa, *Linna.* ; Naindrúka.—Folhas, em fomentações.

Hemidesmus Indicus, *Br.* ; Uparsálf.—Raiz.

+ Kæmpferia rotunda, *Linna.* ; Bhushya-champo.—Raiz.

Lincaea linifolia, Spreng. ; Tumbo.—Folhas, em fomentações.

Piper nigrum, Linn. ; Mirvel.—Fructo.

+ *Plumeria acutifolia*, Poir. ; Khair-champo.—Casca.

Sapindus trifoliatus, Linn. ; Rimgi, Rintí.—Folhas verdes, em fomentações nas torsiões &c.

+ *Synentherias sylvatica*, Schott. ; Ujarmut.—Semente.

Vitex negundo, Linn. ; Limguç.—Folhas, em fomentações.

DIURECTICOS.

+ *Abutilon Asiaticum*, G. Don. ; Seyalámvachi-petari.—Folhas, flores e semente.

Abutilon Indicum, G. Don. ; Petari, vbadji petári, Tapucado.—Folhas e semente

Achyranthes aspera, Linn. ; Ághádo.—Planta.

+ *Fra lanata*, Juss. ; Támdaço.—Raiz, na lithiase.

Anacardium occidentale, Linn. ; Kajh.—Espirito.

Boerhaavia repens, Linn. ; Púarnavá.—Raiz e folhas.

+ *Capparis spinosa*, Linn. ; Kabar.—Casca da raiz.

Cissampelos pareira, Linn. ; Paçável.—Raiz.

+ *Clitoria Ternatea*, Linn. ; Supall.—Casca da raiz.

- + *Coffea Arabica*, *Linn.* ; Kaphe.—Caffeina.
- Cynodon dactylon*, *Pers.* ; Hariyali.—Planta.
- Hibiscus esculentus*, *Linn.* ; Bheindo.—Fructo verde.
- Hygrophila spinosa*, *T. Anders.* ; Koláso; Kalasindo.—Planta.
- Ipomæa biloba*, *Porsch.* ; Bangad-váñ Maryáda-vel.—Sumo das folhas.
- Michelia Champaca*, *Linn.* ; Champo.—Flores.
- Moringa pterygosperma*, *Gaert.* ; Mosinga.—Sumo da raiz.
- Pavetta Indica*, *Linn.* ; Cita-mataki.—Folhas.
- Phyllanthus niruri*, *Linn.* ; Buyáu-amválo.—Planta.
- + *Phyllanthus urinaria*, *Linn.* ; Bhúmya-amváli.—Planta.
- Sida carpinifolia*, *Linn.* ; Tupakáti.—Raizes.
- Solanum Indicum*, *Linn.* ; Simsarati.—Raiz.
- + *Solanum xanthocarpum*, *Schrad & Wendl.*—Kamte-vayaingini.—Folhas.
- Tectona grandis*, *Linn. f.* ; Sáilo.—Flores e semente.
- + *Urginea Indica*, *Kunth.* ; Kala-kaíndo.—Raiz.
- Zanthoxylum rhetsa*, *D. C.* ; Tiraphaí.—Casca da raiz.

EMETICOS E EMETO-CATHARTICOS.

Acalypha Indica, *Linna.*; (Kupámeqi) Musurusade.—Planta.

Acorns Calamus, *Linna.*; Veyakhañd.—Raiz.

Alangium Lamarckii, *Thwaites*; Aingolám.—Casca.

+ *Argemone Mexicana*, *Linna.*; Phiriñgi-dhutaró.—Sucoo leitoso.

+ *Asclepias curassavica*, *Linna.*; Kúráki.—Raiz.

Barringtonia acutangula, *Gaert.*; Geñdú-sadaphali, Goemcheñ sadapha], Ingli.—Semente.

Boerhaavia repens, *Linna.*; Püñagnává.—Raiz.

Brassica juncea, *Hook. f. & Thomp.*; Sañsavel.—Semente.

Calotropis gigantea, *Br.*; Rúi.—Casca da raiz e flores.

Cardiospermum Halicacabum, *Linna.*; Kánaphuti.—Raiz.

Crinum Asiaticum, *Linna.*; Nágadáñ.—Raiz.

+ *Daemia extensa*, *Br.*; Utarani.—Raiz.

+ *ecca volubilis*, *Benth.*; Belokákusini, Ambari.—Raiz.

Dripta alba, *Hassk.*; Máho.—Raiz.

EdEntada scandens, *Benth.*; Garay], Garadúl.—Semente.

Euphorbia tirucalli, *Linna.*; Portúgál]-nivull.—Sucoo leitoso.

- + *Ficus hispida*, *Linnaeus*. f. ; Vhađoll kharavañt.—Caeca.
- Justicia gendarussa*, *Linnaeus*. f. ; Kájo-udulaso.—Sumo da planta.
- Luffa acutangula*, *Roxburgh*. (var. *amara*) ; Gómsáli (*sylvestre*).—Fructo.
- Momordica charantia*, *Linnaeus*. ; Káreti.—Sumo das folhas.
- Moringa pterygosperma*, *Gaertner*. ; Mosing.—Sumo das folhas.
- Naregamia alata*, *Willdenow*. & *Albrecht*. ; Tinpáni, Pitamári.—Raiz.
- + *Randia dumetorum*, *Lamourouze*. ; Gejo.—Fructo.
- Tylophora asthmatica*, *Willdenow*. & *Albrecht*. ; Pita-vel.—Raiz e folhas.
- + *Urginea Indica*, *Kunth*. ; Kalakándo.—Raiz.

EMMENAGOGOS.

- + *Abroma augusta*, *Linnaeus*. ; Olak-tambol.—Raiz, na dysmenorrhœa.
- + *Achillea millefolium*, *Linnaeus*. ; Rojamári.—Folhas e flores.
- Acorus Calamus*, *Linnaeus*. ; Veyakhámj.—Raiz.
- + *Aloe vera*, *Linnaeus*. ; Kumtekúmvar.—Succo concreto.
- Aristolochia Indica*, *Linnaeus*. ; Sápús.—Raiz.
- Bromelia ananas*, *Willdenow*. ; Anáñas.—Fructo semimaduro.
- Cardiospermum halicacabum*, *Linnaeus*. ; Kánaphúti.—Folhas.

Caesalpinia pulcherrina, Swartz. ; Kombi.—Casca e folhas.

+ *Caricacarpaya*, Linn. ; Popaya.—Leite do fructo.

Gossypium arboreum, Linn. ; Kâpsini.—Raiz.

Michelia champaca, Linn. ; Champo.—Raiz.

Moringa pterygosperma, Gaert. ; Mosinga.—Casca.

Plumbago rosea, Linn. ; Tambido-Chitarâk.—Raiz.

Polypodium quercifolium Spr. ; Kâdekû.—Folhas.

+ *Rhizoglyphis graveolens*, Linn. ; Ârûd.—Herva.

+ *Trianthema monogyne*, Linn. ; Khapar.—Raiz.

EMOLLIENTES E DEMULCENTES.

Abrus precatorius, Linn. ; Gûnjî.—Folhas, na rouquidão.

Abutilon Indicum, G. Don. ; Petârî.—Semente e folhas, em banhos.

Acanthus ilicifolius, Linn. ; Morâmbo.—Folhas e raiz.

Adenanthera pavonina, Linn. ; Vhadoli guñz.—Semente applicada externamente.

+ *Aloe vera*, Linn. ; Kamtekumvar.—Folhas applicadas externamente.

+ *Amaranthus spinosus*, Linn. ; Kamte-bhâgi.—Raiz.

- + *Bryophyllum calycinum*, *Salisb.* ; Phomtchim pânâm.—Folhas, nas feridas, ulceras etc.
- + *Clitorea Ternatea*, *Linn.* ; Súpali.—Raiz.
- Cocos nucifera*, *Linn.* ; Mâd.—Oleo, ap. ext.
- Commelina Bengalensis*, *Linn.* ; Kamchat.—Raiz.
- Curculigo orchioides*, *Gaert.* ; Masûlakâmbo.—Raiz.
- Dregea volubilis*, *Benth.* ; Belokâkusini, Ambari.—Folhas nos furunculos, ap. ext.
- Elephantopus scaber*, *Linn.* ; Hathipañya, Gâyajib.—Raiz e folhas.
- + *Garcinia Indica*, *Chois.* ; Bhiramâ.—Oleo, nas ulceras.
- + *Grewia tiliofolia*, *Vahl.* ; Dhaman.—Casca.
- Helicteres Isora*, *Linn.* ; Tanini, Kimvan.—Casca da raiz.
- + *Hibiscus esculentus*, *Linn.* ; Bheindo.—Fructo verde.
- Hibiscus sabdariffa*, *Linn.* ; Tamadi ambadi.—Planta.
- Limnusa usitatissimum*, *Linn.* ; Limjâs, Soqbiyam.—Semente.
- Ocimum gratissimum*, *Linn.* ; Rân-tulsi.—Sumo das folhas
- + *Oryza sativa*, *Linn.* ; Bhât.—Semente, em pó (ap. ext.) ou canja
- + *Oxalis corniculata*, *Vahl.* ; Ambati.—Planta.
- + *Pistia stratiotes*, *Linn.* ; Jelo.—Planta.

Sacharam officinarum, Linn.; Us.—Assucar.

Sesamum Indicum, D. C.; Davo-Til.—Oleo da semente, ap. ext.

Sida carpinifolia, Linn.; Tupakâti,—Raiz.

Sida humilis, Willd.; Bhumya-tupakâti.—Raiz.

Sida Mysorensis, W. & A.; Dhâkâti-tupokti.—Raizes e folhas.

Sida rhombifolia, Linn.; Tupkâti.—Raizes.

Spondias mangifera, Willd.; Âmbâçô.—Gomma.

+ *Sterculea urens, Roxb.*; Pamdarûk.—Gomma.

+ *Trichodesma Indicum, Br.*; Jiingi.—Herva.

+ *Glycyrrhiza glabra, Linn.*; Godejaveri.—Raiz.

+ *Plantago ovata, Forsk.* Isphagu.—Semente.

ESTIMULANTES.

+ *Albizzia Lebbeck, Sims.*—Oleo da semente, na paralysis, ap. ext.

+ *Alpinia galanga, Sw.*; Kutimjan.—Raiz.

Anacardium occidentale, Linn.; Kâjû.—Espirito.

Andropogon citratus, D. C.; Gamjan, Pâthichichavâ.—Oleo.

- Areca catechu*, *Linn.*; Mâđi, Phophol.—Semente fresca.
- Calophyllum inophyllum*, *Linn.*; Uuđi.—Oleo da semente, ap. ext. no
rheumatismo.
- Capsicum frutescens*, *Linn.*; Mirsâng.—Fructo.
- Celastrus paniculata*, *Willd.*; Kâmgani, Mâlokâmgani.—Oleo da se-
mente, para augmentar a intelligencia e memoria; ext. no rheuma-
tismo.
- + *Coffea Arabica*, *Linn.*; Kâphl.—Semente.
- Piper Betle*, *Linn.*; Khañvachiñ—pânâm.—Folhas frescas.
- Piper nigrum*, *Linn.*; Mirvel.—Fructo.
- Plumbago rosea*, *Linn.*; Tâmbađi chitrak, chitarak.—Raiz.
- Plumbago Zeylanica*, *Linn.*; Dhovi chitrak.—Raiz.
- + *Schleicheria trijuga*, *Willd.*; Kasim̃b.—Oleo da semente, para promo-
ver o crescimento do cabello, ap. ext.
- Strychnos nux-vomica*, *Linn.*; Kâjro.—Semente, na paralysis.
- Toddalia aculeata*, *Linn.*; Limbâdi, Borimti—Casca da raiz.

ESTOMACHICOS

(V. Carminativos e estomachicos)

EXPECTORANTES.

Asiopyba Indica, *Linna.*; Maserasessede, Manjara-sejari.—Planta.

Adhatoda vasica, *Nees*; Âdâso.—Folhas e flores.

+ *Adiantum lunulatum*, *Spreng.*; Godepâlâm.—Folhas.

Anisochilos carnosus, *Wall.*; Sujro-hortelaiva.—Folhas.

Barleria prionites, *Linna.*; Gomtâá.—Casca.

Boerhaavia repens, *Linna.*; Punaranâvá.—Raiz.

+ *Clitorea Ternatea*, *Linna.*; Supali.—Sumo da raiz.

+ *Crinum Asiaticum*, *Linna.*; Nâgadânn.—Raiz.

+ *Damia extensa*, *Utrangi*.—Folhas.

Ocimum basilicum, *Linna.*; Sabaji,-Bhumya-tulsi.—Folhas.

Ocimum sanctum. *Linna.*; Tulsi.—Folhas.

Lencas linifolia, *Spreng.*; Tunbo.—Folhas.

Naregamia alata, *W. & A.* Tinapani, Pitamâri.—Raiz.

+ *Sesbania grandiflora*, *Pers.*; Âgâsto.—Sumo da raiz.

Tylophora asthmatica, *W. & A.*; Pitavel.—Raiz e folhas.

+ *Urginea Indica*, *Kunth.*; Kala-kaïndo.—Raiz.

+ *Vites auriculata*, *Roxb.*; Puncha-pânâñchi-sarabari-vel. —Raiz. etc.

pneumonia.

FEBRIFUGOS.

(V, Antiperiodicos e febrifugos).

LACTIFUGOS.

+ *Cyperus rotundus*, *Linna.*; Barika-lovo.—Raiz, applicada externamente.

Jasminium sambac, *Ait.*; Mogari.—Flores.

Piper Betle, *Linna.*; Khaiivachiin-páuâm.—Folhas recentes.

LACTIGOGOS.

+ *Jatropha Curcas*, *Linna.*; Jempâ] Galamarg. Erônd.—Folhas applicadas externamente.

Gossypium arboreum, *Linna.*; Kâpsin.—Semente.

Ricinus communis, *Linna.*; Eranda.—Folhas applicadas externamente.

MIDRIATICOS.

Datura fastosa, *Linna.*; Dûtro. Dhutaro.—Sumo das folhas: + daturina.

NARCOTICOS.

(V. Anodynos e narcoticos).

ODONTALGICOS E SIALOGOGOS.

Achyranthes aspera, *Lin.* : Âghâdo.—Sumo da planta.+ *Chrysanthemum Indicum*, *Lin.* : Râya-sivoñti.—Raiz.*Cocos nucifera*, *Lin.* : Mâd.—Oleo empyrenmatico extrahido da casca do coco.*Datura fastuosa*, *Lin.* : Dûtro.—Semente feita em uma pilula ap. top. (anodyno).*Ficus Bengalensis*, *Lin.* : Vhad.—Suco leitoso. (só odontalgico).*Plumbago rosea*, *Lin.* : Tambođi chitrak. Chitarak.—Raiz.*Plumbago Zeylanica*, *Lin.* : Dhovi chitrak.—Raiz.+ *Spilanthes Acmella*, *Lin.* : Pijalako.—Flores.+ *Synantheria sylvatica*, *Schott.* : Ujo-mit.—Semente.*Tubermonstana coronaria*, *Ber.* : Vallo-Nandîu, Nandîit.—Raiz.

PARASITICIDAS.

(V. Antidartrosos e parasiticidas).

PURGANTES E LAXANTES.

- Acalypha Indica*, *Linna.* ; Mesaresesande, Mañjara-erjari.—Planta.
- Egle Marmelos*, *Corr.* ; Bel.—Xarope do fructo.
- + *Allamanda cathartica*, *Linna.* ; Bothe.—Casca.
- + *Aloe vera*, *Linna.* ; Kamtekuñvar.—Sumo seccado.
- + *Argemone Mexicana*, *Linna.* ; Phiringi dhutaro.—Oleo da semente.
- + *Baliospermum axillare*, *Blume* ; Búkatúmbó.—Raiz, semente e oleo.
- Bryonia laciniosa*, *Linna.* ; Kasuñdali.—Planta.
- + *Cassarea esculenta*, *Roxb.* ; Sâtágân.—Raiz, nas inflamações crónicas do figado.
- Cassia Fistula*, *Linna.* ; Bâio.—Polpa do fructo.
- + *Cassia occidentalis*, *Linna.* ; Vhadolo tahakilo.—Semente.
- Cassia Sophera*, *Linna.* ; Âlaphûlî.—Semente.
- Citorea Ternatea*, *Linna.* ; Sûpallî.—Semente.
- Cordea Myna*, *Linna.* ; Quarena, Selañi.—Polpa do fructo.
- Oroton oblongifolium*, *Roxb.* ; Ghanasurang.—Casca da raiz.
- Cucumis trigonus*, *Roxb.* ; Kaçavi-tovosini.—Fructo.
- Eclipta alba*, *Kassk.* ; Mako.—Raiz.
- Euphorbia tiricalli*, *Linna.* ; Portugâlî-nivullî.—Succo leitoso.

- Euphorbia nerifolia*, *Linna.*; Nivuli-kamteñ.—Succo leitoso.
- Excecaria* Agallocha, *Linna.*; Kháro uro.—Succo leitoso.
- + *Ipomoea hederacea*, *Jaq.*; Nila-pusapi.—Resina extrahida, semente.
- + *Jatropha Curcas*, *Linna.*; Jempál, Galamarg, Eroind.—Semente e oleo da semente.
- Luffa acutangula*, *Roxb.* (var. amara); Gomsáll. (sylvestre).—Fructo.
- Momordica dioica*, *Roxb.*; Pháglini.—Raiz.
- Mussaenda frondosa*, *Linna.*; Kiráblí.—Raiz na ictericia.
- + *Plumeria acutifolia*, *Paer.*; Khair champo.—Casca.
- Polygonum glabrum*, *Willd.*; Tãmbdi-simsori-tonda, Sisori.—Raiz.
- Ricinus communis*, *Linna.*; Eraiña, Vhadolo eroind.—Oleo da semente.
- + *Rosa Damascena*, *Milles*; Roj-do-pers.—Butões seccados.
- Tamarindus Indica*, *Linna.*; Chimch.—Polpa do fructo.
- + *Terminalia chebula*, *Retz.*; Haradí.—Fructo maduro, seccado.
- Tricosanthes cucumerina*, *Linna.*; Pouli, Bana-páavel.—Fructo e raiz.
- „ *nervifolia*, *Linna.*; Goimti.—Fructo verde e raiz.

REFRIGERANTES.

(a) Internos.

Averrhoa bilimbi, *Lin.* : Bilimbi —Fructo.

Averrhoa carambola, *Lin.* : Karamalañ.—Fructo.

+ *Citrus acida*, *Roxb.* : Limbi.—Sumo do fructo.

Cocos nucifera, *Lin.* : Mád.—Agoa do coco.

+ *Garcinia Indica*, *Chois.* : Bhirañd.—Xarope do fructo.

Mangifera Indica, *Lin.* : Âmbo.—Fructo verde.

Phyllanthus distichus, *Muell. Arg.* : Roj-amvãli.—Fructo.

Phyllanthus emblica, *Lin.* : Amvãli.—Xarope do fructo.

+ *Punica granatum*, *Lin.* : Dãlimb.—Fructo.

(b) Externos.

Aloe vera, *Lin.* : Kañtekuñvar.—Folhas.

Bryophyllum calycinum, *Satisb.* : Phomtachim-pãnañ.—Folhas.

+ *Cocculus villosus*, *D. C.* : Vasapavel.—Folhas.

Hydrocotyle Asiatica, *Lin.* : Ekpãni, Umdri, Kerumdo.—Folhas.

+ *Musa sapientum*, *Lin.* : Kej.—Folhas.

Ricinus communis, *Linna.* ; Eranda, \ hadolo eromd.—Folhas.

RESOLVENTES.

(V. Discussientes e resolventes).

REVULSIVOS E VESICANTES.

+ *Allium sativum*, *Linna.* ; Loson.—Raiz.

+ *Ammania baccifera*, *Linna.* ; Áginabûte, Agyo.—Folhas.

Anacardium occidentale, *Linna.* ; Káj.—Espírito e óleo da casca da noz.

+ *Bocajea Dalzellii*, *Hook. f. & Thomp.* Sâjeri.—Folhas, em fomentações, no rheumatismo.

+ *Brassica juncea*, *Hook. f. & Thomp.* ; Sainsavel.—Semente.

+ *Capparis horrida*, *Linna. f.* ; Taravâti.—Folhas e tenros rebentos.

Capsicum frutescens, *Linna.* ; Mirsamg.—Fructo.

+ *Clematis Gouriana*, *Roxb.* ; Semdavel.—Sumo das folhas.

+ *Cleome viscosa*, *Linna.* ; Kânaphûti.—Planta.

+ *Curcuma aromatica*, *Salisb.* ; Râna-halad.—Raiz, para promover a erupção na variola.

Drosera Burmannii, *Vahl.* ; Mesí.—Folhas.

Euphorbia nerifolia, *Linna.* ; Nivuli, Nivula-kaintem.—Succo leitoso.

Euphorbia tirucalli, *Link.* ; Portugali-tivulh.—Succo leitoso.

Excoecaria Agallocha, *Linna.* ; (Kharo) uro.—Succo leitoso.

+ *Gynandropsis pentaphylla*, *D.C.* ; Tijoni.—Folhas.

+ *Holoptelea integrifolia*, *Planch.* ; Vainvalo.—Casca.

+ *Lasiosiphon eriocephalus*, *Dene.* ; Rameto.—Casca.

Moringa pterygosperma, *Gaert.* ; Mosing.—Raiz.

Nothopegia Colebrookiana, *Blume* ; Amberi.—Succo que transuda do pe-
ciolo.

Piper nigrum, *Linna.* ; Mirvel.—Fructo.

Plumbago rosea, *Linna.* ; Tumbađi cbitarak.—Raiz.

Plumbago Zeylanica, *Linna.* ; chitrak.—Raiz.

+ *Sapium insigne*, *Benth.* ; Uro.—Succo leitoso.

+ *Semecarpus anacardium*, *Linna.* ; Bibo.—Fructo.

Zanthoxylum Rhetsa, *D.C.* ; Timpli, Tipoli, Agadini, Tiraphul.—Casca
e fructo.

SIALOGOGOS.

(V. Odontalgicos e sialogogos).

SUDORIFICOS.

(V. Diaphoreticos ou sudorificos).

TONICOS.

(V. Amargos e tonicos).

TONICOS ADSTRINGENTES.

Astonia scholaris, Br. ; Sañtavin.—Casca.

+ *Calycopteris floribunda*, Lamk. ; Ukañi, Usaki.—Folhas.

Diospyros embryopteris, Pers. ; Tembiri.—Semente.

Phacourtia cataphracta, Roxb. ; Jañgom.—Folhas.

Holarrhena antidysenterica, Wall. ; Dhavo kuño, Kuño.—Casca.

+ *Hymenodictyon excelsum*, Wall. ; Dañjeli.—Casca.

Mimusops Elengi, Linn. ; Vainvol.—Casca.

Murraya Koenigii, Spreng. ; Kañi-nimba.—Folhas.

+ *Terminalia Chebula*, Koch. ; Haruñi.—Fructo.

STYPTICOS.

Cocos nucifera, Linn. ; Mãd.—Laugem que se extrahem das frondes.

Colocasia antiquorum, Schott. ; Alim.—Sumo.

USOS ESPECIAES.

Abrus precatorius, Linn. ; Gumji.—Semente nas fistulas, ap. ext.

Acorns calamus, Linn. ; Vayakhamç.—Para afugentar as moscas, ap. ext.

+ *Ageratum conyzoides*, Linn. ; Voşâđi.—Sumo no prolapso de anus, ap. ext.

Anacardium occidentale, Linn. ; Kâj.—Casca, no *diabetes insipidus*.

+ *Buchanania latifolia*, Roxb. ; Châr.—Óleo da semente, na calvice, ap. ext.

Eclipta alba, Hassk. ; Mâko.—Sumo da planta para tornar pretos os cabellos, int. e ext.

+ *Gratophyllum hortense*, Nees. ; Disatichim-pâusam.—Folhas no olho, ap. ext.

+ *Gymnema sylvestre*, Br. ; Kavli, vakhamđi.—Folhas, quando mascadas destroem o poder da lingua para a apreciação do gosto de assucar.

Hemidesmus Indicus, Br. ; Uparsâđi.—Sumo da planta nas inflamações dos olhos, ext.

Hydrocotyle Asiatica, Linn. ; Ekpâni, Uindri Kârumçõ.—Folhas na gagueira, int.

Lawsonia alba, Linn. ; Pâđchi-methi.—Folhas pisadas, para o crescimento de ... e de ... ; emplastro para a «ardencia das plantas dos pés».

Luffa acutangula, *Rezb.*; (var-*amara*); *Gomsaji* (*sylvestre*).—Pó do fructo secco, na ictericia, cheirado como pó do tabaco.

+ *Mimosa pudica*, *Linn.*; *Lajari*.—Sumo das folhas nas fistulas, ap. ext.

+ *Schleicheria trijuga*, *Willd.*; *Kasimb.*.—Oleo da semente, na calvice, ap. ext.

+ *Semecarpus anacardium*, *Linn.*; *Bibo.*.—Fructo, na escrofula, int.

+ *Trigonella Foenum-graecum*, *Linn.*; *Methi.*.—Pó da semente, como cosmetico.

Gironniera reticulata, *Thautes*; *Pávdæmerd.*.—Pan, queimado como fumigatorio, ou usado como *lep*, para afugentar espiritos malignos.

Psoralea corilifolia, *Linn.*; *Bávachi.*.—Semente na leucoderma. (applicada com unguento simples, externamente).

VERMIFUGOS.

(V. Anthelminticos ou vermifugos).

VESICANTES.

(V. Revulsivos e vesicantes).



(BLANK PAGE-NO CONTENTS)

INDICE

Das nomes scientificos com apontamentos posologicos

Os nomes em italico denotam os synonymos.

As proporções dos decoctos mencionados n'esta lista são depois de ferver.

Os infusos devem ser feitos com agua quente quando não seja indicado o contrario.

Quando não possa ser reduzido com facilidade a pó uma raiz ou casca, devem ser roçadas as quantidades mencionadas na pedra com agua.

Quasi todos os antelminticos devem ser seguidos do oleo de ricino.

	PAGS.
Acanthaceae	88
Aurantaceae	98
Amaryllidaceae	126
Ampelidaceae	21
Anacardiaceae	24
Anonaceae	2
Apocynaceae	69
Aristolochiaceae	100
Aroideae	133
Asclepiadaceae	72

<i>Abronia angusta</i>	188
Decocto da casca (1 em 10)—1 onça.	
Raiz fresca feita em massa—1 a 1½ oitavas.	
Succo fresco extrahido, por incisões, da casca da raiz—5 oitavas.	
<i>Abrus precatorius</i>	11, 189
Extracto da raiz— <i>ad libitum</i> .	
Infuso da raiz (1 em 20)—1 a 2 onças.	
Solução da semente destorcida (3 partes em 1000 de agua applicada 3 vezes por um dia para produzir ophthalmia purulenta, no pennis, trachoma, &c.	
<i>Alstonia Asiaticum</i>	185
Indicum	9, 182, 183, 189
Decocto das flores ou folhas (1 onça em 12 de agua)—externamente em lavatorios, banhos e gargarejos.	

Infuso de folhas, flores, casca ou semente (1 oitava em 10 onças de água)—bebida convenientemente adoçada.		
Acacia concinna	...	182
Decocto da vagem (1 em 40)—para lavar o cabelo.		
— Inteira	...	42
— Suma	...	155
Cato—10 a 20 grãos.		
Acalypha Indica	...	110, 176, 187, 198
Tinctura das folhas (1 em 7)—20 a 60 gotas.		
Suco exprimido das folhas recentes—1 oitava, emético, para crianças.		
— paniculata	...	109
Acanthus ilicifolius	...	89, 167, 168, 189
Decocto das folhas (1 em 10)—para fomentações.		
Rais feitas em emplastro—como suppurativo.		
Achillea millefolium	...	188
Decocto das folhas e flores recente (1 em 12)—1 onça.		
Achyranthes aspera	...	98, 169, 185
Decocto da planta (1 em 10)—2 onças.		
— <i>lappacea</i>	98
— <i>prostrata</i>	...	98
— <i>triandra</i>	...	99
Acorus Calamus	...	135, 155, 159, 172, 177, 184, 187, 188
Decocto do rhizoma (5 gra. em 2 oitavas de água)—2 oitavas para crianças.		
Infuso do rhizoma (1 em 10)—1½ a 2 onças.		
Pó do rhizoma—1 a 5 gra. como estimulante : 30 grãos como emético		
Acronychia laurifolia	...	16
Adenanthera pavonina	...	41, 189
Emplastro do miolo da semente		
Adhatoda Vasica	...	90, 176, 195
Cigarette da folha recentemente seccada—como antispasmodico na asthma.		
Decocto das folhas ou raiz (¼ em 24)—1 a 2 onças.		
Pó das folhas—10 a 20 grãos.		
Aitantium lunulatum	...	193
Infuso das folhas (1 oitava em 10 onças de água)—1 a 2 onças ou mais.		
Adina cordifolia	...	194
Aeginetia Indica	...	86
Agle Marmelos...	...	17, 155, 196
Conserva do fructo semimadura.		
Pó do fructo—20 grãos a 1 oitava.		
Arides guttatum	...	121
Brua lanata	...	172, 185
Echinomene grandiflora	...	30

<i>Echinomene Indica</i>	31
----- <i>Seslav</i>	30
<i>Ageratum conyzoides</i>	202
<i>Ailanthus Malabarica</i>	18
<i>Ujuga fruticosa</i>	97
<i>Alangrum Neapolitanum</i>	56, 185
----- <i>Lamarckii</i>	56
Pó da casca da raiz.—40 a 50 grãos como emético.	
<i>Albizzia Leblek</i>	191
----- <i>odoratissima</i>	42
<i>Allamanda cathartica</i>	196
Extracto da casca 1 a 2 grãos.	
<i>Allium Cepa</i>	177
----- <i>sativum</i>	177
<i>Alcoasia Indica</i>	165
<i>Aloe vera</i>	165, 188, 189
Suco concreto (aloe)—3 a 6 grãos.	
<i>Alpinia Allughas</i>	124
----- <i>corda serrata</i>	123
----- <i>galanga</i>	177, 191
Pó do rizoma—20 a 30 grãos	
<i>Alstonia scholaris</i>	79, 185, 182, 179
Infuso da casca (1 em 20)—1 a 2 onças.	
Tinctura da casca (2½ em 20)—1 a 2 onças.	
Pó da—casca 3 a 5 grãos.	
<i>Alternanthera sessilis</i>	99
<i>Amaranthus spinosus</i>	164, 189
—5 a 6 pequenas raízes para mascar durante o dia	
<i>Ammania baccifera</i>	189
Emplastro das folhas frescas—como vesicatorio.	
----- <i>rotala</i>	47
<i>Amorphophallus campanulato</i>	134, 190
<i>Anacardium occidentale</i>	25, 155, 161, 166, 180, 185, 191, 200
Infuso da casca (1 em 8)—1 onça.	
<i>Anamirta cocculus</i>	1
Picrotoxina—1/120 a 1/60 grão.	
Unguento de picrotoxina (10 grãos em 1 onça).	
Unguento da semente (80 grãos em 1 onça).	
<i>Ancistrocladus Heynosaia</i>	3
<i>Andira Araroba</i>	1
Unguento (20 a 40 grãos de <i>Gris Powder</i> com 10 gotas de acido acetico em 1 onça de unguento simples.)	
<i>Andrographis echinoides</i>	109
----- <i>paniculata</i>	89, 169, 172
Infuso da planta composta (Planta ½ onça, Casca de laranja e Casca	

	tro, 1 oitava de cada uma, Agua fervente 10 onças)—1½ a 2 onças.	
	Tinctura da planta composta (Planta 6 onças, Mirra e Aloes 1 onça de cada uma, Brando 40 onças)—1 a 2 oitavas.	
	Suavo das folhas frescas—1 oitava, extrahido de ½ onça das folhas.	
<i>Andropogon citratus</i>	138, 175, 177, 182, 191
	Infuso (4 em 20)—1 a 2 onças ou mais.	
	Línimento (oleo de andropogon 1 em 2 do oleo de amendoas).	
	Oleo (internamente)—3 a 6 gottas.	
— <i>muricatus</i>	183
	Infuso da raiz (2 oitavas em 10 de agua) 1—2 onças.	
	Pó da raiz—20 grãos.	
<i>Auclema nudiflorum</i>	130
<i>Anisochilus carnosus</i>	96, 177, 183, 194
	Sumo das folhas—20 a 60 gottas para creanças.	
<i>Anisomeles disticha</i>	97
— <i>Malabarica</i>	97
	Infuso das folhas (1 em 20)—1 a 2 onças.	
— <i>ovata</i>	97
<i>Anodendron paniculatum</i>	72
<i>Anona reticulata</i>	3, 168, 169
— <i>squamosa</i>	3
<i>Antiaris toxicaria</i>	150
	Pó de ½ a ½ da semente.	
<i>Antidesma Bunius</i>	109
<i>Anthocephalus Cadamba</i>	163
<i>Areca Catechu</i>	130, 155
	Cato—10 a 20 grãos.	
	Dentifricio (pó da semente torrada 3, creé preparado 1).	
	Pó da semente secca—10 a 15 grãos como adstringente, 4 a 6 oitavas contra tenia.	
<i>Ardisia humilis</i>	66
— <i>solanacea</i>	66
<i>Argemone Mexicana</i>	161, 168, 180, 187
	Oleo da semente—30 a 60 gottas.	
<i>Argyrea Malabarica</i>	78
<i>Aristolochia Indica</i>	100, 159
	Decocto da raiz (1 em 10)—1 a 2 onças.	
	Pó da raiz—1 a 2 oitavas.	
<i>Artanema sesamoides</i>	84
<i>Artemisia maderaspatana</i>	62
— <i>vulgaris</i>	64, 159, 160, 172, 184, 188
	Infuso das folhas (1 em 8)—1 a 2 onças.	
<i>Artocarpus hirsuta</i>	117
— <i>intergrifolia</i>	117
<i>Arum compactatum</i>	134

Pó da semente—4 a 5 grãos como emético para crianças.	
Barringtonia racemosa	46
Besella <i>alba</i>	99
— <i>rubra</i>	99
Bauhinia acuminata	40
— <i>macrostachia</i>	40
— <i>purpurea</i>	41C
— <i>racemosa</i>	155
— <i>scandens</i>	40
— <i>tomentosa</i>	40
— <i>variegata</i>	41
Bignonia <i>Malabarica</i>	55
— <i>Roxburghii</i>	55
Benincasa <i>cylifera</i>	51, 161, 170, 180
Sumo da porção cortical do fructo—4 onças.	
<i>Bergera Koenigii</i>	16
<i>Bignonia chelonoides</i>	96
— <i>Indica</i>	95
Biophytum <i>Reitwardtii</i>	14
Bixa <i>orellana</i>	155
Blainvillia <i>latifolia</i>	63
Bocagea <i>Dalzellii</i>	199
Boerhaavia <i>procumbens</i>	98, 164, 185, 187
— <i>repens</i>	98
Decocto da raiz (1 em 20)—1 onça cada hora na gonorrhœa; ou 1 a 2 onças 4 vezes por dia nas outras moléstias.	
Boletus <i>crocutus</i>	155
Pode ser usado com maior efficacia quando impregnado com a solução de perchlorureto de ferro	
Bombax <i>heptaphylla</i>	12
— <i>Malabaricum</i>	12, 155
Gomma—30 a 40 grãos.	
— <i>pentandrum</i>	12
Bragantia <i>Wallichii</i>	100, 170
Brassica <i>juncosa</i>	187, 199
Pó da semente—I a 3 oitavas em 10 onças de agua como emético.	
Breynia <i>patens</i>	108
— <i>rhamnoides</i>	108
Briedelia <i>retusa</i>	156
Decocto da casca (1½ em 20)—1 a 2 onças intermitente; ou em injeções.	
— <i>scandens</i>	106
— <i>stipularis</i>	106
Bromelia <i>annana</i>	125, 184
Bruguiera <i>caryophylloides</i>	43
— <i>gymnorhiza</i>	43
Bryonia <i>laciniosa</i>	64

<i>Bryonia scandens</i>	54
<i>Bryophyllum calycinum</i>	140, 198
<i>Bachanania latifolia</i>	203
Decocto das folhas (1 em 10) 1 a 2 onças.	
<i>Butea frondosa</i>	156, 162
Gomma—20 a 30 grãos.	
● Pó das amêndoas da semente—20 grãos 3 vezes por dia.	

<i>Caryophylleæ</i>	6
<i>Chenopodiaceæ</i>	99
<i>Combretaceæ</i>	43
<i>Commelinaceæ</i>	130
<i>Compositæ</i>	61
<i>Connarusæ</i>	27
<i>Cornaceæ</i>	56
<i>Convolvulaceæ</i>	78
<i>Cucurbitaceæ</i>	50
<i>Cycadaceæ</i>	117
<i>Cyperaceæ</i>	135

<i>Cacalia oppositifolia</i>	64
<i>Cæsalpinia bonducella</i>	37, 173
Pó da semente—10 a 15 grãos duas vezes por dia.	
— mimosoides	38
— naga	37
— paniculata	37
— pulcherrima	38, 189
— sappan	37, 156

Decocto do lenho (1 em 20)—1 a 2 onças.

Extracto do lenho—10 a 15 grãos.

— <i>Sivora</i>	36
<i>Cajanus indicus</i>	36
<i>Calamus Travancorensis</i>	131
<i>Callicarpa lanata</i>	91
<i>Gallophyllum inophyllum</i>	7, 192
— <i>Wightianum</i>	7, 169
<i>Calotropis gigantea</i>	73, 156, 168, 170, 176, 180, 183, 184, 187

Pó da casca da raiz—3 a 10 grãos como tónico, e 30 a 60 grãos como emético.

Suco leitoso 2 a 3 grãos.

<i>Calycopteris floribunda</i>	201
<i>Canavalia ensiformis</i>	33
— <i>obtusifolia</i>	33
<i>Canna indica</i>	124
<i>Cannabis sativa</i>	113, 162, 176

Extracto das sumidades floridas—1 a 2 grãos

Tinctura das summidades floridas—5 a 20 gottas.	
<i>Canscora perfoliata</i>	76
<i>Cassia Rheedii</i>	20
— <i>scandens</i>	20
<i>Canthium Rheedii</i>	69
<i>Capparis horrida</i>	199
— <i>spinosa</i>	187
<i>Capsicum frutescens</i>	82, 166, 192
<i>Cardiospermum Halicacabum</i>	23, 162, 187, 189
Sumo da planta— $\frac{1}{2}$ onça, uma vez por dia.	
<i>Careya arborea</i>	46, 156
<i>Carica papaya</i>	162, 166, 184, 189
Papaina—2 a 3 grãos.	
Pigmento (Papaina, 12 grãos, borato de soda, 5 grãos e agua 2 oitavas na eczema, diphtheria, &c.	
Poção—succo leitoso e mel. $\frac{1}{2}$ onça de cada um. e 2 onças de agua quente : como anthelmintico	
<i>Carpopogon giganteus</i>	32
— <i>pruriens</i>	32
<i>Caryophyllus aromaticus</i>	179
<i>Casearia esculenta</i>	180
Decocto da raiz (1 em 8)—1 a 2 onças.	
Extracto da raiz—10 a 20 grãos.	
Xarope (20 grãos do extracto. xarope commum 2 oitavas)—1 a 2 oitavas.	
— <i>tomentosa</i>	49
<i>Cassia fistula</i>	38, 167
Polpa das vagens, preparada—1 a 2 oitavas como laxativo e 1 a 2 onças como purgativo.	
— <i>glauca</i>	39
— <i>occidentalis</i>	196
Infuso das folhas (1-10)—1 a 2 onças.	
Pó das folhas— $1\frac{1}{2}$ oitavas.	
— <i>Sophera</i>	38
Pó das folhas— $1\frac{1}{2}$ oitavas.	
— <i>Tora</i>	39
<i>Cassytha filiformis</i>	104, 167, 180
<i>Celastrus paniculata</i>	164, 168, 172, 181, 183, 192
Oleo da semente—10 a 15 gottas como estimulante e diaphoretico ; 15 a 30 como diuretico.	
Semente (pó da)—1 a 50 gradualmente augmentada.	
Sumo das folhas recentes—1 onça.	
<i>Celosia argentea</i>	159
Pó da semente—1 a 2 oitavas.	
— <i>Corymbosa</i>	6
<i>Cephalandra Indica</i>	53, 172, 181
Sumo da raiz—3 oitavas cada manhã.	

<i>Cerbera Odollim</i>	171
<i>Cereus pentagonus</i>	177
Tinctura (4 em 20 espirito rectificado)—1 a 3 gotas.	
<i>Ceropegia ocellularum</i>	75
<i>Chonemorpha Malabarica</i>	71
<i>Chrysanthemum coronarium</i>	159
Infuso das flores ($\frac{1}{2}$ em 10)—1 a 4 onças.	
— Indicum	178, 195
<i>Cinnamomum iners</i>	102, 178
— macrocarpum	102
— Zeylanicum	179
<i>Cimampelos caepeba</i>	6
— pareira	159, 185
Decocto da raiz (1 em 20)—1 a 4 onças.	
Extracto da raiz—10 a 20 grãos.	
Extracto fluido—1 a 2 oitavas.	
<i>Cissia erecta</i>	22
— cordata	21
— glauca	21
— lanceolaria	22
— pedata	23
— quadrangularis	21
<i>Citrus acida</i>	168, 174
Sumo do fructo—2 oitavas a 1 onça.	
— medica	159
Infuso da casca do fructo (1 em 8)—1 a 2 onças.	
<i>Claoxylon mercurialis</i>	109
<i>Clematis Gouriana</i>	165, 199
<i>Cleome viscosa</i>	199
<i>Clerodendron inerme</i>	94, 159
Sumo das folhas— $\frac{1}{2}$ onça.	
— infortunatum	94, 159, 162, 172
— serratum	94
<i>Clitorea Ternatea</i>	98, 170, 185, 198, 199, 183, 196
Pó da raiz—1 a $1\frac{1}{2}$ oitavas.	
Pó da semente—30 a 60 grãos.	
<i>Cocculus villosus</i>	159, 181
Raiz—1 a $1\frac{1}{2}$ oitavas.	
<i>Cocos nucifera</i>	131, 156, 161, 182, 190, 195, 198, 201
Óleo fresco do fructo— $\frac{1}{2}$ a 1 onça.	
<i>Coffea Arabica</i>	159, 172, 177, 180, 182, 185, 192
<i>Coix lachryma</i>	137
<i>Coleus aromatics</i>	178
Sumo das folhas— $\frac{1}{2}$ a 1 oitava para ornações.	
<i>Colocasia antiquorum</i>	134, 167, 202

<i>Commelina Bengalensis</i>	190
— <i>nudiflora</i>	190
<i>Conarus monocarpus</i>	27
<i>Convolvulus Batatas</i>	76
— <i>flagelliformis</i>	80
— <i>medium</i>	79
— <i>paniculatus</i>	78
— <i>pes-capra</i>	80
— <i>reprens</i>	80
— <i>tridentatus</i>	79
<i>Cordia Myxa</i>	77, 160, 198
Polpa do fructo secco—1 a $\frac{1}{2}$ onças	
<i>Coriandrum sativum</i> ... O	178
Óleo destillado do fructo 2 a 5 gottas.	
<i>Corypha umbraculifera</i>	131
<i>Cosmostigma racemosum</i>	74, 167, 170, 179, 184
Pó da caeca da raiz.—5 grãos 3 vezes por dia.	
<i>Costus speciosus</i>	123, 181
<i>Cratogeomys religiosa</i>	151
Sumo das folhas—2 a 6 oitavas.	
<i>Crinum Asiaticum</i>	183, 187, 193
Sumo da raiz fresca—2 a 4 oitavas.	
— <i>essifolium</i>	127
— <i>latifolium</i>	127
<i>Crotolaria angulosa</i>	28
— <i>laburnifolia</i>	28
— <i>quinquefolia</i>	29
— <i>retusa</i>	28
— <i>verrucosa</i>	28
<i>Croton oblongifolium</i>	181, 184, 196
Decocto da raiz (1 em 20)—1 a 2 onças	
— <i>tilium</i>	109
<i>Cryptolepis Buchanani</i>	72
<i>Cucumis sativus</i>	53
— <i>trigonus</i>	53, 195
Pó do fructo secco—2 a 8 grãos.	
<i>Cucurbita lagenaria</i>	51
— <i>sela-pepo</i>	54
— <i>moschata</i>	54
— <i>pepo</i>	57, 163
Pó da semente decorticada—1 a 2 onças.	
<i>Caruligo orchioidea</i>	126, 190
Pó da raiz—3 oitavas.	
<i>Curcuma aromatica</i>	178, 184, 194
— <i>longa</i>	122, 184
— <i>Zedaira</i>	178

<i>Cyanotis axillaris</i>	130
<i>Cyathula prostrata</i>	98
<i>Cycas circinalis</i>	117
— <i>asperica</i>	117
<i>Cyclea peltata</i>	5
<i>Cynodon dactylon</i>	178
Infuso (1—10)—1 a 2 onças ou mais.					
<i>Cylista scariosa</i>	166
<i>Cybidium aloifolium</i>	130
— <i>imbricatum</i>	119
— <i>praemorsum</i>	121
<i>Cyperus ocephalotes</i>	136
— <i>exaltatus</i>	136
— <i>incurvatus</i>	136
— <i>inundatus</i>	135
— <i>Malaccensis</i>	136
— <i>monocephalus</i>	136
— <i>procerus</i>	136
— <i>rotundus</i>	194
— <i>squarrosus</i>	136
— <i>umbellatus</i>	136
<i>Cytisus Cujun</i>	36
~~~~~					
Dilleniaceae ...	...	...	...	...	1
Dioscoriaceae ...	...	...	...	...	127
Dypterocarpaceae ...	...	...	...	...	8
~~~~~					
<i>Dudalacanthus roseus</i>	165
Pó da raiz—1 oitava.					
<i>Dussia extensa</i>	184, 187, 193
Pó das folhas—10 grãos como expectorante; e pó da raiz—1 a 2 oitavas como purgante e emético.					
<i>Dalbergia sympathetica</i>	36, 181
— <i>volubilis</i>	164
<i>Dampiera Indica</i>	118
<i>Datura dubia</i> (var)	83
Daturina— $\frac{1}{100}$ — $\frac{1}{10}$ grãos.					
— <i>fasciosa</i>	83, 161, 171, 175, 191, 198
Tinctura da semente (2 $\frac{1}{2}$ em 1)—10 a 30 gotas.					
Emplastro das folhas (folhas frescas e farinha em partes iguais).					
Extracto da semente— $\frac{1}{2}$ a 1 grão.					
Pó das folhas secas—2 grãos.					
<i>Dendrobium chlorops</i>	119
<i>Dentella rupeus</i>	87
<i>Derris scandens</i>	87

<i>Dillenia Indica</i>	1
<i>Dioscorea aculeata</i>	128
— <i>alata</i>	128
— <i>dæmona</i>	127
— <i>pentaphylla</i>	127
— <i>spinosa</i>	128
<i>Diospyros embryopteris</i>	67, 156, 187,	201
Extracto do fructo verde—1 a 5 grãos.					
<i>Dolichandrone Rheedii</i>	86
<i>Dolichos Catiang</i>	35
— <i>gladiatus</i>	33
— <i>sabcordatus</i>	33
— <i>retundifolius</i>	34
<i>Drogea volnibilis</i>	74,	120
Pó das folhas—1 a 30 grãos					
<i>Drosera Burmanii</i>	199
~~~~~					
Ebenaceæ ...	...	...	...	...	67
Euphorbiaceæ ...	...	...	...	...	106
~~~~~					
<i>Ecbolium Linneannum</i>	91
<i>Echites paniculata</i>	72
<i>Eclipta alba</i>	63, 181, 187, 198,	202
Pó da raíz—3 oitavas.					
Sumo das folhas—1 oitava.					
— <i>prostrata</i>	63
<i>Elephantopus scaber</i>	62, 156, 190	
<i>Elettaria cardamomum</i>	123, 176	
Pó da semente—10 a 20 grãos.					
<i>Elæteronja Rheedii</i>	69
<i>Eleusine coracana</i>	108, 161	
<i>Embellia ribes</i>	163
Pó da semente—3 oitavas.					
— <i>robusta</i>	65
<i>Emilia sonchifolia</i>	181
Decocção (1 oitava em 4 onças) 4 onças.					
<i>Entada scandens</i>	187
<i>Eragrostis cynosuroides</i>	138
<i>Eriodendron anfractuosum</i>	12
<i>Erycibe paniculata</i>	78
<i>Erythrina Indica</i>	32, 169	
<i>Erythraea Roxburghii</i>	160
Infuso da planta (1 em 40)—1 a 3 onças.					
<i>Euphonia squarrosa</i>	137
<i>Eugenia carryophylla</i>	40

<i>Eugenia glandulifera</i>	45
— <i>jambulana</i>	45, 156, 181
Pó da casca—20 a 30 grãos.	
Pó da semente—5 a 10 grãos.	
— <i>jambosa</i>	45
— <i>Malaccensis</i>	45
— <i>Zeylanica</i>	45
<i>Eulophia nuda</i>	120
— <i>virens</i>	119
<i>Euphorbia antiquorum</i>	106, 170, 181
— <i>hypericifolia</i>	106
— <i>seriifolia</i>	1, 106
— <i>seriifolia</i>	169, 170, 197, 199
Suco leitoso—4 20 grãos.	
— <i>Nivulii</i>	105
— <i>parriflora</i>	105
— <i>pulifera</i>	175
Decocção da planta (1 em 40)—2 onças, duas vezes por dia.	
Extracto (aquoso) da planta— $\frac{1}{2}$ a 1 $\frac{1}{2}$ grãos.	
Tinctura da planta (1 em 5 de espirito de vinho fraco) 10 a 30 gotas.	
— <i>thymifolia</i>	105, 167
— <i>Tirucalli</i>	105, 187, 196, 200,
Suco leitoso—1 a 4 gotas.	
<i>Evolvulus alisinoideis</i>	87
<i>Exacum bicolor</i>	160
Infuso da planta (1 em 40)—1 a 3 onças.	
<i>Excoecaria Agallocha</i>	172, 197, 200
~~~~~	
<i>Ficoidea</i> ... ..	55
<i>Filices</i> ... ..	139
~~~~~	
<i>Figara Rheta</i>	75
<i>Fagraea obovata</i>	75
<i>Peroxis elephantum</i>	156, 178
<i>Ferrala alliacea</i>	176
Assafetida—5 a 20 grãos	
<i>Ficus asperriana</i>	116
— <i>Benjaminsii</i>	114
— <i>Bengalensis</i>	114, 167, 195
— <i>cunia</i>	116
— <i>excolta</i>	114
— <i>gibbata</i>	114
— <i>glomerata</i>	116, 181
Suco leitoso—2 a 4 onças.	
— <i>heterophylla</i>	116

<i>Ficus hispida</i> ...	160, 172, 188
Pó da casca—8 a 10 grãos como tônico : 15 a 30 como antiperiódico ; e 30 a 60 como emético.	
— <i>Indica</i> ...	114
— <i>Mysorensis</i> ...	114
— <i>religiosa</i> ...	115, 156
— <i>retusa</i> ...	114
— <i>Tjakela</i> ...	115
— <i>Tsiela</i> ...	115
<i>Flacourtia cataphracta</i> ...	156
Pó das folhas e raminhos tenros—30 grãos.	
<i>Flemingia tuberosa</i> ...	165
<i>Fornicium vulgare</i> ...	178
Água destilada do funcho—1 a 3 onças.	
~~~~~	
Gentianaceæ ...	76
Geraniaceæ ...	14
Goodenovium ...	65
Graminæ ...	137
Guttiferae ...	7
~~~~~	
<i>Galega Indica</i> ...	36
<i>Galega purpurea</i> ...	30
<i>Garcinia Indica</i> ...	166, 174, 190, 198
— <i>xanthoxchymus</i> ...	174
<i>Gardenia lucida</i> ...	174, 175
Gomma resina—5 a 15 grãos.	
<i>Garuga pinnata</i> ...	19, 175
<i>Genosporum prostratum</i> ...	96
<i>Geodorum purpureum</i> ...	120
<i>Geophila reniformis</i> ...	61
<i>Girardinia reticulata</i> ...	203
<i>Gloriosa superba</i> ...	129, 160, 172
Pó da raiz—5 a 12 grãos.	
<i>Glycosunia pentaphylla</i> ...	170
<i>Glycyrrhiza glabra</i> ...	191
Decocto da raiz (1 oitava em 3 onças de água com outros demulcentes)— 3 onças.	
<i>Gmelina arborea</i> ...	92, 160
<i>Gomphia augustifolia</i> ...	18
<i>Gomphrena globosa</i> ...	99
<i>Gossypium arboresum</i> ...	11, 189, 194
Decocto da raiz (1 em 5')—1 onça cada 2 horas.	
<i>Grangea Maderaspatana</i> ...	62, 174, 175
<i>Gratiola integrifolia</i> ...	85

<i>Griseb. Mousieri</i>	84
<i>Gratophyllum horsense</i>	202
<i>Grevia microcos</i>	13, 150
Sumo de 2 onças de folhas tenras—uma vez por dia.					
— <i>orientalis</i>	13
— <i>tilixifolia</i>	190
Sumo da casca—1 a 2 onças.					
— <i>stimpfii</i>	13
<i>Gymnosma sylvestre</i>	202
<i>Gynandropsis pentaphylla</i>	162, 200
Po da semente—30 a 60 grãos com açúcar.					
—————					
<i>Hemodorum</i>	126
<i>Hydrocharites</i>	118
—————					
<i>Hardwickia pinnata</i>	164
Oleo resina—10 a 30 gotas.					
<i>Hedyotis auricularia</i>	57
— <i>fruticosa</i>	57
<i>Hedyscyma diphyllum</i>	31
— <i>Nel-Trii</i>	31
<i>Helleborio Iora</i>	13
Decocto da casca da raiz (1 em 8)—1 a 2 onças.					
<i>Helioscopium indicum</i>	78
<i>Hemidesmus Indicus</i>	72, 176, 181, 183, 184, 202	202
Infuso da raiz (1 em 10)—2 a 3 onças.					
<i>Heritiera littoralis</i>	12
<i>Herpetos Monnieta</i>	84
<i>Hibiscus Abelmoschus</i>	10
— <i>e-calientis</i>	186, 190
Decocto das capsulas verdes (3 em 20)—3 a 6 onças.					
— <i>piperata</i>	13
— <i>rosa-sinensis</i>	13
Decocto da casca da raiz (1 em 8) 1 a 2 onças					
— <i>Sabdariffa</i>	190
— <i>Surratensis</i>	10
— <i>tiliaceus</i>	10
— <i>torosus</i>	11
— <i>vitifolius</i>	10
<i>Holarrhena antidysenterica</i>	70, 156, 162, 173, 201	201
Decocto da casca (1 em 10)—1 a 2 onças					
Extr. do da casca (a, uos.)—3 a 5 grãos.					
<i>Holigama Arnottiana</i>	26
<i>Hooptelia integrifolia</i>	200
<i>Holostemma Rhodii</i>	74, 164

Pó da raiz—30 a 45 grãos		
Hoya pendula	74
Hugonia Mystan	14
Hydrocarpus Wightiana	181
Oleo da semente—15 gotas a 2 oitavas.		
Hydrocotyle Asiatica	56, 161, 202
Decocto da planta (1 em 20)—1 a 1½ onças.		
Emplastro (com agua fria).		
Pó da planta—5 a 10 grãos.		
Hygrophila quadrivalvis	88
----- spinosa	88, 198, 185, 196
Decocto da planta (1 em 10)—1 a 2 onças.		
Infuso da semente (1 em 8)—1 a 2 onças.		
Hymenodictyon excelsum	173, 201
Decocto da casca (1 em 20)—1 a 2 onças.		
Infuso da casca (1 em 15)—1 a 2 onças.		
Hyperanthera Moringa	27
~~~~~		
Iridem ...	...	126
~~~~~		
Indigofera aspalathifolia	29
----- aspalathoides	29
----- hirsuta	29
----- tinctoria	29, 171, 175
Sumo das folhas—1 onça das manhãs por 3 dias.		
Ipomea angustifolia	79
----- aquatica	80
----- hastata	79
----- Bela-damboe	80
----- biloba	80, 186
----- campanulata	80
----- digitata	177
Pó da raiz—1½ a 2 oitavas (em combinação com outras drogas).		
----- hederae	197
Pó da semente—30 a 50 grãos.		
Resina extrahida da semente—4 a 8 grãos.		
----- pes-tri-ridis	79
----- quamoclit	79, 166
Sumo das folhas—3 oitavas 2 vezes por dia.		
----- nepiaria	80
----- tridentata	79
----- uniflora	28
Ixora barbata	80
----- coccinea	58, 164
Sumo da raiz fresca—1 oitava.		

Tinctura da raiz (1 em 5)—1 a 2 onças.		
----- <i>Parvella</i>	60
<i>Jasminium angustifolium</i>	68
----- grandiflorum	69
----- <i>Bottlerianum</i>	68
----- Sambac	67, 191
Emplastro das flores.		
----- <i>Zambac</i>	67
<i>Jatropha Curcas</i>	166, 189, 194, 197
Oleo da semente—12 a 15 gottas.		
<i>Jonesia Asoka</i>	39
<i>Jussiaea suffruticosa</i>	156
<i>Justicia Adhatoda</i>	90
----- <i>Betonica</i>	90
----- <i>cebolium</i>	91
----- <i>ochroides</i>	90
----- <i>Gendarussa</i>	90, 188
----- <i>paniculata</i>	89
----- <i>procumbens</i>	160
<i>Juncellus inundatus</i>	135
<hr/>		
<i>Kempferia Galanga</i>	122
----- <i>pendurata</i>	122
----- <i>rotunda</i>	123, 184
<i>Kandelia Rheedii</i>	48
<i>Kyllingia brevifolia</i>	138
----- <i>monocephala</i>	170
<hr/>		
<i>Labiatae</i>	96
<i>Laurinea</i>	102
<i>Leguminosae</i>	28
<i>Lentibulariae</i>	85
<i>Liliaceae</i>	128
<i>Linnae</i>	14
<i>Loganiaceae</i>	75
<i>Loranthaceae</i>	104
<i>Lycopodiaceae</i>	111
<i>Lythraeeae</i>	47
<hr/>		
<i>Lactuca Heyneana</i>	187
Decocto (1 em 4)—1 a 14 onças.		
<i>Lageandrea toxicaria</i>	133
<i>Lagenaria vulgaris</i>	51
<i>Lagerstrœmia flex-recta</i>	48

<i>Lagerstrœmia Indica</i>	156
— <i>regina</i>	48
<i>Lasiociphon eriocephalus</i>	200
<i>Launea pinnatifida</i>	182
<i>Launea nitida</i>	102
<i>Lavandula Stœchas</i>	112
<i>Lawsonia alba</i>	48, 157, 168, 202
— <i>incermis</i>	48
<i>Leca macrophylla</i>	157, 169
— <i>œmbucina</i>	23, 157
<i>Leersia aristata</i>	138
<i>Leucas aspera</i>	97, 183
— <i>linifolia</i>	183, 185, 193

Sumo das folhas—5 a 6 gottas. para creanças.

<i>Limnanthemum cristatum</i>	77
— <i>Indicum</i>	77
<i>Limnophila gratioloidea</i>	84, 174
— <i>gratissima</i>	83
<i>Limodorum natans</i>	120
— <i>virens</i>	119
<i>Limonia acidissima</i>	17, 170
— <i>crenulata</i>	17
— <i>monophylla</i>	17
<i>Linum usitatissimum</i>	190

Emplastro da semente.

Pó da semente (3 oitavas em 10 onças de agua)—2 a 4 onças ou mais.

<i>Liparis paradoxa</i>	119
<i>Lippia nodiflora</i>	91, 164
<i>Lobelia nicotianifolia</i>	175

Tinctura (—1 em 50)—10 a 20 gottas.

<i>Lomaria scandens</i>	140
<i>Loranthus elasticus</i>	104
— <i>longifolius</i>	104
— <i>loniceroides</i>	104
<i>Ludwigia parviflora</i>	49
<i>Luffa acutangula</i> (var. <i>amara</i>)	51, 160, 188, 197, 203

Infuso da planta (1 em 80)—1 a 2 onças.

Pó da pedive do fructo—1 a 8 grãos como expectorante e 20 a 30 grãos como emetico.

<i>Luisia tenuifolia</i>	120
<i>Lycopodium phlegmaria</i>	141

Magnoliaceæ	2
Malvaceæ	9

<i>Melastomaceae</i>	47
<i>Meliaceae</i>	19
<i>Menispermaceae</i>	3
<i>Moringae</i>	27
<i>Myristaceae</i> *	102
<i>Myrtaceae</i>	65
<i>Myrtaceae</i>	44
<i>Machilus macrantha</i>	109
<i>Mallotus Philippinensis</i>	110, 163
Kamala em pó (glândulo que cobre a superfície das casculas)—2 a 3 oitavas em mel das abelhas.				
— repandus	110
<i>Mangifera Indica</i>	24, 167, 162, 174, 180, 198	
Decocto da casca (1 em 20) — para injeções.				
Pó da semente—1 a 3 grãos para crianças, e 20 a 30 para adultos				
<i>Mauhit utilis-sima</i>	161
<i>Mariscus albosens</i>	130
— squarrosus	136
<i>Melastoma Malabathricum</i>	47, 157
Decocto das folhas (1 em 8)—1 a 1½ onças.				
<i>Melia Azadirachta</i>	19, 175
Decocto da casca (1 em 15)—1½ a 3 onças.				
Tinctura da casca (1 em 10)—1 a 2 oitavas.				
— dubia	160, 162
Pó da polpa do fruto—2 a 5 grãos				
<i>Melilotus parviflora</i>	29
<i>Melochia carchorifolia</i>	18
<i>Memecylon edule</i>	47, 157
<i>Menoperium eucalyx</i>	4
— cordifolium	3
— polycarpum	4
<i>Mentha sylvestris</i>	178
Summo das folhas—1 a 2 oitavas.				
— viridis	163
<i>Mesochorus cristata</i>	77
<i>Mesua ferrea</i>	7, 157
<i>Michelia Champaca</i>	2, 160, 164, 173, 180, 149	
Decocto da casca (1 em 20)—1 a 1½ onças.				
Infuso da casca (1 em 20)—1 a 1½ onças				
<i>Microstylis Rheedii</i>	118
<i>Mimosa Intsia</i>	42
— nana	41
— adiantaria	42
— pudica	203

Mimosa Elenqi	66, 167, 171, 201
Mimosa Kanki	66
Mirabilis jalapa	97
Modecea palmata	49
—— tuberosa	49
Mollugo spergula	55
—— stricta	56, 175
—— tryphilla	56
Momordica charantia	52, 162, 184
Sumo das folhas—2 a 3 onças.				
— dioica	52, 197
Pó da raiz—2 a 3 oitavas (com mel)				
— monodelpha	53
— umbellata	54
Monochoxia vaginalis	129
Morinda bracteata	60
—— citrifolia	60
—— umbellata	60
Moringa pterygosperma	27, 169, 171, 186, 189, 200
Decocto da casca (1 em 20)—1 a 2 onças.				
Sumo das folhas—1 a 1½ onças (como emetico).				
Mnkia scabrella	54, 178
Mucuna gigantea	32
—— pruriens	32, 162, 165, 177
Dolichos do fructo feito em electuario com mel—1 oitava para creanças, e 4 para adultos.				
Murraya exotica	130, 176
—— Koenigii	16, 201
Musa sapientum	170, 198
Mussaenda frondosa	58, 197
Pó da raiz—1½ oitavas.				
Myristica fragrans	179
Pó da noz moscada—10 a 20 grãos.				
—— Malabarica...	102
~~~~~				
Nyctagiuze	...	...	...	97
Nymphocassia	...	...	...	5
~~~~~				
Nageia Putrangula	108
Naregamia alata	19, 167, 188, 193
Pó da raiz—3 a 5 grãos como expectorante, e 12 a 18 como emetico.				
Tinctura da raiz (2½ em 1) 15 a 46 gottas.				
Nanclen purpurea	57
Nelumbium speciosum	6

Xarope das flores (1 em 10)—2 a 3 oitavas.		
Neptunea oleracea	...	41
Nerium odoratum...	...	168
Tinctura da casca (1 em 5) 5 a 10 gotas por dia.		
— <i>reticulatum</i>	...	72
— <i>tomentosum</i>	...	71
Nicotiana tabacum	...	176
Nothopegia Colebrookiana	...	200
Nyctanthes arbor tristis	...	157, 167
Nymphaea <i>cyanea</i>	...	5
— <i>edulis</i>	...	5
— <i>lutea</i>	5
— <i>rubra</i>	...	5
— <i>stellata</i>	...	5
— <i>versicolor</i>	...	5

Ochnaceae	...	18
Oleaceae	...	20
Oleaceae	...	67
Onagraceae	...	49
Orchideae	...	118
Orobanchaceae	...	85

Ochrocarpus longifolius	...	157
Infuso dos botões das flores (1 em 8)—1 a 2 onças.		
Ocimum basilicum	...	95, 175, 185, 190
Pó da semente—4 a 5 grãos para crianças, 1 a 2 oitavas para adultos.		
— <i>gratissimum</i>	...	95, 164, 190
— <i>sanctum</i>	...	95, 183, 193
Odina Wodier	...	26, 157
Oldelandia biflora	...	58
— <i>corymbosa</i>	...	78, 173, 189
Decocto da planta (1 em 8)—1 a 2 onças.		
Olea dioica	...	69
<i>Ophiorhiza serpentium</i>	...	69
Opuntia Dillenii	...	176
Xarope do fructo (?)—1 oitava 3 ou 4 vezes por dia.		
Orchis latifolia	...	161
Origanum Marjorana	...	178
Oroxylum Indicum	...	85, 185
Decocto da casca (1 em 8) 1 a 1½ onças.		
Oryza sativa	...	180
Osbekia octandra	...	47

Ottelia alismoides	118
Oxalis corniculata	172, 190
Sumo da planta—2 oitavas				
Palmeae	130
Pedaliaceae	87
Piperaceae	101
Plumbaginaceae	63
Polygonaceae	100
Pontederiaceae	129
Portulacaceae	6
Pandanus fascicularis	132, 165
Panicum Italicum	137
————— <i>distichon</i>	132
Papaver somniferum	163, 176
Opio— $\frac{1}{4}$ a 2 grãos.				
Vavetta Indica	60, 186
Pó da raiz—1 oitava para creanças n.				
Pedaliium murex	87
Pó das folhas—2 oitavas				
Pentstemon macrophylla	73
Peucedanum graveolens	178
<i>Pharusocum Molaga</i>	55
Phaseolus adenanthus	34
————— <i>alatus</i>	34
————— <i>mungo</i>	34
————— <i>trinervius</i>	34
<i>Phlomis exalata</i>	97
Pholidota laubricata	119
Phoenix sylvestris	130
Phyllanthus distichus	107, 174, 198
————— <i>esbilata</i>	107, 174, 198
Extracto do lenho—5 a 10 grãos.				
Polpa do fructo—1 a 3 oitavas				
————— <i>longifolia</i>	107
————— <i>multiflorus</i>	106
————— <i>Nivari</i>	107, 186
Pó da planta—1 oitava				
————— <i>pitca</i>	108
————— <i>reticulatus</i>	106
————— <i>urinaria</i>	186
Pó da planta—1 oitava.				
————— <i>vitis idna</i>	108

STATE CENTRAL LIBRARY
THIRUVANANTHAPURAM
KERALA



<i>Physalis peruviana</i>	82
----- minima	82
Piper Beetle	101, 175, 178, 192, 194
----- cubeba	165
----- longum	101
----- nigrum	101, 175, 179, 182, 185, 192, 200
Pó do fructo—10 a 15 grãos.	
<i>Pistia stratiotes</i>	133, 190
<i>Pittosporum floribundum</i>	173
Pó da casca—5 a 10 grãos.	
<i>Plantago ovata</i>	191
Decocto da semente— (2 oitavas, agua 20 onças) 2 a 4 onças.	
Pó da semente—2 a 3 oitavas.	
<i>Plectranthus atrovillosum</i>	96
<i>Plumbago rosea</i>	65, 189, 192, 193, 200
----- Z-yliatica	65, 183, 192, 195, 200
Emplasto raiz—não se deve applicar por mais de 15 minutos.	
Pó na raiz—5 a 10 grãos.	
<i>Plumeria acutifolia</i>	464, 170, 185, 197
Infuso da raiz fresca (1 em 80 de agua fria assucarada)—1 onça 4 vezes por dia.	
Suco leitoso—8 a 12 grãos.	
<i>Pogostemon paniculatus</i>	96
----- parviflorus	173
Raiz fresca para mascar—1 onça ou mais por 24 horas.	
----- Patchouli	91
<i>Poinciana pulcherrima</i>	38
<i>Pollanthes tuberosa</i>	164
<i>Polygonum amplexicaule</i>	100
----- glabrum	100
----- orientale	100, 197
<i>Polypodium adnascens</i>	140
----- quercifolium	139, 189
----- taxifolium	140
<i>Pongamia glabra</i>	36, 160
*Lentimento (oleo da semente e sumo de limão em partes eguaes)	
<i>Portulaca oleracea</i>	179
<i>Portulaca mercurialis</i>	7
----- ultracoxa	6, 167
----- quadrifida	7, 167
Pó da semente—30 a 60 grãos.	
Sumo das folhas recentes—1 a 2 onças.	
<i>Prepuzia fragrans</i>	58
<i>Pothos scandens</i>	135
<i>Premna integrifolia</i>	82
----- spinosa	92

<i>Psidium Guayva</i>	44, 167
—— pomiferum (var)	44
—— pyriferum (var)	44
Decocto da casca (1 em 6) oitavas para creanças ; 1 a 2 2 3 onças para adultos (na diarrhoea chronica).					
Sumo das folhas novas—2 a 4 oitavas.					
<i>Psoralea corifolia</i>	208
<i>Psychotria herbacea</i>	61
<i>Pterocarpus Marsupium</i>	157
Kino ou succo concreto obtido por incisões de tronco—10 a 30 grãos					
<i>Pterospermum glabrescens</i>	13
<i>Putana granatum</i>	157, 168, 198
Decocto da casca do fructo (1 em 10)—1 a 1½ onças.					
Decocto da casca fresca da raiz (1 em 10)—2 onças cada hora (6 doses)—seguida de laxante.					
<i>Pupalia atropurpurea</i>	96
<i>Putranjiva Roxburghii</i>	108
—————					
<i>Quercus infectoria</i>	138
Pó das folhas—10 a 15 grãos.					
Unguento das folhas (80 grãos em 1 onça de unguento simplex).					
—————					
<i>Rhamnus</i>	20
<i>Rhisophora</i>	42
<i>Rubiaceæ</i>	57
<i>Rutaceæ</i>	15
—————					
<i>Sandia dumetorum</i>	188
Pó da polpa do fructo—15 a 40 grãos como emetico ; 15 a 30 na dysenteria ; 5 a 10 como expectorante.					
—— Malabaria	58
<i>Raphidophora portuense</i>	171
<i>Rhaphanus sativus</i>	174
<i>Rauwolfia serpentina</i>	69 160, 171, 173
Polpa da raiz fresca 12 a 30 grãos.					
<i>Remusatia vivipara</i>	134
<i>Rhynchos lucida</i>	21
<i>Rhinacanthus communis</i>	91, 167
Emplastro ou lep da raiz e folhas, feito com vinagre.					
<i>Rhisophora gymnorhiza</i>	48
—— Mangle	42
—— mucronata	42, 167
<i>Rhynchosctilis retusa</i>	121

<i>Ricinus communis</i>	111, 194, 197, 199
Óleo da semente—1 a 1½ onças.	
<i>Rosa Damascena</i>	197
Infuso dos botões (1 em 10)—2 a 8 onças.	
<i>Rottlera trihueca (discosa)</i>	110
— <i>tinctoria</i>	110
<i>Ruellia longifolia</i>	88
— <i>prostrata</i>	88
— <i>ringens</i>	88
— <i>Zeylanica</i>	89
<i>Ruta graveolens</i>	189
Infuso (1 oitava em 6 onças)—6 onças.	
Óleo da planta—2 a 5 gottas.	
Pó das folhas—10 a 20 grãos.	

<i>Namydaceæ</i>	19
<i>Santalaceæ</i>	105
<i>Sapindaceæ</i>	23
<i>Sapotaceæ</i>	66
<i>Scitamineæ</i>	122
<i>Scrophularinææ</i>	83
<i>Simarubææ</i>	18
<i>Solanaceæ</i>	81
<i>Sterculiaceæ</i>	12

<i>Saccharum arundinaceum</i>	138
— <i>exaltatum</i>	138
— <i>officinatum</i>	191
<i>Saccolabium premorsum</i>	121
<i>Samolida Indica</i>	14
<i>Sanaviera Roxburgiana</i>	125
<i>Santalum album</i>	165
Óleo do pau—20 a 40 gottas.	
<i>Sapindus laurifolia</i>	23
— <i>trifoliatus</i>	23, 103, 182, 185
Polpa do fruto—2 a 5 grãos para crianças.	
<i>Sesum Indicum</i>	112
— <i>insigne</i>	158, 200
<i>Sesam Indica</i>	39, 138
Decocto da casca (2 em 10)—1 a 2 onças.	
<i>Sevvia Kunigii</i>	65
— <i>taeidi</i>	65
<i>Schleichera trijuga</i>	164, 192, 203
<i>Seirpus articulatus</i>	134

<i>Safrus squarrosus</i>	137
<i>Scleria lithosperma</i>	137
— <i>texis</i>	137
<i>Scleropyrum Wallichianum</i>	105
<i>Sceloporus aculatus</i>	16
<i>Scutea Indica</i>	21
<i>Sebastiania Chamelica</i>	113
<i>Senecarpus anacardium</i>	200, 203
Sumo do fructo— $\frac{1}{2}$ —1 grão.				
<i>Senec. arboreus</i>	39
— <i>Siphata</i>	38
— <i>Tora</i>	39
— <i>Turvides</i>	39
<i>Serratula anthelmintica</i>	61
<i>Sesamum Indicum</i>	87, 191
— <i>orientale</i>	87
<i>Sesbania Ægyptia</i>	30
— <i>grandiflora</i>	30, 158, 193
Sumo da raiz—3 a 6 oitavas.				
<i>Sida acuta</i>	9
— <i>carpinifolia</i>	9, 160, 164, 186, 191
Raiz (1 onça roçada em agua).				
— <i>cordifolia</i>	9
— <i>glabrescens</i>	9
— <i>humilis</i>	191
— <i>Indica</i>	9
— <i>Mysorensis</i>	9, 191
— <i>rhombifolia</i>	9, 191
<i>Smilax Zeylanica</i>	128, 176, 182
Decocto da raiz (2 em 20)—2 a 4 onças.				
<i>Smithia sensitiva</i>	31
<i>Solanum ferox</i>	81
— <i>kirantava</i>	81, 186
— <i>Indicum</i>	81
— <i>meloungina</i>	81
— <i>xanthocarpum</i>	186
Sumo das folhas—(6 oitavas).				
<i>Sonneratia acida</i>	48
<i>Spermacoce hispida</i>	61
<i>Sphaeranthus Indicus</i>	62, 182
Pó da casca—20 a 30 grãos.				
— <i>scilla</i>	62
<i>Spilanthes Acnella</i>	158, 195
<i>Spondias mangifera</i>	26, 158, 174, 191
<i>Stereocaula urens</i>	191
<i>Stereospermum chelonoides</i>	86, 167

<i>Stroespermum suaveolens</i>	177
----- <i>xylocarpum</i>	166
<i>Stilago Buxus</i>	109
<i>Strebalus asper</i>	113
Pó da rãia—5 a 10 grãos.				
<i>Stroychnos colubrina</i>	73, 171
----- <i>nox vomica</i>	76, 160, 173, 177, 192	
Infuso da semente (2 oitavas em 12 onças) 4 a 10 oitavas.				
Pó da semente—2 a 3 grãos gradualmente augmentados a 10.				
<i>Swertia chirata</i>	173
Infuso da planta (1 em 40)—1 a 2 onças.				
----- <i>decussata</i>	173
Infuso da planta (1 em 40)—1 a 2 onças.				
<i>Symplocos Beddomei</i>	158
Pó da casca—20 grãos. 2 a 3 vezes por dia.				
<i>Syntherisma sylvatica</i>	183, 193
~~~~~				
<b>Tiliaceæ:</b> ...	...	...	...	13
~~~~~				
<i>Tabernemontana coronaria</i>	71, 195
----- <i>Heyneana</i>	71
<i>Tagetes erecta</i>	182
Sumo das petalas—3 oitavas.				
<i>Tamarindus Indica</i>	39, 158, 197
Conserva da polpa do fructo—2 a 4 oitavas				
<i>Tectona grandis</i>	92, 158, 181
<i>Tephrosia purpurea</i>	30
<i>Terminalia Belerica</i>	44, 154
----- <i>Catappa</i>	13
----- <i>Chebulis</i>	158, 197, 201
Decocto do fructo maduro (4 oitavas em 2 onças de agua)—2 onças como purgante.				
Pó da polpa do fructo verde.—1 oitava. 2 vezes por dia como adstringente. 1 a 2 grãos para creanças.				
----- <i>tomentosa</i>	154
Decocto da casca (1 em 10)—1 a 2 onças.				
----- <i>paniculata</i>	158
Sumo das flores—1 a 1½ onças				
<i>Tetraera levis</i>	1
----- <i>trigona</i>	1
<i>Theriphonium infustum</i>	153
<i>Thespesia populnea</i>	11, 136
<i>Thevetia nerifolia</i>	171
Tinctura da casca fresca (1 em 5)—10 a 15 gotas.				

<i>Tiliacora racemosa</i>	4
<i>Tinospora cordifolia</i>	3, 160, 165, 173, 192
Infuso da raiz e talo (1 em 10 de agua fria)—1 a 3 onças.	
— Malabarica	3
<i>Toddalia aculeata</i>	16, 160, 173
Infuso da raiz (2 em 10)—1 a 2 onças.	
Tinctura da raiz (2½ em 10)—1½ a 3 oitavas.	
<i>Torenia Asiatica</i>	84
<i>Tradescantia oxillaris</i>	130
<i>Tragia chamaelea</i>	113
— involucrata	112, 169
<i>Trewia nudiflora</i>	110
<i>Trianthema monogyna</i>	189
Pó da raiz—2 oitavas.	
<i>Tribichodesma Indicum</i>	191
<i>Tricosanthes cucumerina</i>	50, 173, 197
Sumo da raiz—2 onças.	
— uervifolia	50, 197
Extracto alcoolico do fructo verde—3 a 5 grãos repetido cada 3 horas até produzir effeito purgativo.	
— palmata	146, 171, 176
<i>Trifolium Indicum</i>	29
<i>Trigonella Foenum-græcum</i>	177, 179, 182, 203
Decocto da semente (¼ onça em 6 onças, com jagra)—6 onças.	
<i>Thrypis aspera</i>	113
<i>Tylophora asthmatica</i>	158, 183, 188, 193
Pó das folhas ou raiz—25 a 30 grãos como emetico; e 3 a 5 grãos como expectorante.	
<i>Typhonium divaricatum</i>	133
— gracile	133
~~~~~	
Umbelliferae ... ..	56
Urticaceæ ... ..	113
~~~~~	
<i>Urena sinuata</i>	10
Infuso das folhas e flores (1 oitava em 12 onças)—2 a 3 onças.	
<i>Urginea Indica</i>	186, 188, 193
Pó do bolbo—10 a 20 grãos.	
<i>Utricularia reticulata</i>	85
<i>Uvaria narum</i>	2
— Zeylanica	3
~~~~~	
Verbenaceæ ... ..	91

<i>Falcomeri infortunata</i> ... ..	94
----- <i>serrata</i> ... ..	94
<i>Vanda spathulata</i> ... ..	121
<i>Vandellia cincta</i> ... ..	85
<i>Vateria Indica</i> ... ..	8
<i>Ventiligo Madraspatana</i> ... ..	160
Pó da casca da raiz— $\frac{1}{2}$ a 1 $\frac{1}{2}$ oitavas.	
<i>Verbesina calendulacea</i> ... ..	63
----- <i>Lanceola</i> ... ..	63
<i>Vernonia anthelmintica</i> ... ..	61, 163, 169
Decocto da semente (1 em 24).—1 a 1 $\frac{1}{2}$ onças.	
Pó da semente—1 $\frac{1}{2}$ oitavas com mel (como anthelmintico).	
----- cinerea ... ..	61
<i>Viburnum fatidum</i> ... ..	163, 176
Sumo das folhas— $\frac{1}{2}$ a 1 onça uma vez por dia.	
<i>Vigna Catjang</i> ... ..	35
<i>Vinca parviflora</i> ... ..	69
----- <i>pusilla</i> ... ..	69
<i>Vitex nitata</i> ... ..	93
----- <i>leucocylon</i> ... ..	93
----- <i>negundo</i> ... ..	93, 183, 185
Folhas levemente torradas—para ap. externa.	
Sumo das folhas—1 $\frac{1}{2}$ oitavas.	
Tinctura da casca da raiz (2 em 10)—1 a 2 oitavas.	
----- trifolia ... ..	93
<i>Vitis auriculata</i> ... ..	193
----- <i>carnosa</i> ... ..	23
----- <i>glauca</i> ... ..	21
----- <i>Indica</i> ... ..	22, 182
----- <i>lancoolaris</i> ... ..	22
----- <i>pedata</i> ... ..	22
----- <i>quadrangularis</i> ... ..	21, 165
Sumo do talo 6 oitavas.	
----- <i>repens</i> ... ..	21
----- <i>Rheedii</i> ... ..	22
-----	
<i>Weberia corymbosa</i> ... ..	58
<i>Wedelia biflora</i> ... ..	64
----- <i>calendulacea</i> ... ..	63
<i>Withania somnifera</i> ... ..	82
<i>Wrightia tinctoria</i> ... ..	164
----- <i>tomentosa</i> ... ..	71
<i>Woodfordia floribunda</i> ... ..	158
Pó das flores—2 oitavas.	

<b>Xyrides</b> ... ..	129
<b>Xyris Indica</b> ... ..	129. 167
<hr/>	
<b>Zanonin Indica</b> ... ..	55
<b>Zanthoxylon Rhetsa</b> ... ..	15, 179, 186, 200
<b>Zehencria umbellata</b> ... ..	54, 163, 182
<b>Zingiber Cosumamar</b> ... ..	171. 179
Pó da raiz—15 a 30 grãos.	
— officinale ... ..	123, 179. 184
Pó da raiz—10 a 20 grãos.	
— Zerumbet ... ..	123. 179
<b>Zizyphus jujuba</b> ... ..	20. 158
— rugosa ... ..	158
Flores—2 grãos em combinação com outras drogas.	
<b>Zornia diphylla</b> ... ..	31

## Índice dos nomes vulgares

- Abobra branca, 51.  
——— calabacea, 51.  
——— d'agua, 51.  
——— guinea, 54.  
Acara patajoti, 1.  
Acatja-valli, 104.  
Adaca-manjem, 62.  
Ada-kodien, 74.  
Ádãj, 91, 164.  
Adamaram, 43.  
Adamboe, 48, 80.  
Ádamchím pholám, 66.  
Ádãso, 90, 175, 193.  
Adeca aloen, 118.  
Adel-odogam, 90.  
Adoliã, 21.  
Adulso, 90.  
Agadini, 15, 179, 200.  
Agãsto, 30, 158, 195.  
Agaty, 30.  
Ágerú, 78.  
Ághãdo, 169, 185, 195.  
Aginabúte, 199.  
Ágyo, 199.  
Áiça, 158.  
Ain Puriti, 11.  
Ainoar, 91.  
Aii, 7.  
Ájerú, 166.  
Ákãsavel, 164, 180.  
Akús, 122, 178.  
Alađ, 122, 178, 184.  
Alady, 122.  
Alakãndei, 42.  
Álaphũli, 196.  
Alein, 123, 179.  
Álein, 184.  
Algodão do mato, 12.  
Algodeiro, 12.  
Álliphũlt, 98, 167.  
Almiro, 182.  
Aloy, 164.  
Alpam, 100, 152.  
Ájuã, 161, 202.  
Ánãli, 64.  
Amargoseira, 16, 19.  
Amaritavel, 165.  
Ambadeki, 102.  
Ambãdo, 26, 158, 174, 191.  
Ambalam, 26.  
Ambari, 187, 190.  
Anibe-halađ, 178.  
Anbel, 5.  
Ambeli, 55.  
Ambéri, 200.  
Ambeti, 10.  
Ambeti, 48.  
Anibo, 24, 157, 162, 174, 180, 198.  
Anibo-keli, 120.  
Ámbull, 83, 84, 151, 174.  
Ambuti, 172, 190.  
Ameri, 29.

- Anholam, 56, 187.  
 Ammaco (macho) 65.  
 Ammaco, 75.  
 Amritvel, 160, 173.  
 Ânásãji, 18, 158.  
 Amueti, 112.  
 Anévãji, 107, 157, 174, 198.  
 Ana-Chunda, 81.  
 Ana-Colupa, 91.  
 Ana daliqui, uro, 112.  
 Ana-mull, 86.  
 Ânãn, 3.  
 Ananãs, 125, 188.  
 Ana-Schoyadi, 62.  
 Anavinga, 49.  
 Anacali maravara, 119.  
 Andexa Motha-panna, 118.  
 Angeli, 117.  
 Angeli Manavara, 121.  
 Angolam, 56.  
 Anojeli, 117.  
 Anona, 3.  
 Anona-maram, 3.  
 Apãmã, 100, 170.  
 Apato, 155.  
 Appel, 92.  
 Arana-panna, 141.  
 Areallo, 115.  
 Arêca-Gãli, 115.  
 Arãa-Bepon, 19.  
 Ariqueira, 130.  
 Armatoria das egrejas, 118.  
 Arola, 111.  
 Arola pennachoso, 111.  
 Árpô, 38.  
 Artã, 79.  
 Ársi, 126.  
 Arty, 79, 129.  
 Ártôd, 169.  
 Arvore da folha parida (macho) 19.  
 Arvore da folha parida, 145.  
 Arvore da gralha, 114.  
 Arvore da raiz ladrão, 114  
 ————— menor, 115.  
 ————— rassa maior, 116.  
 ————— das raizes, 143.  
 ————— de pau salgado, 104.  
 ————— rassa, 116.  
 ————— parigosa, 116.  
 Arvore dos sombreiros, 131.  
 ————— Encenza, 8.  
 ————— triste de dia, 59.  
 Asãpi, 158.  
 Asjogam, 39.  
 Asôka, 39, 158.  
 Asonaton, 115.  
 Asotas, 146.  
 Astipsada, 62.  
 At, 3.  
 Átaki, 69, 171, 173, 190.  
 Ata-maram, 3.  
 Atas, 3.  
 Atego-cudo, 70.  
 Ateira, 3.  
 Aterlusi, 101.  
 Atin, 168, 169.  
 Atoã, 3.  
 Atoeira, 3.  
 Atti-ala, 116.  
 Atti-Meer-Alon, 114.  
 Andi Malleri, 97.  
 Avãji-Apkãro, 3.  
 Avanacoe-bitavamacu, 111  
 Azeitonas do Malabar, 144.

- B**  
 Babosa quinada, 21.  
 Bâbonf, 58.  
 Badena musta, 136.  
 Bahel-Schullî, 88.  
 Baheltsjullî, 84.  
 Bainheiro, 26.  
 Bâio, 38, 196.  
 Bala, 138.  
 Bala, 124.  
 Balam-Pullî seu Maderam-Pullî,  
     39.  
 Balef, 80.  
 Ballia mucca-piri, 53.  
 Bâlo, 167.  
 Bambu d'escrever, 139.  
 Bângi, 113.  
 Bana-Âboli, 165.  
 Bananeira, 124.  
 Bangada-valli, 80.  
 Bangad-vâjî, 80, 186.  
 Bare Mogari, 68.  
 Barika-joyo, 194.  
 Bassal, 66.  
 Bassala-poulou-maravara, 118.  
 Basella, 99.  
 Bâsil, 21.  
 Basoti, 57.  
 Batatas, 79.  
 Bâvachi, 203.  
 Bedsi, 49.  
 Beene!, 16.  
 Beedia, 139.  
 Beeta, 101.  
 Beetha-codi, 101.  
 Bel, 17, 155, 196.  
 Betel, 101.  
 Bel-adamboe, 80.  
 Belam Canda Schuler mudi, 126.  
 Bela pola, 120.  
 — Schora, 51.  
 Beldroega, 6.  
 Bel-Erica, 73.  
 Beli-Caraja, 138.  
 Belilla, 58.  
 Bella Modagam, 65.  
 Belluta Tajampakam, 8.  
 Beloere, 9.  
 Belokâkusini, 74, 187, 190.  
 Belou, 17.  
 Beluta-Kanneli, 45.  
 Beluta-modela-mucca, 100.  
 Belutta-itti-canni, 104.  
 Belutta-tajori-valli, 23.  
 Bembî, 133.  
 Bem-curim, 90.  
 Bemdarli, 13.  
 Bengali Âmerasichetv jhâl, 43.  
 Bem-nosi, 93.  
 Bem-pavel, 52.  
 Bem Sche-ti, 60.  
 — tamara, 6.  
 Benapetsja, 78.  
 Bendarle, 140.  
 Bendarfy, 141.  
 Bendarri, 135.  
 Bengisim, 112.  
 Benisa, 111, 163.  
 Ben-Kalesjam, 115.  
 Ben-Kara, 58.  
 Ben-teru-nali, 78.  
 Bentloka, 141.  
 Bestram, 109.  
 Bônggi, 162, 175.



- Bharaṅgi, 159, 170, 172.  
 Blát, 190.  
 Bhatta-Gágrí, 28.  
 Bhat-vel, 5.  
 Bheḍsi, 45.  
 Bheṁḍi, 11, 166.  
 Bheṁḍo, 186, 190.  
 Bhitamḍ, 163, 174, 190, 198.  
 Bhora, 158.  
 Bhuṁhya eraṁḍa, 113.  
 Bhuṁhya-Āmváli, 186.  
 Bhuṁhya chaṁpho, 123, 181.  
 Bhuṁhya-golí, 7, 167.  
 Bhuṁhya-keli, 120.  
 Bhuṁhya Kumváli, 49.  
 Bhuṁhya-kumvájo, 177.  
 Bhuṁhya-túlsí, 95, 175, 183, 193.  
 Bhuṁhya-tuḷsi, 96.  
 Bhuṁhya-túlsí, 164.  
 Bhuṁhya-tupákati, 191.  
 Bhuṁhya-ványuṅgi, 49.  
 Bibarola, 44.  
 Bibo, 200, 203.  
 Bídani Gali, 59.  
 Bilimbí, 15.  
 Bilimbí, 15, 167, 174, 198.  
 Bilimbinos, 15.  
 Bilitejira, 149.  
 Bípali, 101.  
 Bíramojo, 165.  
 Biti-maram-maravara, 151.  
 Blattiseu jambos sylvestris, 48.  
 Bobliq, 163.  
 Bocalo, 138.  
 Boin-caro, 89.  
 Boin-Eraṁḍa, 113.  
 Bokanaḷ 175.  
 Bomaḍaka, 133.  
 Bomaḍaki, 132, 165.  
 Bon, 133.  
 Bonagi, 132.  
 Bonda-Calo, 10.  
 Bonka-kely, 153.  
 Boṅ-varó, 110.  
 Bor, 20.  
 Bori, 20.  
 Bozimti, 16, 160, 178, 192.  
 Bothe, 196.  
 Brami, 84.  
 Brámi, 84.  
 Bredo-tala, 99.  
 Bringarasi, 63.  
 Buján-Āmváli, 107.  
 Búkatumbo, 196.  
 Bula, 150.  
 Búl-vāṅgú (vayaṅgi), 88.  
 Bupariti, 11.  
 Bútamva, 99.  
 Butumbo, 90.  
 Buyán-āmválo, 186.
- C**
- Caca-mulla, 87.  
 Cadajeu, 56.  
 Canda-Pilava, 60.  
 Cadehari, 98.  
 Candel-Avanaca, 109.  
 Canda-dolo, 84.  
 Camicotteu-pala, 105.  
 Caip-Schora, 51.  
 Cajenneum, 63.  
 Cajueiro, 25.  
 Cajuus, 25.  
 Calageri, 62.

- Caleri-Suran, 134.  
 Cali valli, 79.  
 Calo-Dotigó, 83.  
 Cambulam, 51.  
 Cammetti, 112.  
 Canastula, 38.  
 Cananga, 79.  
 Canavali, 34.  
 Candel, 43.  
 Canela do mato, 102.  
 Canhamo, 113.  
 Caniram, 76.  
 Canschena-Pow, 40.  
 Canschi, 93.  
 Cansjam-cora, 76.  
 Capo-Molago, 83.  
 Capra catari, 122.  
 Capussi, 12.  
 Carabalo, 148.  
 Caru-Carinam, 89.  
 Caramba, 49.  
 Caramboleira, 14.  
 Carando, 146.  
 Cara-nosi, 93.  
 Cara-Schulli, 89.  
 Caravatti, 116.  
 Caravatti-valli, 116.  
 Cardamomo, 124.  
 Careloe-vegou, 101.  
 Car-elu, 87.  
 Caretti, 37.  
 Cari-Capusi, 11.  
 Carilha, 93.  
 Carim curini, 91.  
 Caringola, 129.  
 Carim-tumba, 97.  
 Carivillandi, 128.  
 Caró, 76.  
 Carrapateiro, 111.  
 Carrilha de serra, 146.  
 Carua, 102.  
 Catona, 26.  
 Catriconda, 137.  
 Cattu-Gasturi, 10.  
 Cattu-Schiragam, 61.  
 Cattu-tirpali, 101.  
 Cattu-tirtava, 95.  
 Cattu-valli, 5.  
 Catalli-pola, 151.  
 Cattu-paeru, 34.  
 Catupinaca brava, 144.  
 ——— da Serra, 48.  
 Catu Pitsjegam Mullu, 68.  
 Catusa, 16.  
 Catu-tajandi, 34.  
 Caurdi, 146.  
 Cayeri-Surna, 133.  
 Chamdan, 165.  
 Châmpho, 2.  
 Châmpo, 2, 160, 164, 173, 186, 189.  
 Chamvali, 35.  
 Châr, 164, 202.  
 Charchari-vel, 4.  
 Châroll-164.  
 Cheramela, 107.  
 Cheru-Chunda, 81.  
 Chiapangam, 37.  
 Chietia, 38.  
 Chinch, 89, 158, 197.  
 Chinchono, 181.  
 Chin-papas, 3.  
 Chirpati, 82.  
 Chitar, 42.  
 Chitarak, 192, 195, 200.

Chorál, 22.  
 Chori-bori, 145.  
 Chovunes-Mandaru, 41.  
 Chunda, 81.  
 Chúnni, 158.  
 Cilia-cuvadi, 98.  
 Cirita mari, 94.  
 Ciritsmari, 159.  
 Cita-Mataki, 58.  
 Cita Mataki, 60, 186.  
 Cit-ambel, 5.  
 Cit-amerdu, 4.  
 Cit-naqveri, 145.  
 Codagn-pala, 70.  
 Coddá-Pannu, 131.  
 Codi Avanca, 113.  
 Coipa, 99.  
 Colasso, 88.  
 Coletta-veeta, 89.  
 Colinil, 30.  
 Coluppa, 99.  
 Cornáti, 110.  
 Conna, 38.  
 Conuga, 130.  
 Coqueiro, 131.  
 Cordoeira, 109.  
 Cornos dos diabos, 86.  
 Coro-Nirvoloi, 22.  
 Corosinam, 148.  
 Corotha, 75.  
 Cotam, 96, 97.  
 Courondi, 146.  
 Covalam *Seu* *Cydonia* *exotica*, 17.  
 Covel, 53.  
 Crica da velha, 28.  
 ——— (trepadeira), 28.  
 Croton tigliis, 109.

Cudó, 71.  
 Cudu-Pariti, 11.  
 Cujuro-Saruo, 133. *  
 Cumbalu, 110.  
 Cumudi, 77.  
 Cupameni, 110.  
 Cupu-vela, 69.  
 Cupi, 58.  
 Curemea, 122.  
 Curigi-tali, 28.  
 Curutu-pala, 71.  
 Cavali, 79.

### D

Dac ilo-taristo, 150.  
 Dacolo-cante-mogaro, 98.  
 Daculo bondakulo, 10.  
 Dida-mári, 167.  
 Dadulo-papálf, 53.  
 Delumári, 91, 167.  
 Dadu-valli, 75.  
 Dád-vel, 75.  
 Dákti kámti mogri, 98.  
 Dálimb, 157, 163, 198.  
 Damapán, 31.  
 Damdólf, 173, 201.  
 Dámitasi, 24.  
 Danti, 150.  
 Darpu, 139.  
 Darsón, 11.  
 Davandicu, 86.  
 Dava-Sailo, 144.  
 Davo-Solitari, 144.  
 Davikda, 122.  
 Davi-rinti, 93.  
 Davi-rinti, 146.  
 Davi-Roey 73.

Davi-Sim̄sori-tonda, 100.  
 Davo Ápto, 40.  
 — Baheua, 102.  
 Davo-Mandaru, 40.  
 Davo-Póksó, 90.  
 Davo Til, 87, 191.  
 Dekamáli, 175.  
 Derpu, 135.  
 Desra, 11.  
 Deva tovasini, 54, 178.  
 Dhákato kájo bher̄do, 10.  
 Dhákṭi nákeri, 47.  
 Dhákṭi-tupkati, 9, 191.  
 Dhaman, 190.  
 Dhavan, 158.  
 Dhavi Bheḍsi, 45.  
 Dhavi Kaneri, 168.  
 Dhavi-Paḍkali, 60.  
 Dhavi Rúi, 73.  
 Dhavi Sarabari-vel, 22.  
 Dhavo Chitrak, 65, 183, 192, 195.  
 Dhavo Kuḍo, 70, 156, 162, 201.  
 Dhavo-Kájro, 171.  
 ——— panas, 57.  
 Dhovi-Káram̄di, 127.  
 Dhutaro, 161, 171, 175, 194.  
 Dim̄di, 23.  
 Dim̄di, 157.  
 Dim̄do, 157, 168.  
 Dino, 23.  
 Disatichim-pánám, 202.  
 Dolari, 82.  
 Doli mogari, 68.  
 Domvadak, 86, 183.  
 Donadeke-goli, 115.  
 Dondalaki, 82.  
 Donda-Sáilo, 94, 170.

Don-parvati, 78.  
 Dotiró, 83.  
 Doulo-Vadhu, 114.  
 Dovi-phala, 149.  
 Duda-valli, 147.  
 Dúdini, 105, 167.  
 Dudurli, 74, 164, 167, 175.  
 Dupait, 8.  
 Durbu, 138.  
 Dútro, 83, 194, 195.

## E

Edú, 174.  
 Ekpáni, 56, 161, 176, 181, 198, 202.  
 Ela-Calli, 106.  
 Ela-pola, 151.  
 Elaticanto, 105.  
 Elengi, 66.  
 Eletari, 123.  
 Elú, 124, 178.  
 Endrana, 98.  
 Eram̄da, 111, 194, 197, 199.  
 Ericu, 73.  
 Erina-pavel, 52.  
 Erina-toli, 78.  
 Espinho do ladrão, 16.  
 ——— dos monnos, 42.  
 ——— d'urso, 58.  
 ——— Salsedo, 59.  
 ——— Sancto, 56.  
 ——— bravo, 56.  
 Espinhos dos Marcilhos, 42.

## F

Fava coceira, 32.  
 ——— pequena, 34.  
 Favas caranguejo, 34.  
 ——— de aya, 147.  
 ——— — Brahmane, 36.

- Favas de chapa, 36.  
 ——— eugenho, 33.  
 ——— lazaro, 42.  
 ——— tress nma, 18.  
 ——— dos pares sativo, 33.  
 ——— tarquescas, 36.  
 Fedegosa, 39.  
 Figos do buzio, 143.  
 Figueira de Góa, 115.  
 ——— dos pagodes, 115.  
 Folha amargoseira com fructa grande, 52.  
 Folha-aredilha, 21.  
 Folhas da lança, 135.  
 ——— minta, 110.  
 ——— pa, 8.  
 ——— raspa ( macho ), 91.  
 ——— trindade, 32.  
 ——— de dentes, 108.  
 ——— do pitão, 98.  
 ——— porco, 37.  
 Fructa bandoliera, 55.  
 ——— barrete, 10, 19.  
 ——— barruga, 146.  
 ——— penachaso, 146.  
 ——— bolsa, 145.  
 Fructa-bolsa-china, 23.  
 Fructa cauri, 45.  
 ——— do maio, 49.  
 Fructa conteira, 31.  
 ——— da gralha, 47.  
 ——— do mato, 145.  
 ——— pequena, 47.  
 ——— trindade, 108.  
 ——— de agarão, 30.  
 ——— grude, 67.  
 ——— manilla, 66.  
 Fructa d'entrado, 77.  
 ——— estrellada, 1.  
 ——— gargantilha, 9.  
 ——— gibique preta, 66.  
 ——— gradinha, 69.  
 ——— gundra, 12.  
 ——— mata peixe, 4.  
 ——— parda ( trepadeira ), 20.  
 ——— da serra, 4.  
 ——— pedrica, 66.  
 ——— sancta, 18.  
 ——— tirilha, 100.  
 Fula bordão, 59.  
 ——— criqua, 36.  
 ——— de pavão, 38.  
 ——— de sapato, 11.  
 ——— do diabo, 39.  
 ——— do maio, 13.  
 ——— gafinhota, 10.  
 ——— leitica, 147.  
 ——— mogari, 68.  
 ——— mourisca, 104.  
 ——— paolista, 18.  
 Ful gafinhota, 10.  
 Fûmch, 178.
- G
- Gagana, 158.  
 Gâgrî, 28, 29.  
 Gâgro, 29.  
 Gâi-mâri, 57.  
 Gâjri, 173.  
 Gâlâmârg, 166, 180, 194, 197.  
 Gâlî, 58.  
 Gali-donsa, 144.  
 Gamjan, 175, 177 182, 191.  
 Gonesa-vel, 171.

- Gara, 19.  
 Gara-dudini, 51.  
 Gara-dól, 187.  
 Garayl, 187.  
 Garsilha, 13.  
 Garuñd—pha], 4. 169.  
 Gárajib, 190.  
 Geđi, 61.  
 Gejo, 188.  
 Gemdú—sadaphali, 46, 187.  
 Gengibre, 123.  
 Ghanasuramg, 181, 184, 196.  
 Gháraphúli, 179, 184.  
 Gháti—pitapápađo, 160.  
 Gibique, 45.  
 Gilo, 82.  
 Gipo, 23, 157.  
 Giri kolijau, 124.  
 Girimaso, 112.  
 Giriç, 151.  
 Goaiveira, 44.  
 Goa—pañder, 163.  
 Godejavem, 191.  
 Gođepáulám, 193.  
 Gođo—Ámbáđo, 26.  
 Goñchem sadapha], 187.  
 Goimti, 50, 197.  
 Goimtini, 54, 165, 182.  
 Gokárni, 36.  
 Go], 114.  
 Gola kamdo, 127.  
 Golchi—bhagi, 6.  
 Golfao, 5.  
 Goji, 6, 167.  
 Gomdo, 99.  
 Gomañh, 51, 160, 188, 197.  
 Gomañh ( sylvestre ), 208.  
 Gomiñh, 89, 193.  
 Goncoui, 12.  
 Goupajada, 12.  
 Grabosa, 127, 146.  
 — redonda, 127.  
 — ovada, 127.  
 Grão da palha, 34.  
 — de gato, 45.  
 — do boi, 34.  
 — de reado, 37.  
 Graos da Nossa Senhora, 35.  
 Guaivas, 44.  
 Guarda-olhos, 112.  
 Gula-Sabú, 164.  
 Guñgi, 31, 41, 189, 202.
- 
- Haradi, 158, 197, 201.  
 Haryali, 138, 186.  
 Hathipanya, 62, 156, 190.  
 Herpa, 138.  
 Herva bendita, 173.  
 — mimosa, 38.  
 Henna, 48.  
 Hing, 176.  
 Holodavi kaneri, 173.  
 Hortela brava indiana, 56.  
 Hummatu, 83.  
 Hundir Alou, 143.
- 
- Idon—Maulli, 105.  
 Iata, 57.  
 Ingi, 187.  
 Inhame do cão, 128.  
 Inota—indieu, 82.

Inschi vel Inschi-kun, 128.

Inteia, 42.

Ipecacunha de Goa, 19.

Iru, 136.

Iris *sep* Ballari, 185.

Iribeli, 148.

Iripon, 145.

Iripu, 145.

Isora-Murri, 18.

Ispagula, 191.

Itta-Arealou, 115.

Ittialu, 115.

Itti-Canni, 104.

Iy, 189.

Iy-mulu, 187.

### J

Jaggam, 156.

Jagueira, 117.

Jai, 69.

Jamb, 45.

Jambeiro, 45.

———de malacca, 45.

Jambo do mato, 48.

Jambos dos bujios, 143.

Jami ul, 45, 156, 181.

Jambuleiro, 45.

Jangom, 201.

Japalu, 109.

Jaqueira falsa, 57.

Jarasi, 56, 175.

Jasmin do mato, 69.

Jasumdi, 159.

Jat, 57.

Jayaphal, 179.

Jelo, 190.

Jempal, 109, 166, 180, 194, 197.

Jiba, 48.

Jingti, 191.

Jino, 169.

Jirem, 164.

Jose-marta, 156.

Jujubeira, 20.

### K

Kabab, 165.

Kabar, 186.

Kadali, 47.

Kadavel, 22.

Kadavi, 162.

Kadavi bhaji, 55.

Kadavi tovasini, 58, 193.

Kadebon, 140.

Kadebon mau, 140.

Kadekú, 189.

Kaden pullu, 137.

Kadi ben, 16.

Kadi nimba, 16, 178, 201.

Kadu khájür, 160, 162.

Kaid, 132.

Kaida Taddi, 132.

Kaida Tajera, 133.

Kaipá, 6.

Kaipá Tajera, 55, 133.

Kátrolh 82.

Kaj, 25, 199, 202.

Kájro, 76, 160, 173, 177, 192.

Kaju, 155, 180, 185, 191.

Kajuri, 181.

Kaka kodi, 72.

Kaka mula, 37.

Kaka ujara, 66.

Kaka toddali, 16.

Kaka tojaka, 125.

- Kakoesi, 42.  
 Kak phul, 4, 169.  
 Kák tali, 87.  
 Kak tunço, 97, 178, 183.  
 Kaku valli, 32.  
 Kala kando, 186, 188, 193.  
 Kala phúr, 179.  
 Káláso, 176.  
 Kala sumdo, 176, 186.  
 Kal davo ápto, 40.  
 Kálem girem, 62.  
 Kálem jiron, 163, 169.  
 Kalengi cusjava, 113.  
 Kalesjam, 26.  
 Kálí pandan, 180.  
 Káli vel, 79.  
 Kálo adulaso, 90, 188.  
 Kálo ápakáro, 2, 16, 102.  
 Kájo bhendo, 10.  
 Kájo dutro, 83.  
 Kájo ka-lo, 71, 160.  
 Kal panua maravara, 152.  
 Kal Tolda vaddi, 38.  
 Kalsjeron Panel, 3.  
 Kala pul valli, 72.  
 Kala tali, 119.  
 Kali kamto, 36.  
 Kal beludagon, 21.  
 Kamchal, 190.  
 Kámdel, 43.  
 Kamdela, 104.  
 Kámdli, 42, 104, 107.  
 Kámdo, 177.  
 Kamdola, 95, 168.  
 Kamela, 163.  
 Kamotte valli, 69.  
 Kángaul, 168, 172, 181, 183, 192.  
 Kámte bhaji, 164, 189.  
 Kámte kómvar, 188, 189, 196, 198.  
 Kámte mogri, 89, 169.  
 Kámte vayangini, 186.  
 Kamoti, 59.  
 Kamtsami, 30.  
 Kamvadel, 171, 176.  
 Kamvamt, 178.  
 Kamvate, 168.  
 Kanango, 30.  
 Kanaphul, 156.  
 Kanaphúti, 23, 187, 188, 199.  
 Kangi, 79.  
 Kanoelli-itti kanni, 149.  
 Kansjiram maravara, 120.  
 Kanti, 79.  
 Kapa mava, 25.  
 Kapbe 159, 172, 177, 186, 192.  
 Kappa kelengú cen herotas, 79.  
 Kapusila, 11.  
 Kápsin, 194.  
 Kápsini, 12, 189.  
 Karábphul, 161.  
 Kara malem, 198.  
 Karambalphal, 1.  
 Karánuji, 36, 166.  
 Karamol, 174.  
 Karáodi, 127.  
 Karangolan, 56.  
 Karapi, 128, 176, 182.  
 Karat-jero, 6.  
 Kara kundel, 103.  
 Karenda, 146.  
 Kareta Tejovivalli, 22.  
 Karotela, 131.  
 Kareti, 52, 188, 162.  
 Karibopon, 16.



- Karintá, 53.  
 Kari nivoli, 72. ✓  
 Karim poli, 133.  
 Karin Njoti, 18.  
 Karinta kali, 61.  
 Kari-velli-panna.  
 Karivi valli, 54.  
 Kara vara, 141.  
 Kari vetti, 69.  
 Kharivi valli, 54.  
 Karli, 61.  
 Karode, 127.  
 Karlu alam, 14.  
 Karo, 160, 162.  
 Karoth-tali, 8.  
 Karundo, 176, 181, 198, 202.  
 Karvanta-vel, 116.  
 Kassilo, 144.  
 Kásati, 168, 181.  
 Kasitob, 168, 192, 203.  
 Kasjara miram, 47.,  
 Kasturi kamdi, 5.  
 Kathou theka maravara, 119, 144.  
 Katiji kalengu, 128.  
 Kati kamte, 86, 181.  
 Kato jiletti pullu, 129.  
 Katou adamoe, 144.  
 Katou alou, 114.  
 Katou Indel, 130.  
 Katou Inachi-kua, 123.  
 Katou kadeli, 145.  
 Katou kadesjan, 19.  
 Katou karua, 102.  
 Katou kayda maravara, 120.  
 Katou mail elou, 146.  
 Katou panima maravara, 119.  
 Katou maregam, 143.  
 Katou Tieroe, 26.  
 Katou Tejalta, 57.  
 Katou Tejolan, 153.  
 Katsjul kelengu, 122. *  
 Kattu kurka, 96.  
 Kattu tagera, 29.  
 Kattu tchena, 133.  
 Kattu tejieregam mulla, 68.  
 Kattu tumbu, 96.  
 Kattu ulinu, 34.  
 Kattu areu, 9.  
 Kato bala, 124.  
 Kato Beloereu, 10.  
 Kato kapel seu cadensio.  
 Kato kalengu, 78.  
 Kato katsjil, 146.  
 Kato maistosima, 6.  
 Kato nurem kalengu, 127.  
 Kato tejieli pu, 64.  
 Kalyacho dojo, 84.  
 Kanadali, 54, 196.  
 Kavala kamti, 182. *  
 Kavli, 202.  
 Kedamgu, 30.  
 Kel 170, 198.  
 Kela, 115.  
 Kely, 145.  
 Keli, 161.  
 Kensing, 30.  
 Kesari, 155.  
 Khair, 155.  
 Khair champo, 164, 170, 185, 197.  
 Khaja, 166.  
 Khun-búgstem, 173.  
 Khun loch, 160.  
 Khmouchim panam, 101, 179, 192.  
 Khapar, 189.

- Khari khapusi, 11.  
 Kharoli, 87.  
 Kharopo, 113.  
 Kharo uró, 171, 197, 200.  
 Kharsing, 166, 167.  
 Kharundo, 161.  
 Kharvants, 116.  
 Kasukhas, 162, 176.  
 Khaskhaschem jad, 163.  
 Khru-khutali, 165, 177.  
 Khru-khutli, 32, 162.  
 A'bosibori, 39.  
 Khibehola sejenti 150.  
 Kimal, 158.  
 Kimvaq, 190.  
 Kirábi, 58, 197.  
 Khrayatam, 89, 159, 172, 123.  
 Kirgabeti, 107.  
 Kiti, 72, 118, 124, 161.  
 Koda tegera, 148.  
 Kodda pail, 133.  
 Kofi pullu, 139.  
 Kodú hamvali, 181.  
 Kledú phal, 169, 175.  
 Kola káado, 151.  
 Kolaso, 88, 186.  
 Kolinj-ona, 123, 179.  
 Kombi, 38, 189.  
 Kombyo, 46, 156.  
 Komva lel, 166.  
 Komvau, 156.  
 Konetti, 127.  
 Konú, 31.  
 Koruano, 178.  
 Kosjeletti pullu, 129.  
 Kua, 122.  
 Kucen mulla, 68.  
 Kudici kodli, 147.  
 Kudo, 156, 173, 201.  
 Kolinjan, 177, 191.  
 Kuliba audini, 51.  
 Kumti, 16.  
 Kumvali, 51, 79, 161, 177.  
 Kumvalo, 170.  
 Kunak, 19, 175, 180.  
 Kupámini, 175.  
 Kupámini masemesade, 187.  
 Kurdki, 189.  
 Kurjú, 159.  
 Kurundoti, 9.  
 Kusá, 139.  
 Kusgo, 177.
- L**
- Lácheri, 14.  
 Láhan gumji, 31.  
 Lahan mudi, 7.  
 Lájri, 38, 41, 203.  
 Lantak, 160.  
 Lason, 136.  
 Lassa, 144.  
 Limto coroado, 148.  
 Limto de mato, 17.  
 Limto pimentoso, 15.  
 Limbáde, 192.  
 Limá, 168, 174, 198.  
 Limgaj, 93, 183, 185.  
 Limjes, 190.  
 Limões da folha cruzada, 17.  
 Lo'ár, 158.  
 Lokasidi, 18.  
 Lusan, 177, 199.  
 Lovu, 136.

- ME**
- Mád, 131, 156, 161, 182, 190, 194, 198, 201.  
 Madanaku, 45.  
 Mádi, 130, 155, 180, 192.  
 Mádi ajüm, 165.  
 Mádi phophol, 163.  
 Mahá-kändel, 43.  
 Mahá Panem, 180.  
 Maho, 181, 187.  
 Mail Anschi, 48.  
 Mail Eton, 93.  
 Maiphal, 158.  
 Maisimng, 27, 169.  
 Mükada jéla, 60, 61.  
 Mäko, 63, 196, 202.  
 Malabari balad, 171, 179.  
 Malacca Schambu, 45.  
 Malacha Pe'a, 44.  
 Mala Namgoni, 168, 172.  
 Mala Inschi kua, 124.  
 Malakacho jamb, 45.  
 Malakungani, 172, 181, 188.  
 Malakaten tsjambon, 143.  
 Malaki karimboli, 15.  
 Malambetti, 143.  
 Malam todda vaddy, 147.  
 Majem kua, 123.  
 Malkom gani, 181.  
 Mallim Todjati, 145.  
 Mal nargam, 17.  
 Malokungani, 192.  
 Manjara sejarí, 193, 196.  
 Mão, 139.  
 Maua, 16, 21.  
 Mauam polum, 96.  
 Manapsteri, 64, 159, 165, 172, 178.  
 Maudo jadi, 41.  
 Manga, 24.  
 Manganiari, 83.  
 Mangas, 24.  
 Mangueira, 24.  
 Manil gale, 66.  
 Manil panas, 3.  
 Manja adeka manjen, 149.  
 Manjan kua, 122.  
 Manjella kua, 122.  
 Manneli, 29.  
 Manpanna, 141.  
 Mantoddavaddi, 147.  
 Manykara, 66.  
 Mao, 24.  
 Maodi, 89.  
 Maquinha, 144.  
 Marati 158.  
 Maravara tsjembra, 134.  
 Maravilha de Peru, 98.  
 Maretá incali, 151.  
 Maretta mala maravara, 140.  
 Marmeleira, 17.  
 Mareduñini, 51.  
 Maroi, 73, 184.  
 Marotnia, 59.  
 Maryeta vel, 186.  
 Mascila kändo, 190.  
 Masão spiuosa, 145.  
 Masara, 109.  
 Mas'ra sesole, 110, 160, 184.  
 Masúla kändo, 126.  
 Masul kolen, 126.  
 Masavi aloa, 69.  
 Mat, 24.

- Mävång, 159.  
 Maytosina, 6.  
 Mecastri, 68.  
 Medecanni, 104.  
 Medica-tali, 104, 164, 180.  
 Meffa-panna-kelaugu, 126.  
 Menaki, 170.  
 Mendoni, 129.  
 Merendi, 98.  
 Mertom palli, 21.  
 Meri-caravatta, 116.  
 Mesari sesande, 196.  
 Mesi, 199.  
 Methi, 48, 168, 177, 179, 182, 200.  
 Mhosvel, 21, 165.  
 Mijirikathva, 178.  
 Minanguni, 99.  
 Miri, 101.  
 Mirsang, 83, 169, 192, 199.  
 Mirvel 101, 173, 179, 182, 185,  
 192, 200.  
 Modagata, 75.  
 Moligori, 174, 175.  
 Modena, 49.  
 Molera-canni, 14.  
 Modira-caritum, 70.  
 Moemo, 19.  
 Mogari, 68, 194.  
 Mogori falso, 68.  
 Mogaro da Serra, 68.  
 Molago Godi, 101.  
 Monricon, 32.  
 Morandi, 168.  
 Morandi, 89, 167. ✓  
 Moransio, 189.  
 Moringa, 27.  
 Morcino rosado, 8.  
 Morsegneiro, 115.  
 Mosing, 169, 171, 180, 188, 189,  
 200.  
 Moserasesude, 175.  
 Matta Modereca, 50.  
 Motta pullu, 137.  
 Mottenga, 135.  
 Moul Klavon, 12.  
 Mouti-ila, 15.  
 Monricon, 32.  
 Mouringon, 27.  
 Mourmoura, 145.  
 Mourracura-darum, 26.  
 Moy, 26, 157.  
 Mucca, piri, 54.  
 Muel-schevi, 64.  
 Mug, 34.  
 Magi, 34.  
 Mu-kelensa, 128.  
 Malen-pullu, 136.  
 Mullen-bulleri, 50.  
 Mullen-chena, 154.  
 Mulo, 174.  
 Mündi, 62.  
 Münde, 182.  
 Margali, 126.  
 Mariguti, 57.  
 Musta, 135.  
 Nachui, 161.  
 Nachno, 178.  
 Nigahana, 183, 187, 190.  
 Nigodoti, 100.  
 Naga, 17.  
 Naga-nyai, 175.  
 Naga-valli, 10.  
 Nag-phatpo, 8.

- Nagila-kuçõ, 71.  
 Nai-coran, 32.  
 Nakeri, 47, 157.  
 Nalabi, 31.  
 Nala-sirdara, 95.  
 Nalugu, 23.  
 Nalla-mulla, 68.  
 Nam-canna, 154.  
 Namdit, 195.  
 Namdruka, 115, 184.  
 Namidu, 56.  
 Nanañt, 174, 175.  
 Nandi-Erratna, 71.  
 Nani, 17, 21.  
 Nani da serra, 21.  
 Nanschera-canschabu, 150.  
 Nansjera, patsja, 74.  
 Narajai, 69.  
 Nara-vallu, 149.  
 Narinam pouli, 10.  
 Nari-palsja, 150.  
 Narola, 176.  
 Narum-panel, 2.  
 Naru-nundi, 72.  
 Narvala, 163.  
 Narvela, 176.  
 Nati-schambn, 45.  
 Nati-jatam, 4.  
 Nedel ambal, 77.  
 Negunda, 93.  
 Nehoemka, 54.  
 Nefam-mari, 31.  
 Nela-nangam, 19.  
 Nefam-pata, 62.  
 Nefam-pullu, 120.  
 Nefenschena major, 133.  
 Nefenschena minor, 134.  
 Nelipa, 85.  
 Neli-tali, 31.  
 Nella-panna-marvvara, 140.  
 Nela-tandale cotti, 28.  
 Nella-vaga, 9.  
 Nelli-panli seu Bilimbi, 107.  
 Nolosa-pala, 129.  
 Nela-tajera, 7.  
 Nelumbrian, 6.  
 Neys, 128.  
 Nila-bamdena, 83.  
 Nila-Hummatu, 82.  
 Nila-pusapi, 196.  
 Nilbe-dausi, 66.  
 Nilt, 29, 171, 175.  
 Nilica de inferno, 112.  
 Nili-todda-vadi, 41.  
 Nil-pulla, 130.  
 Nimb, 19, 173.  
 Nimboa, 19.  
 Nir-cottani-pala, 105.  
 Nir-pullari, 148.  
 Nir-pulli, 130, 148.  
 Nir-schulli, 88.  
 Niruri vel nirpulla, 106.  
 Nir-valli-pullen, 138.  
 Nirvilli, 170.  
 Niuren, 150.  
 Nio, 172.  
 Nivula-kãntem, 199.  
 Nivuli, 106, 169, 199.  
 Nivuli kãntem, 197.  
 Njara, 45.  
 Njota-njedem valli, 75.  
 Nochlil, 94.  
 Noeli-tali, 37, 109.  
 Nela, 54.

Noz de molucca falsa, 102.  
 Noz vonica, 76.  
 Nuravel, 181.  
 Nuron kōnggu, 127.  
 Nur-notajul, 94.  
 Nur Pongelion, 86.  
 Nystel, 144.

## O

Ocpoti, 168.  
 Ocpata, 95.  
 Ocpoti, 95.  
 Ogoranim, 147.  
 Olait-sambol, 188.  
 Oli-chá, 138.  
 Omt, 174.  
 Oratelaiva, 163, 178.  
 Orela-Modecca, 50.  
 Ossel, acubel, 118.  
 Orosithi, 24.  
 Ohro, 112.

## P

Paad-valli, 5.  
 Pádachi-methi, 46, 157, 168, 202.  
 Paða-dálíki, 69.  
 Páda-nivuli, 160, 170.  
 Padavakani, 14.  
 Padava-kalenga, 129.  
 Padavalam, 50.  
 Padavara, 60.  
 Páða-vel, 5, 159, 185.  
 Paðkalf, 59, 164.  
 Pa]-málsali-kamal, 4.  
 Pádri, 86, 167.  
 Paero, 35.  
 Pahora, 100.  
 Paina-schulli, 89.

Pai-Paroc, 13.  
 Paju, 108.  
 Pala, 70.  
 Pajas, 33, 156, 162.  
 Palasú, 33.  
 Pali ásana, 157.  
 Palega-Pajaneli, 86.  
 Palisa-káli-dudini, 54.  
 Palins, 47.  
 Palka, 102.  
 Palma d'igreja, 118.  
 Pal-modecca, 49, 79.  
 Pal-valli, 71.  
 Pamch-pánámchi-sarabari-vel, 133.  
 Pandari, 170, 171.  
 Pañdarák, 191.  
 Pañgalo, 171.  
 Pañgiro, 32.  
 Pañgero, 32.  
 Pán, 176.  
 Pana-poi, 106.  
 Pana poja, 108.  
 Pandi avanaen, 111.  
 Pandi-Pavel, 52.  
 Paniel, 142.  
 Panem-Palka, 162.  
 Panheira, 12.  
 Panitsjika-maram, 67.  
 Panja, 12.  
 Panjala, 12.  
 Pánua, 156, 140.  
 Panna-kelengo maravara, 139.  
 Panna-mara-maravara, 152.  
 Pan-poem, 108.  
 Pansa-alonabin, 156.  
 Panna-valli, 140.  
 Pao costus, 16.

- Pao costas de serra menor, 3.  
 Pao de chanco, 13.  
 Pao salgado macho, 43.  
 Pápuli, 52.  
 Papay, 166.  
 Papaya, 162.  
 Paradeka, 167.  
 Para-pano-maravara, 141.  
 Parapoto, 183.  
 Paray, 143.  
 Pardik, 157.  
 Pareti, 11.  
 Parpadagam, 58.  
 Parponna, 73.  
 Pasnoc, 8.  
 Pátung, 37, 156.  
 Pata-ponossou, 117.  
 Patehuli, 96, 97.  
 Patetsjiva-maravara, 152.●  
 Patib, 96, 97.  
 Patihchi-bava, 175, 177, 182, 191.  
 Pat-ponna, 117.  
 Patolas, 52.  
 Pau de cobra, 76.  
 Pau-de-phárin, 161.  
 Pau de sapau, 113.  
 Pau de solor, 76.  
 Pee-amerlu, 3.  
 Pee-candel, 42.  
 Pee-catsjivara, 52.  
 Pee-coipa, 3.  
 Pee-eupoucm, 109.  
 Pee-inotainolien, 82.  
 Pee-motenge, 136.  
 Pee-pongecin, 111.  
 Pee-tanfale cotri, 28.  
 Pee-tunda vaba, 149.  
 Pela seu guajabor, 44.  
 Pelonarta, 46.  
 Pelon seu guayabo sylvestre, 46.  
 Petusa pola tali, 127.  
 Pena, 136.  
 Penarvali, 55.  
 Pena-vel, 55.  
 Pepineira, 53.  
 Pepino de mato, 53.  
 Per, 44, 157.  
 Pera, 44.  
 Pera-alu, 114.  
 Pera brava, 46.  
 Pera de malacca, 44.  
 Peragu, 94.  
 Pereira dos diabos, 105.  
 Perim-munja, 149.  
 Perim Panel, 16.  
 Perim-tsjarel, 153.  
 Perim-conrigo, 27.  
 Perim-kasda toddi, 132.  
 Perim-kara, 144.  
 Perim-nivoari, 108.  
 Perim-njara, 45.  
 Perim-teragam, 116.  
 Perim-toddali, 20.  
 Peripo, 147.  
 Pestumba, 90.  
 Petári, 182, 183, 189.  
 Pereti, 82.  
 Phaglini, 52, 197.  
 Phalaphado, 183.  
 Phatarphad, 156.  
 Phatarphad, 106.  
 Phatar-ponni, 65.  
 Phirugi dhutara, 161, 168, 180,  
 187, 196.

- Phirinagi nivalakantem, 177.  
 Phontchih pánám, 190, 198.  
 Phophal, 180, 180, 192.  
 Picinca, 51.  
 Pimenta, 101.  
 Pimenta longa, 101.  
 Pimenta redonda, 101.  
 Pimpala, 115, 156.  
 Pippollo, 115.  
 Pinta khâthkhûthil, 112, 169.  
 Pinha, 43.  
 Pipsloe, 115.  
 Pipli, 101.  
 Pipri, 115.  
 Pipulako, 195.  
 Piru dukka, 23.  
 Piscoleo, 154.  
 Pita-gasurcoli 112.  
 Pita-mári, 157, 193.  
 Peta-vel, 158 183, 188, 193.  
 Pitmari, 19.  
 Pitsigam multa, 69.  
 Plusso, 33.  
 Pnam curandula, 61.  
 Poem, 108.  
 Pozatsjetti, 19.  
 Poerinsii, 24.  
 Pokao, 91.  
 Potti, 21.  
 Pomno, 181.  
 Pomgero, 169.  
 Poivo, 123.  
 Pousunpen naravara, 121.  
 Ponga, 145.  
 Pongam, 86.  
 Ponga-punas, 117.  
 Pongelou 108.  
 Pongelou, 18.  
 Pongia-vali, 80.  
 Ponnaca, 7.  
 Ponnaca pequena, 7.  
 Ponnagam, 110.  
 Ponna-vireu, 38.  
 Ponsa-keli, 121.  
 Pontaletsje, 57.  
 Popaya, 184, 189.  
 Poripot, 173.  
 Portugali aivali, 105, 196, 200.  
 Pota pulla, 136.  
 Pouli, 50, 173, 197.  
 Puen-peda, 153.  
 Pulcolli, 91.  
 Pulli-schovali, 79.  
 Puna, 7.  
 Puna pequena, 7.  
 Punárnává, 98, 164, 185, 187.  
 Purlukali aivali, 83.  
 Putamba, 63.  
 Putsja Paren, 34.
- ❖
- Quarena, 77, 160, 196.  
 Queriltas macho, 112.  
 Querillus, 69.
- ❖
- Raiz de isaba, 128.  
 Raiz de bolsa, 127.  
 Raiz de camara, 5.  
 Raiz d'empose, 129.  
 Raiz da mostarda, 108.  
 Raiz da solteira, 78.  
 Raiz do zafrao, 122.  
 Raizeira vidrouba, 114.



- Ratanhia do paiz, 23.  
 Ramacciam, 138.  
 Rama derpu, 136.  
 Rameto, 200.  
 Ramitol, 65.  
 Ram macnorá, 79.  
 Râna alem, 179.  
 Râna gevado, 156, 165.  
 Râna gomolú, 89.  
 Râna goinsáji, 160.  
 Râna hulad, 178, 184, 199.  
 Râna keji, 124.  
 Râna nimba, 148.  
 Râna-pelavel, 173, 197.  
 Râna tôlas, 164.  
 Râna vali, 61.  
 Râna vele, 153.  
 Rân biko, 26.  
 Rân-chamvali, 34.  
 Rân-dák, 22, 182.  
 Rân-kei, 69.  
 Rân-jaiphal, 102.  
 Rân-jonalo, 137.  
 Rân-limbé, 17, 170.  
 Rân-talsi, 95, 190.  
 Râya-sivomti, 195.  
 Raya-Séramti, 178.  
 Ravâ-pon, 59.  
 Ringi, 24, 163, 185.  
 Rimthi 24, 163, 182, 185.  
 Ringí, 182.  
 Roembadoe, 116.  
 Roey, 78.  
 Rojamári, 188.  
 Roj-âmvali, 107, 174, 198.  
 Roj de pers, 197.  
 Roji, 182.  
 Rom-vel-buro, 4.  
 Rom-kakely, 152.  
 Ron kalon, 134.  
 Ronka perai, 114.  
 Rosa mogari, 68.  
 Rosario bravo, 46.  
 Rotas grandes, 153.  
 Rozario de jambo, 45.  
 Rôí, 73, 156, 168, 170, 176, 180,  
 183, 184, 187.  
 Rumbad, 116, 181⁶⁰  
 *  
 Sabaji, 175, 183, 193.  
 Sabão dos canarins, 50.  
 Sadaphali, 4.  
 Sado-vaimgini, 81.  
 Sai, 69.  
 Saikilo, 95, 96, 159.  
 Sâilo, 92, 158, 186.  
 Saio, 68.  
 Sajeri, 199.  
 Saladi tirtava, 95.  
 Salão femea, 1.  
 Sâlep, 161.  
 Salgueira, 95, 104.  
 Salgueira maior, 43.  
 Salgueira mameto, 42.  
 Salgueira sativo, 43.  
 Sâlok, 5.  
 Sâlori, 37.  
 Salsaparrilha da India, 72.  
 Saluk, 5.  
 Samana, 108.  
 Sana-puspá, 28.  
 Sam-joan-vel, 78, 166.  
 Samsvel, 187, 199.

- Samstravadi, 46.  
 Sañtvin, 70, 162, 172, 201.  
 Samvar, 12, 155.  
 Samtu, 178.  
 Sangori, 12.  
 Santeni, 70.  
 Sapossi, 101.  
 Sápús, 101, 159, 170, 172, 184, 188.  
 Sarabart-vel, 23.  
 Saralu, 16.  
 Sarani, 47, 157.  
 Saranto, 137.  
 Sara-punik, 30.  
 Sarop-vel, 40.  
 Sarpúji, 39.  
 Sasali, 13, 156.  
 Sasara-muji, 128, 176.  
 Sâtágân, 180, 196.  
 Sâtaviq, 155.  
 Satilhas, 82.  
 Satirto, 94.  
 Satryocho mäd, 131.  
 Sávó kãmdal, 43.  
 Schadaveli-kilangru, 128.  
 Schadida Calli, 106.  
 Schageri cottam, 13.  
 Schakeri schora, 54.  
 Schampakem, 2.  
 Schanga cuspi, 36, 150.  
 Schembra-rulli, 22.  
 Schem Pariti, 11.  
 Scheru cadelari, 98.  
 Scherunam cottam, 106.  
 Scheru Padu valam, 50.  
 Schetera kata valli carenam, 75.  
 Schetti, 59.  
 Schetti codiveli, 65.  
 Schiteh, 87.  
 Schivanni, 93.  
 Schorigenam, 112.  
 Schovanna adamboe, 80.  
 Schovanna, modela-mucca, 100.  
 Schunambu valli, 21.  
 Selati, 160, 196.  
 Semdavel, 199.  
 Sendari, 155.  
 Sendem, 79.  
 Sepo, 178.  
 Seyalam-vachi petari, 185.  
 Shendri, 163.  
 Shena, 134.  
 Sigi Siras, 42.  
 Sikekai, 182.  
 Simgári, 31.  
 Simgi, 86.  
 Simsarati, 81, 186.  
 Simsori, 100.  
 Sins, 191.  
 Sirí Padá, 13.  
 Sisori, 197.  
 Sita nitá, 7.  
 Sít-rân-limbi, 17, 170.  
 Sivanti, 159.  
 Sivan, 93.  
 Sivanti, 160.  
 Sjonanna amelpodi, 69.  
 Sjovanna polatati, 127.  
 Snarolo, 153.  
 Solda, 13.  
 Sonana ponspa, 121.  
 Sonbenisa, 111.  
 Sonbiyam, 190.  
 Sonú, 120.

Sonna sjika, 152.  
 Solntari, 48.  
 Sravadi, 58.  
 Suendadi pullu, 29.  
 Sujaro hortelânva, 96, 177, 183,  
 193.  
 Supali, 36, 185, 190, 193, 196.  
 Sûpâri, 130.  
 Suramg, 157.  
 Suran, 161, 180.  
 Surana, 134.  
 Surna, 134.  
 Surpin, 64, 159.  
 Suta-kamti, 167, 170.  
 Syalita, 1.

## T

Tagera, 37, 39.  
 Taikilo, 39, 167.  
 Tak sivaji, 80.  
 Tala neli, 79.  
 Tali, 28, 80.  
 Tali dan kennaja, 28.  
 Tali pullu, 113.  
 Tali parete, 11.  
 Talona, 69.  
 Talu dana, 98.  
 Tamadi ambadi, 190.  
 Tamala patra, 102 178.  
 Tama povel putaja maravara, 141.  
 Tamara, 6.  
 Tamara de mato, 131.  
 Tamara tonga sen carumbola, 14.  
 Tamarinhairo, 39.  
 Tambadi-chitarak, 189, 200.  
 Tambadi chitrak, 192, 193.  
 Tambidi Simsori tomhu, 100, 197.

Tambido apto, 41.  
 Tambido chitrak, 65.  
 Tambido mandari, 41.  
 Tamdalo, 172, 185.  
 Tan, 130.  
 Tana pomta, 137.  
 Tandali cotti, 28.  
 Tani, 44.  
 Tanini, 190.  
 Tanis mortij, 143.  
 Tantaraga, 36.  
 Tapucado, 9, 182, 185.  
 Taracotha, 65.  
 Taramti, 199.  
 Tardavel, 61.  
 Tarilla, 20.  
 Tarilla d'agua, 145.  
 Tavasini, 53.  
 Tecca, 92.  
 Tecca brava, 144.  
 Tecca cressa, 94.  
 Tecca macho, 144.  
 Tembiri, 156.  
 Tembri, 201.  
 Tembri, 53, 172, 181.  
 Tendali omprido, 33.  
 Tenga, 131.  
 Tenna, 137.  
 Teregum, 116.  
 Thali, 121.  
 Thalia maravara, 121.  
 Theka, 92.  
 Theka maravara, 152.  
 Thola, 152.  
 Thora Paeron, 36.  
 Tiká-mito, 37.  
 Tikhi, 102, 179.

- Tila karendi, 127.  
 Tilo karo, 20.  
 Tiloni, 162, 165, 200.  
 Til tameg, 1.  
 Timpli, 15, 179, 200.  
 Tina dharemchem nivala kantem.  
     170, 181.  
 Tinapni, 157, 193.  
 Tindalica, 53.  
 Tindalica Spinosa, 52.  
 Tinda parna, 113.  
 Tinpana, 188.  
 Tinpani, 19.  
 Tipdi, 15, 179, 200.  
 Tippoli, 29.  
 Tiqui, 102.  
 Tiraphul, 179, 186, 200.  
 Tiriagessi gaj, 37.  
 Tiripana, 154.  
 Tira-calli, 105.  
 Tira-tali, 80.  
 Tita-boti, 181.  
 Titti, 179.  
 Tivo, 189.  
 Tjageri narea, 127.  
 Tolda-panna, 118.  
 Tolda-vaddi, 14.  
 Togañu kua, 123.  
 Togenou Ponna, 7.  
 Tojiti palla, 138. *  
 Tondi karval, 91.  
 Ton li teregam, 91.  
 Tolasi, 119.  
 Torigue, 74.  
 Toro, 134.  
 Trepadeira de cobra, 40.  
 Trepadeira de fulla triste do dia, 53.  
 Trepadeira de Uzo, 3.  
 Trifolio, 19.  
 Tsea pangam, 37.  
 Tsjada bung, 113.  
 Tsjalaen, 97.  
 Tsjaka marua, 117.  
 Tsjakela, 115.  
 Tsjalo, 37.  
 Tsjapapilla, 153.  
 Tsjangu paspaan, 88.  
 Tsjanelata parenda, 21.  
 Tsjela, 115.  
 Tsjeli, 133.  
 Tsjem cumulu, 85.  
 Tsjem tani, 143.  
 Tsjera pa-pal-valli, 147.  
 Tsjera carisam, 20.  
 Tsjeria cametti valli, 147.  
 Tsjeria jongoham palla, 56.  
 Tsjeria mangi nari, 84, 151. *  
 Tsjerian cossana, 63.  
 Tsjerian nulla, 68.  
 Tsjeria maranam pali, 55.  
 Tsjeria svenstravada, 45.  
 Tsjerio jongoumpalla, 56.  
 Tsjerowa ditambal, 77.  
 Tsjerou natus maravara, 129.  
 Tsjerou katou naregam, 17.  
 Tsjerou kara, 59.  
 Tsjerou narulou, 143.  
 Tsjerou teeka maravara, 158.  
 Tsjerou thaka, 94.  
 Tsjera coasjaca, 113.  
 Tsjera jongoumpalla, 56.  
 Tsjera kudali, 47.  
 Tsjera kotsjolesti, 154.  
 Tsjera mena li, 57.

Tajeru parivel, 151.  
 Tajeru parua, 9.  
 Tajeru tsjere, 131.  
 Tajeru uren, 13.  
 Taj:ocutti, 18.  
 Tajo:api pulla, 153.  
 Tsjori valli, 22.  
 Tsjovanni manueli, 31.  
 Tsjulam tsjera, 84.  
 Tsjoris cranti, 78.  
 Tamba, 97.  
 Tamba cada velli, 65.  
 Tamba, 91, 183, 185, 193.  
 Talsi, 55, 183, 193.  
 Tapikatá 9, 160, 164, 186, 191.  
 Tapocudi, 9.  
 Tapa cada, 10.  
 Turi, 36.

## U

Udih, 34.  
 Udikinyatem, 160.  
 Ujarant, 185, 195.  
 Ukasi, 201.  
 Ulinja, 23.  
 Ulen-valli, 70.  
 Uudarscho-kán, 182.  
 Uudi, 7, 166, 193.  
 Uudicim pánaón, 64, 181.  
 Uó lri, 56, 161, 176, 181, 198, 203.  
 Upáji, 168.  
 Upár-sáli, 72, 176, 181, 183, 184,  
 202.  
 Upa-dali, 88.  
 Ura-valli, 147.  
 Uren, 10.  
 Uro, 112, 200.  
 Us, 191.

Usago-cudo, 71.  
 Usaki, 201.  
 Utarani, 184, 187, 193.  
 Uvas d'aljofre, 23.  
 Uvas de boi, 22.  
 Uvas d'enfermos, 22.  
 Uvas dos bugios, 22.  
 Uvas d'inferno, 26.  
 Uvas de tore, 22.

## V

Vad, 167, 169.  
 Vada-koli, 90.  
 Vadboá, 114.  
 Vaemba, 135.  
 Vágácho davadyo, 129, 169, 172.  
 Vaikhamá 159, 172, 202.  
 Vaingint, 82.  
 Vákeri, 37.  
 Vakhamá, 202.  
 Vak púsi, 85.  
 Válchi bhaji, 99.  
 Vaer-mani, 18.  
 Válerim, 183.  
 Vallia-capo-molago, 148.  
 Vallia-mangu-nari, 64.  
 Vallia-tsjri-valli, 22. **b**  
 Valh-camram, 4.  
 Valli-cari cáseri, 11.  
 Valli-iti camni, 104.  
 Valt-modagam, 8.  
 Valli-sauvari, 12.  
 Valli-Schorigenam, 142.  
 Valli-Teregam, 116.  
 Valli-apa-dali, 89.  
 Valli-vara-kody maravars, 153.  
 Vallo maudito, 71, 195.

Vamval, 157.  
 Vamvale, 200.  
 Vamvol, 61, 201.  
 Vana papiou, 144.  
 Vannalla valli, 147.  
 Varai, 187.  
 Vasnavel, 159, 181, 198.  
 Vasi, 139.  
 Vasini, 150.  
 Vucalli, 166.  
 Vayavarang, 163.  
 Vekaji, 173.  
 Vekhamd, 135.  
 Velotta mandaru, 40.  
 Veta, 131.  
 Vetadagon, 21.  
 Veyakhand, 177, 184, 187, 188.  
 Vhad, 119, 135.  
 Vhadli narit-vel, 3, 160.  
 Vhadli karasbal, 1.  
 Vhadli petari, 9, 182, 185.  
 Vhadli samvar, 12.  
 Vhadlo cisampo, 8, 157.  
 Vhadlolem kirayatam, 159.  
 Vhadoli jai, 69.  
 Vhadoli karati, 52, 162.  
 Vhadoli gunji, 41.  
 Vhadoli gunz, 189.  
 Vhadolo khamvam, 100, 172, 188.  
 Vhadolo cromd, 111, 197, 199.  
 Vhadolo t.hakilo, 196.  
 Vhai namam, 77.  
 Vilengi, 66.

Visamogari, 68.  
 Vishnu-claudi, 81.  
 Voli-vete, 156.  
 Vodou, 143.  
 Vomval, 171.  
 Vomvaleiro, 66.  
 Vosadi, 202.

## W

Wadapa, 99.  
 Waga, 42.  
 Wallia-pul-valli, 149.  
 Wara pullu, 136.  
 Wata-kalla-kodi, 74.  
 Watta-tali, 110.  
 Waze, 93.  
 Wattoo-Vaffi, 74.  
 Wella eujouneri, 109.  
 Well-ida, 134.  
 Wellia-coddirieli, 38.  
 Wellia-Tagera, 39.  
 Wellia-tau isle cotti, 29.  
 Wellia-thella-maramara, 119.  
 Welli-punna-kelengn, 110.

## X

Zalico, 94.  
 Zadoeria, 122.  
 Zelo, 133.  
 Zennu, 3.  
 Zera-pati, 82.  
 Zira-pati-valli, 75.

## Erratas mais notaveis

---

### pag'nas linhas

- |     |                                                                       |
|-----|-----------------------------------------------------------------------|
| 41  | 26— <i>natans</i> — <i>leia-se</i> : <i>natans</i> .                  |
| 79  | 19— <i>angustifolia</i> — <i>leia-se</i> : <i>angustifolia</i> .      |
| 94  | 4— <i>leucosylon</i> — <i>leia-se</i> : <i>leucosylon</i> .           |
| 96  | 13— <i>Plectranthus</i> — <i>leia-se</i> : <i>Plectranthus</i> .      |
| 96  | 21— <i>Pogostemon</i> — <i>leia-se</i> : <i>Pogostemon</i> .          |
| 110 | 23— <i>tricoeca</i> — <i>leia-se</i> : <i>dicocca</i> .               |
| 121 | 1— <i>Blychnostylis</i> — <i>leia-se</i> : <i>Rynchosstylis</i> .     |
| 133 | 17— <i>crevifolia</i> — <i>leia-se</i> : <i>brevifolia</i> .          |
| 136 | 25— <i>albescens</i> — <i>leia-se</i> : <i>albescens</i> .            |
| 137 | 10— <i>tennis</i> — <i>leia-se</i> : <i>tennis</i> .                  |
| 175 | 16— <i>nicotinaefolia</i> — <i>leia-se</i> : <i>nicotianaefolia</i> . |
| 181 | 17— <i>Hydrocorpus</i> — <i>leia-se</i> : <i>Hydnocarpus</i> .        |
| 185 | 1— <i>Leucas</i> — <i>leia-se</i> : <i>Leucas</i> .                   |
| 185 | 13— <i>Aëra</i> — <i>leia-se</i> : <i>Aërus</i> .                     |
| 187 | 15— <i>Dipta</i> — <i>leia-se</i> : <i>Eclipta</i> .                  |
| 187 | 16— <i>Ecl Entada</i> — <i>leia-se</i> : <i>Entada</i> .              |
| 193 | 18— <i>Vites</i> — <i>leia-se</i> : <i>vitis</i> .                    |
| 196 | 14— <i>Myra</i> — <i>leia-se</i> : <i>Myxa</i> .                      |
| 200 | 7— <i>Colebrookiana</i> — <i>leia-se</i> : <i>Colebrookiana</i> .     |
| 208 | 14— <i>Anisochilos</i> — <i>leia-se</i> : <i>Anisochilus</i> .        |

